

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百四十八



南京中医药大学图书馆版权所有

周王朱橚 撰

普濟方
 卷之八
 後諸疾
 血暈者
 能起
 普濟方
 卷之八
 後諸疾
 血暈者
 能起

紅眼見黑花頭目旋暈
 頭之血暈溫酒調黑神
 風中風治之必難愈
 迷不省氣迷欲絕是

也然其由有三有用心使力過多而暈者有下血多而暈者有下血少而暈者其暈雖同其治特異當詳審之下血多而暈者但昏悶煩亂而已當以補藥清心藥治之下血少而暈者乃露惡不下上搶於心心下滿急神昏口噤絕不知人當以破血行血藥治之古法有云產婦纔分娩了預燒秤錘或江中黃石子硬炭燒令通赤置器中急於床前以醋沃之得醋可除血暈產後一臘不妨時作為妙○凡暈者皆是虛熱血氣奔逆腹中空

所致欲分挽者第一須先取醎醋以塗口鼻仍置醋於
旁使聞其氣兼細細飲之此為上法如覺暈即以醋噴
面甦來即飲醋仍少與解之一云仍少與水解之一法
燒乾漆令煙濃熏產母面即醒如無乾漆以舊破漆器
猛火燒熏之亦妙○經行候迷悶者有去血多而悶去
血多者是為血虛則心虛心虛則手足顫神魂亂則坐
卧不安眼見黑花甚者迷悶去血少者是為血迷血迷
則隨氣上逆傳留於心竅心下急滿無所歸神魂如醉

不能言語產後迷悶者是為血暈血暈則虛而無所歸
氣無所主氣血妄行掩觸心肺遂使眼花頭眩神昏慣
不知人事唇青肉冷口中絕氣雖數日有此證凡覺神
昏悶絕宜服八寶丸治之○產後血暈者是產母下血
或少或多皆令五臟運動氣血未定敗血奔迸攻衝心
肝若產去血過多則血虛氣極若下血氣逆則血隨氣
上逼心也二者皆令人運悶心煩滿急若血暈不止則
斃矣若敗血攻於肝肝臟氣虛所以眼花心煩而欲絕

也又云夫血暈煩悶氣欲絕者由產後出血過多血氣虛極因此而悶絕也又有下血少而氣逆極則血亦隨之上衝心亦令煩悶而滿急然亦當濡其產婦血下多少則知其產後應暈與不暈也然暈不止則斃人凡產時當向坐卧之處須順四時若觸犯禁忌多令暈悶故血下或少或多是以產處若有觸犯多致災禍爾○血暈眩暈須量虛實若宿有痰飲等病不除產後多致眩暈及血氣虛弱而使血逆上攻此又非清菟可療崔氏

曰凡暈者皆是虛熱血氣奔迸腹中空所致欲分挽者
先取醞醋以塗口鼻仍以醋火淬於傍使聞其氣兼細
細飲之此為上法可以免其暈也○治血暈之證有三
宜仔細辨證用藥若血少而運者乃惡露不下上搶於
心心下滿急神昏口噤不知人事宜破行血之藥黑神
散神妙若血多而忽暈者但神魂煩亂而已宜補血清心
之藥芎歸湯神妙若下多虛極羊肉湯當歸建中湯若
身體素多風疾因產傷積氣血乘虛而暈四物湯加防

風羗活若暈悶而熱多者獨活柴胡湯并治風痰藥若
下多氣虛極暈昏不知人息欲絕暈不止則殺人若作
暗風治之謬矣但服清魂散自愈

方

陳橘皮湯 治產後惡血下多氣虛頭目眩眩沉沉默
默不省人事調氣益血

陳橘皮

去白炒

白朮

切炒

人參

甘草

炙

黃耆

剉

酸石榴皮

洗切

熟乾地黄

各半兩

右粗篩分作三劑每劑用水五盞加生姜五片棗五

枚擘同煎至三盞去滓時服一盞稍熱服

未漚麻聖惠方治產後預防百病喫醋墨了便服此神效

未漚麻一握去土一尺已上取枝及時陰乾赤芍藥二兩芎藭三分

當歸三分剉甘草三分炙茯苓三分陳橘皮一兩湯浸去白炒

亂髮一兩半

右搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分約煎至五分次入酒二合更煎三五沸去滓溫服

治血暈至急宜服白瓷藥散聖惠方

用白瓷藥燒令通赤承熱搗研令細不計時候以溫

酒調下一錢

當歸湯 治產後敗血不盡衝心迷悶旋暈不語

當歸切焙芍藥 桂去粗皮生乾地黄微炒炙一分

牛膝去苗酒浸切焙獨活去蘆頭劉寄奴各半兩

右粗篩每服三錢水一盞入生薑五片煎至七分去

滓溫服不拘時候

毒瑁散 治產後則血不下上衝心腹疼痛

毒瑁

鎔三分

蒲黃

琥珀

別研如粉

好墨

牡丹

去心各半兩

赤龍鱗

燒灰即鯉魚皮

延胡索

當歸

微炙

芍藥

各三兩

右為散每服二錢用煖生薑酒調下淡醋湯亦得不

拘時候服之

荷葉湯 治產後血暈悶絕唇口青色不省覺者宜先

用生鷄子清一枚打勻口灌入即定却服此方

荷葉蒂

七枚

蘇枋木

剉碎三分

牛膝

去苗切焙乾

延胡索

各半兩

芍藥

半兩

右粗搗篩每服三錢水酒共一盞煎至六分去滓溫服如暈甚不省拘開口灌之

敗醬湯 治產後惡血結聚血氣衝心暈垂死者

敗醬

羌活

去蘆頭

當歸

微炙切

芍藥

芎藭

瞿麥

用蔥子各一兩

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒黃色三十枚

枳殼

去穰麩炒黃

桂

去粗皮各三分

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓下馬牙

硝半錢更煎數沸溫服空心相次再服利三二行惡血下為効

延胡索湯 治產後血暈

延胡索 芍藥 各一兩 生乾地黄 二兩 牛膝 去苗 當歸 切焙

人參 各二兩半

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓入白蜜一匙許更煎令沸溫服相次再服

琥珀煎 治產後血暈無問冷熱悉主之

琥珀

一兩判研末

生地黄汁

一盞生薑汁

一盞

右先取地黄生薑汁二味相和緩火煎去一半別下無灰酒一盞又煎候如稀餳方取琥珀末入煎中熟攪置於瓷器中空心取半匙溫酒調服

紅藍花湯 治產後血下少暈悶嘔逆

紅藍花

蘇枋木

各半兩判

右粗搗篩每服三錢水一盞煎取七分去滓溫服相

次再服

芍藥湯

出大全良方

治產後血暈心悶不識人言語錯亂少

氣者

芍藥

分一生乾地黄

焙

甘草

炙令赤

丹參

半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑一分切碎同煎至

七分去滓下白蜜少許再煎令沸溫服相次更服

當歸飲

治產後血暈欲絕

當歸

微炙一兩

鬼箭羽

二兩

右粗搗篩每服三錢酒一盞煎至六分去滓溫服相

次再服

延胡索散 治產後血暈不識人

延胡索 劉寄奴 當歸微炙各一兩

右為散以溫酒二錢服之須臾便下

芍藥湯 治產後血暈絕不識人

芍藥半兩 亂髮一兩
末 燒灰

右相和研令勻每服二錢以熱酒調溫服之須臾再服立效

地黄湯 治產後血暈心悶不識人神言鬼語氣急欲

絕方見本門惡露不下盡類

又方出大全良方

荷葉三枚炙真蒲黃兩生地黄汁半升白蜜一匙甘草二兩

右細切以水三升煮取一升去滓入蒲黃蜜地黄汁

煖服立愈妙

赤馬通飲子出聖惠方治產後血暈狂語不識人狂亂

童子小便合五生地黄汁合一赤馬通七枚紅雪八分