

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷一百五



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

證治準繩卷一百五

外科

寒熱往來

果消毒散加威法

口苦

明 王肯堂 撰

熱往來肝火血虛也去

熱往來肝火氣虛也加

湯加炒山梔炒酸棗仁

欽定四庫全書

證治準繩

酒炒黑龍膽草

體倦寒熱往來肝脾氣滯也去三

味加參芪歸朮如不應暫用補中益氣湯

內熱晡

熱或寒熱往來陰血虛也去三味加芍歸牡丹皮柴

胡如不應暫用八珍湯加牡丹皮

畏寒或寒熱往

來胃氣虛也去三味加參苓白朮升麻如不應暫用

補中益氣湯

脇痛痞滿或寒熱往來肝氣滯也去

三味加青皮木香如不應屬氣血虛也更加芍歸參

朮若婦人勞役恚怒或適經行發熱譫語或夜間

熱甚乃熱入血室也去三味加生地丹皮柴胡如不應暫用加味四物湯

厥逆

加減托裏消毒散 治四肢逆冷乃腎氣虛寒也去三味加桂附仍佐以八味丸

面目浮腫

癰疽聲嘶色敗唇鼻青赤面目浮腫宜調胃白朮散

調胃白朮散

白朮

炒

茯苓

各二錢

陳皮

白芍藥

炒

檳榔

澤瀉

各一錢

木香

五分

右一劑水二鍾薑三片煎八分食後服如腫不退加

白朮

炒

枳實

各一錢

薛按前症乃七惡也用此方若濕除氣少退用六君

子湯參苓白朮散之類大便不實尤効再用檳榔木

香恐傷真氣也亦有真氣虛而致前症者尤不宜用

二藥

陽氣脫陷

薛瘡瘍陽氣脫陷或因尅伐之劑或因膿血太泄或因吐瀉之後或因誤而入房若發熱頭痛小便淋瀝或滑數便血目赤煩喘自汗發熱氣短頭暈體倦熱渴意欲飲水投水惡寒憎寒身熱惡衣揚手擲足汗出如水腰背反張鄭聲不絕此無根虛火之假熱症若畏寒頭痛咳逆嘔吐耳聾目矇小便遺難瀉利腸鳴裏急腹痛玉莖短縮冷汗時出齒牙浮動肢體麻痺或厥冷身痛或

咬舌嚙唇舌根強硬此陽氣脫陷之真寒證皆勿論其脈勿論其瘡但見一二急用參附湯補之多有復生者大凡潰後勞役元氣虧損或夢遺精脫或滑數便血或外邪乘之或誤用寒涼氣血脫陷而致斯症治以前藥亦有復生者 內翰楊皐湖孟夏患背疽服尅伐之劑二旬餘矣漫腫堅硬重如負石隔蒜灸五十餘壯背遂輕以六君加砂仁二劑涎沫涌出飲食愈少此脾虛陽氣脫陷劑用溫補反嘔不食仍用前藥作大劑加附子

薑桂又不應遂以參芪各一斤歸朮陳皮各半斤附子
一兩煎服三日而盡流涎頓止腐肉頓潰飲食頓進再
用薑桂等藥托裏健脾腐脫而瘡愈矣 少叅史南湖

之內夏患疽不起發脈大而無力發熱作渴自汗盜汗
用參芪大補之劑益加手足逆冷大便不寬喘促時嘔
脈微細按之如無惟大衝不絕仍以參芪白朮當歸茯
苓陳皮計斤許加附子五錢水煎兩鍾作一服諸症頓
退脈息頓復翌日瘡起而潰仍用前藥四劑後日用托

裏藥調理兩月餘而消 一婦卧牀十三年矣遭回祿
益加憂鬱明年三月右肩下發一塊焮腫如甌中赤外
白先用涼藥一劑不解次用十宣散四劑加痛略紅迎
醫視之連投參芪丁桂防芷之劑膿潰云無恙矣辭去
眩暈嘔逆惡寒戰慄頂陷膿清偶檢外科發揮發背門
云若初起一頭如黍不腫不赤煩躁便秘四五日間生
頭不計其數瘡口各如含一粟名曰蓮房發云云始駭
為惡症治法雖詳不諳於行迎薛至診云辛涼解散氣

血兩虛者忌之連投參芪歸朮地黃薑附大劑腫高膿稠兼紅烏金膏數日果腐落筋如脂膜者數片人參每服至八錢日進二服逾兩月平復

附子理中湯

治瘡瘍脾胃虛寒或誤行攻伐手足厥

冷飲食不入或腸鳴腹痛嘔逆吐瀉

附子

人參

茯苓

白芍藥

各三錢

白朮

四錢

右水煎服

薑附湯

治瘡瘍真陽虧損或誤行汗下或膿血出多

失於補托以致上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈

人參

附子

炮去皮臍
各一兩

乾薑

炮

白朮

各五錢

右作二劑水煎服

參附湯

治失血過多或膿瘀大泄或寒涼汗下真陽

脫陷上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈等症急服以救

元氣緩則不治

人參

一兩附子

炮去皮臍
五錢

右薑五片水煎服不應倍之

內癰

素問曰肝滿腎滿肺滿皆實即為腫

王注云滿謂脈氣滿實腫謂癰腫

肺之癰喘而兩胠滿

仲景云肺癰吐膿如米粥咽燥振寒

肝癰兩胠滿卧

則驚不得小便

腎癰脚下至小腹滿

大奇論林億云脚下當作胠下

千金云腸癰之為病小腹腫強按則痛便數似淋仲景云腸癰小腹痞堅蓋小腹痛而痞堅者腎癰也小便數而似淋者腸癰也即肺癰肝癰之屬

辨藏府內瘡

中府隱隱痛者肺疽

其上肉微起者肺癰

巨闕隱隱痛者心疽

其上肉微起者心癰

期門隱隱痛者肝疽

其上肉微起者肝癰

章門隱隱痛者脾疽

其上肉微起者脾癰

京門隱隱痛者腎疽

其上肉微起者腎癰

中脘隱隱痛者胃疽

其上肉微起者胃癰

天樞隱隱痛大腸疽

其上肉微起大腸癰

丹田隱隱痛三焦疽

其上肉微起三焦癰

關元隱隱痛小腸疽

其上肉微起小腸癰

懷忠丹 治內癰有敗膿敗血腥穢殊甚所致臍腹冷痛用此推膿下血

白芷 單葉紅蜀葵花根

各一兩

白礬

枯

白芍藥

各五

錢

右研為末鎔黃臘丸如梧子大空心米湯下三十丸推膿下血出盡後服十宣散補之忌發物

又方猪膏煎鯽魚食治瘍癰又方以鼈甲燒存性末服之

肺癰丹溪云癰疽發於內者肺癰肝癰腎癰腸癰囊內癰附骨癰惟肺癰須先解表今表而出之

千金欬唾膿血其脈數實者為肺癰若口中欬即胃中
隱痛脈反滑數此肺癰也 問曰病者欬逆何以知其
肺癰當有膿血吐之則死其脈何如曰寸脈微而數微
為風數為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入
熱逼於榮吸氣不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於衛其
人則欬口乾喘滿咽燥不渴多吐濁沫時時振寒熱之
所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿成則
死 問曰振寒發熱寸脈滑數其人飲食起居如故此

為癰腫醫反不知以傷寒治之不應何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胸中者為肺癰其脈數欬吐有膿血設膿未成其脈自數緊去但數為膿已成也 薛夫肺者五臟之華蓋也處於胸中主於氣候於皮毛勞傷氣血腠理不密外邪所乘內感於肺或入房過度腎水虧損虛火上炎或醇酒炙煇辛辣厚味薰蒸於肺或咳唾痰涎汗下過度重亡津液之所致也其候惡風咳嗽鼻塞項強胸脇脹滿呼吸不利咽燥作