

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷九十五



北京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

證治準繩

如科

脈臟

飲食

脈臟

明 王肯堂 撰

曰寸口脈浮而大按

承氣湯傷寒然同一

欽定四庫全書

證治準繩

發熱不傷食者惟肚腹之熱為甚且糞極酸臭夜間潮熱尤傷積之明驗也 小兒宿食不消者胃納水谷而脾化之兒幼不知樽節胃之所納脾氣不足以勝之故不消也神麴麥芽之屬皆腐化之物昔賢已謂能傷胃中生發之氣矣況進而三稜莪朮乎況又進而牽牛大黃巴豆乎脾氣一受傷於食再受傷於藥至於下之而氣已一脫矣所存幾何故夫尅食之藥不可多用下積之藥尤不可不審其證之可下與不得不下而後用也

錢氏論食不消脾胃冷故不能消化當補脾益黃散
主之

保和丸 治飲食停滯胸膈痞滿噯氣吞酸或吐瀉腹

痛即加白朮一兩神麴炒山查 半夏 茯苓各一兩陳

皮 連翹 蘿蔔子炒五錢

右為末粥丸桐子大每服三十九丸白湯下

愚按前方行氣尅滯之劑若元氣無虧暴停乳食而
致斯證者宜用此消導之若元氣虛弱而乳食所傷

者必調補胃氣為主而佐以消導若乳食已消而作嘔者乃胃氣被傷當用異功散補之不宜仍用前藥重損胃氣治者審之

木香大安丸

木香錢二黃連 陳皮 白朮錢各三枳實 山楂肉

萊菔子炒連翹 神麴炒麥蘖炒砂仁錢各一

右為末神麴糊為丸陳廩米湯下

消食丸

又名消乳丸

治宿食不消

砂仁 陳皮炒 三稜炒 神麴炒 麥芽炒 香附炒
半兩

兩

右末麵糊丸如麻子大食後白湯送下大小加減

七聖丸

三稜 蓬朮 川棟 青皮 陳皮 芫花 杏

仁

右件等分先用醋浸芫花一宿炒漸乾次入蓬朮同炒赤色又入陳練等再同炒一處令微焦取出為末前

藥如各半兩杏仁亦用半兩湯浸去皮尖雙仁不用
細研入巴豆二十粒去油和勻醋糊丸如黍米大一
歲兒常服二丸臨卧溫熱湯送下使日間所殮之物
一夜而化永無疳疾能使黃瘦子頓作化生兒今之
小兒可去巴豆只入杏仁名七聖丸是也

三稜散 主諸般停滯疳積發熱瀉痢酸醜水穀不化
常服和脾胃進飲食長肌肉益神氣

人參

去蘆七錢半

三稜

炮

淨香附

各一兩半

青皮

去目

益智仁

陳皮去白枳殼去穰剉片神麴炒穀芽洗焙半夏製莪朮

醋煮透濾乾剉焙大黃半生半炮紫蘓去老梗各半兩甘草半生半炙一兩二錢

右碎每服二錢水一盞薑三片倉米百粒煎七分無

時溫服氣虛者加白茯苓一兩

莪朮丸 和脾益胃消進飲食寬膈快氣悅色清神

莪朮剉三稜剉淨香附三味各四兩醇醋浸七日慢火煮乾再焙檳榔

一兩生牽牛末另研青木香去蘆穀芽淨洗焙乾青皮去白

各半華澄茄 丁香 南木香各四錢

右除檳榔丁香木香不過火及牽牛末餘七味判焙
仍同檳榔木香丁香為末臨入牽牛末和勻水煮麪
糊丸菜豆大每服三十丸至五十丸無時用淡薑湯
下溫茶溫酒皆好兒小者丸粟米大粒數下法如前

丁香脾積丸

三稜煨去皮毛 莪朮去皮炒 神麪炒各七錢 青皮 巴豆霜

小茴香炒 陳皮各五錢 丁香 木香各三錢

右為細末醋調神麪糊為丸如菜豆大每服五七丸

生薑湯下

三黃枳朮丸 治傷肉溫麤辛辣味厚之物致填塞悶

亂不快

枳實

麤炒五錢

黃連

酒浸炒

大黃

濕紙裏煨

白朮

各一兩

黃芩

五錢

右為末湯浸蒸餅為丸如棗豆大每服五十九白湯下臨時量所傷多少加減服之

聖惠訶梨勒散 治小兒宿食不化少欲飲食四肢消

瘦腹脇多脹

訶梨勒皮

三人分

白朮

麥蘖

炒令

微黃陳橘皮去白檳榔各半兩甘草一分炙

右件藥搥

粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量

兒大小分減溫服日四五服

朱氏木香丸 治小兒氣開胃進食

木香 人參 白茯苓 青皮 陳皮 肉豆蔻

各一分三稜一兩炮

右為末麵糊丸麻子大每服十九薑湯下

朱氏洗心散 治小兒乳食傷心作壯熱喘息不調咳

嗽多睡

甘草

生一錢

麥門冬

半一分

皂角

半兩入沙糖塗酥炙後於盆下蓋良久出

火毒方用

右爛杵不羅每服二錢水一盞煎至八分作五服時

時喫

養脾丸

人參

白朮

當歸

川芎

錢各一

木香

青皮

黃連

陳皮

錢各一

砂仁

山查肉

神麴

炒

麥芽

炒各
五分

右為細末水調神麴糊丸如麻子大每服三五十丸

陳倉米飲下

食積寒熱薛小兒食積者因脾胃虛寒乳食不化久而
成積其證至夜發熱天明復涼腹痛膨脹嘔吐吞酸足
冷肚熱喜睡神昏大便酸臭是也有前證而兼寒熱者
名曰食積寒熱若食在胃之上口者吐之胃之下口者消
之腹痛痞脹按之益痛者下之下後仍痛按之則止者

補之夾食傷寒者先散之用參蘓飲熱甚便秘者先利
之用大柴胡湯如無外感但只傷食不至於甚保和丸
調之蓋脾為至陰之藏也故凡脾病者至夜必熱熱而
兼寒則又見所勝者侮所不勝矣食未消者消之則寒
熱自止食既消者補之則寒熱自痊若手足並冷喜熱
飲食此中州虛寒也宜溫之大便欲去不去脾氣下陷
故也升之若夜間或侵晨泄瀉者脾腎俱虛也用四神
丸濕手足並熱作渴飲水者脾胃實熱也用瀉黃散脾

大便秘結用大柴胡湯

潮熱

手足雖熱口不作渴大便不

實者用白朮散

渴

仍參腹痛腹脹積痛積滯治之

食積痢曾有食飽傷脾脾氣稍虛物難消化留而成積

積敗為痢腹肚微痛先調胃氣次理積却止痢則病根

自除和中散

吐瀉

理虛養胃三稜散

見前

烏犀丸

積助

脾化積沉香檳榔丸

積

守中湯

濕

進食止痢仍忌生冷

粘膩等物不致復作

千金治小兒食不知饑飽方

用鼠屎二七枚燒為末服之

痞結

此痞在腹內與心下之痞不同

楊痞者塞也結者實也熱氣蘊於胸膈之間留飲聚於腹脇之內於是榮衛不能流行藏府不能宣通由脹滿而致痞結勢使然耳此熱實之證也時或發為壯熱聖惠甘遂散主之此藥治小兒痞結雖服湯藥時暫得利而滯實不去心下胗脹按之即啼內有伏熱諸候併成此疾宜疎利大便破結散氣後宜常服進食丸 按進