

欽定四庫全書

子部

外臺秘要方卷三十六



南京中医药大学图书馆版权所有

外臺秘要方

外臺秘要方

石膏湯方

珍珠煮取一升去滓

唐 王燾 撰

石膏湯方

珍珠煮取一升去滓

又療少小中風脉浮發熱自汗出項強鼻鳴乾嘔方

甘草

炙

芍藥

桂心

生薑

各一兩

大棗

四枚

右五味切以水三升煮取一升去滓分溫三服忌如

常法

此張仲景桂枝湯但劑分小爾

又療少小新生中風二物驢毛散方

驢毛

鬐頭毛一把

生麝香

大豆許二枚

右藥以乳汁和於銅器中微火上煎令焦熟出研末

之小兒不能飲以乳汁和之於箠竹筒中盛寫入咽
中然後飲乳汁令入腹

又療少小新生肌膚幼弱喜為風邪所中身體壯熱或
中大風手足驚掣五物甘草等生摩膏方

甘草

防風

各一兩

白朮

桔梗

各二銖

雷丸

二兩半

右藥切以不中水猪脂一斤煎取成膏合諸藥於微
火上煎之消息視之凝膏成去滓取如彈丸大一枚

炙手以摩兒百過寒者更熱熱者更寒小兒雖無病
常以少膏摩顙上及手足心甚辟風寒良

翼同並出
第五卷中

小兒欬嗽方八首

小品療少小欬嗽腹脹七物小五味子湯方

五味子

碎

紫苑

各一分

黃芩

甘草

炙

麻黃

去節

生薑

桂心

各一分

右藥吹咀以水一升煮取七合分五服忌如常法

又療少小欬嗽晝差夜甚初不得息不能復啼四物欬

冬丸方

款冬花

紫苑

各一兩半

伏龍肝

一分

桂心

二分

右藥搗篩蜜和如泥取如棗核大塗乳頭令兒飲之

日三

千金同

又療少小十日以上至五十日卒得暴欬吐乳嘔逆晝夜不得息四物湯方

桔梗

紫苑

各三分

甘草

炙一分

麥門冬

七分

去心

右藥切以水一升煮取六合去滓分五服以差為度

千金有桂心無桔梗以水二升煮取一升以綿著湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過節哺乳

又療小兒中冷及傷寒暴欬嗽或上氣咽喉鳴氣逆者

或惡寒鼻塞清水出紫菀湯方

紫菀

杏仁

去皮尖

甘草

炙

黃芩

麻黃

去節

橘皮

桂心

青木香

當歸

各一兩

大黃

三分

右十味切以水三升煮取九合去滓一歲以上至五

歲兒以意量之分服千金云兒六十餘日至百日一服二合半百餘日至二百日一

服三合
餘同

千金療少小欬嗽八物生薑煎方

生薑七兩

乾薑四兩

桂心二兩

甘草三兩

杏仁一升去尖皮

款冬花

紫苑各三兩

蜜一升

右藥末之以蜜合諸藥微火煎之使如飴餹量其大

小多少與兒含咽之百日小兒含如棗核許日四五

甚良
出第五卷中

備急療少小欬嗽上氣杏仁湯方

麻黃

八分
去節

杏仁

四十枚
去尖

右二味切以水一升煮取七合去滓分服百日小兒患熱氣急不得服小便赤黃服之甚良大人孩童以意量之忌如常法

又療少小欬嗽方

紫菀

六分

貝母

三分

款冬花

一分

右三味搗為散取豆許著乳頭令兒飲之日三妳母

忌如常法

劉氏療小兒欬嗽不得卧方

甘草 六分

桔梗 四分

桑白皮

貝母

茯苓 各三分

大青

吳藍

五味子

人參 各二分

右九味切以水二升煮取八合去滓量多少大小與

服忌如常法

小兒欬逆上氣方七首

千金杏仁丸主大人小兒欬逆上氣方

杏仁 三升

右一味熟搗如膏蜜一升分為三分以一分內杏仁
搗合強更內一分搗之如膏又內一分搗熟止先食
含之咽汁量其多少日三每可半方寸不得過也
又射干湯主小兒欬逆喘息如水雞聲方

射干 二兩

麻黃 去節

紫苑

甘草 炙

生薑

各一兩

桂心 五寸

半夏

五枚洗

大棗

二十枚去

核

右八味切以水七升煮取一升半內蜜五合去滓分
溫服二合忌飴羊肉生葱

又方

半夏

洗四兩

生薑

三兩

桂心

紫菀

細辛

阿膠

各二兩

甘草

炙二兩

款冬花

二合

蜜

一合

右九味切以水一斗先煮半夏取六升去滓內諸藥

煮取二升五合去滓兩歲兒飲六合五歲兒飲一升
量大小多少加減之

又五味湯主小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘迫晝夜
不息食則吐不下方

五味子 二分 麻黃 去節 一分 當歸 二分 人參 一分

細辛 半分 乾薑 一分 桂心 一分 紫苑 一分

款冬花 半分 甘草 炙 一分 大黃 六分

右十一味切以水二升半煮取九合去滓兒六十日

至百日服二合半百日餘至二百日一服三合

一方無款

冬大黃有大棗三枚出第五卷中通按食則吐乃吐食也不下不大便也故用大黃以下之氣降而吐自止

喘自定

千金翼療小兒寒熱欬逆膈中有澀乳吐不欲食方

乾地黄

四兩

麥門冬

半升去心

五味子

五合

大黃

硝石

各一兩

蜜

半升

右六味切以水三升煮取一升去滓內硝石蜜煮令

沸服二合日三胷中當有宿乳一升許出兒大者服

五合

又療小兒大人欬逆短氣胸中吸吸呵出涕唾嗽出臭

膿方

燒淡竹瀝煮二十沸一服一合日五服大人服一

升不妨食息乳哺

並出第十一卷中

劉氏療小兒上氣急滿坐卧不得方

鼈甲

一兩炙令極熟擣為末

燈心

一握

右二味以水二升煎取八合以意量之與服

小兒傷寒方三首

千金論曰夫小兒未能冒涉霜雪乃不病傷寒也大人解脫之久傷於寒冷則不論耳然天行非節之氣其亦得之有時行疾疫之年小兒出腹便患斑者也治其時行節度故如大人法但用藥分劑少異藥小冷耳又療小兒傷寒方

生葛汁

淡竹瀝

各六分

右二味相和二三歲兒分三服不宜煮生服佳

又療少小未滿百日傷寒臍血身熱嘔逆麥門冬湯方

麥門冬

三分

桂心

八銖

寒水石

石膏

碎

甘草

炙各二分

右五味切以水二升半煮取一升分服一合日三

又療少小傷寒芍藥四物解肌湯方

芍藥

黃芩

升麻

葛根

各二分

右藥切以水二升煮取九合去滓分四服期歲以上

分三服

並出第五卷中