

淋胞痺

淋之爲病嘗觀病源候論謂由腎虛而膀胱熱也膀胱與腎爲表裏俱主水水入小腸與胞行於陰爲溲便也若飲食不節喜怒不時虛實不調藏府不和致腎虛而膀胱熱腎虛則小便數膀胱熱則水下澀數而且濇則淋瀝不宜故謂之淋其狀小腹弦急痛引於臍小便出少氣數及分石淋勞淋血淋氣淋膏淋冷淋其石淋者有如沙石勞淋者勞倦卽發血淋者心主血氣通小腸熱甚則搏於血脉血得熱則宣洩入胞中與溲俱下膏淋者肥液若脂膏又名肉瀝

淋者胞內氣脹小腹堅滿出少喜數尿有餘瀝冷淋者冷氣客於下焦邪正交爭滿於胞內水道不宣先寒戰然後便數成淋可謂悉病情矣考之內經則淋病之因又不止此大綱有曰濕曰熱謂太陰作初氣病中熱脹脾受積濕之氣小便黃赤甚則淋少陽作二氣風火鬱於上而熱其病淋蓋五藏六府十二經脈氣皆相通移是故足太陽主表上行則統諸陽之氣下行則入膀胱又肺者通調水道下輸膀胱脾胃消化水穀或在表在上在中凡有熱則水液皆熱轉輸下之然後膀胱得之而熱矣且小腸是心之府

主熱者也其水必自小腸滲入膀胱胞中諸熱應於
心者其小腸必熱胞受其熱經謂胞移熱於膀胱者
則癰溺血是也由此而言初起之熱邪不一其因皆
得傳於膀胱而成淋若不先治其所起之本止從未
流胞中之熱施治未爲善也予嘗思之淋病必由熱
甚生濕濕生則水液渾凝結而爲淋不獨此也更
有人服金石藥者入房太甚敗精流入胞中及飲食痰
積滲入者則皆成淋丹溪嘗治一兒在胎受久服
金石藥之餘毒病淋一劑五年以苦寒雪治愈凡治病
不求其本可乎小便澀痛常急欲溺及去點滴莖

淋

準繩六

五十一 竹荷室

中痛不可忍者此五淋病生料五苓散加阿膠或車
前子末或五苓散益元散等分和服並可吞火府丹
佐以導赤散石葦散若熱極成淋服藥不効者宜
減桂五苓散加木通滑石燈心瞿麥各少許仍研麥
門冬草連根車前草白龍草各自煎汁和蜜水調下
氣淋氣壅不通小便淋結臍下妨悶疼痛瞿麥湯
石葦散榆枝湯木香流氣飲氣虛淋八物湯加杜
牛膝黃芩汁煎服老人氣虛亦能淋參朮中加木通
山梔血受傷者補血行血白入惡勿作淋治死血
作淋牛膝膏妙但虛人能損胃小宜食千金云用

牛膝以酒煮服治小便淋痛

肘後方用牛膝根莖

亦以酒煮服治小便不利莖

干痛欲死及治婦人血

結堅痛如神蓋牛膝治淋之

聖藥也但虛人當用補

劑監制之耳

血淋用側柏

葉生藕節車前草等分

搗汁調益元散立効散瞿麥散

小蘗飲子柿蒂散當

歸湯羚羊角飲雞蘇飲子金黃

散髮灰散

戴氏云

血淋一證須看血色分冷熱色

鮮者心小腸實熱色

瘀者腎膀胱虛冷若的是冷淋

及下元虛冷血色瘀

者並宜漢椒根剉碎不以多少

白水煎候冷進按血

多有熱極兼水化而黑凝者未可

便以爲冷也

膏

淋鹿角霜丸沉香散沉香丸磁石丸海金砂散鬼絲
丸戴云有似淋非淋小便色如米泔或便中有如
鼻涕之狀此乃精溺俱出精塞溺道故便欲出不能
而痛宜大兔絲子丸鹿茸丸之類按此卽膏淋也
沙石淋乃是膀胱蓄熱而成正如溺瓶久在火中底
結白碱而不能去理宜清徹積熱使水道通則沙石
出而可愈宜神效琥珀散如聖散燕丸獨聖散
石首魚腦骨十箇火煨滑石二錢琥珀三分俱爲細
末每服一錢空心煎木通湯調下鼈甲丸肋者一
箇酥炙令脆爲細末每服一匙酒煎服當下沙石

雄鵲燒灰淋取汁飲之石卽下 石淋小便時沙石
下流塞其水道痛不可忍經及時日水道不通其氣
上攻頭痛面腫重則四肢八節俱腫其石大者如梅
核堅硬如有稜角其石小者唯碎石相結通下卽碎
宜服此取石方用冬葵子滑石射干知母已上各一
分通草三分爲細末每服二錢半水一盞半苦竹葉
十片同煎取一盞去滓食前熱服又大府熱頭痛若
體氣壯健先進後方藥兩三盞然後進取石方用麻
黃去節羌活射干荆芥穗紫苑防風知母蔓荆子牽
牛各一分半夏二銖爲細末每服二錢水一盞煎九

分去滓食後熱服 石淋導水用蠅蛭七枚以鹽一兩同於新瓦上鋪蓋焙乾研爲細末每服一錢七溫酒調服 勞淋地黃丸黃芪湯白芍藥丸 冷淋肉蓯蓉丸澤瀉散沉香散檳榔散生附散戴氏云進冷劑愈甚者此是冷淋宜地髓湯下附子八味丸有因服五苓散等藥不効用生料鹿茸丸却愈此皆下元虛冷之故乃劉河間則謂亦由熱客膀胱鬱結不能滲泄非真冷也 小便淋莖中痛不可忍相引脇下痛宜參苓琥珀湯 有小便艱澀如淋不痛而痒者虛證也宜八味丸生料鹿茸丸之類若因思慮過度

致淋宜歸脾湯或辰砂妙香散吞威喜丸或妙香散
和五苓散 汗多而小便赤澀暑月多有此證盛暑
所飲既多小便反澀少而赤緣上停爲飲外發爲汗
津液不通小腸澀閉則水不運下五苓散一名導逆
內有朮桂收汗猪苓澤瀉茯苓分水道收其在外者
使之內又從而利導焉發者歛之壅者通之義取於
此然有虛勞汗多而赤澀者却是五內枯燥滋映旣
去不能生津故溺澀而赤不宜過用通小便之劑竭
其腎水唯當溫養潤肺十全大補湯養榮湯之類自
足選用汗者心液心主血血榮則心得所養汗止津

生不待通而溺自清矣諸失精血及患癰毒人或
小便赤澀之證此亦是枯竭不潤之故並宜前法

胞痺

痺論云小腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於

小便上爲清涕夫膀胱者州都之官津液藏焉氣化
則能出矣今風寒濕邪氣客於胞中則氣不能化出
故胞滿而水道不通其證小腹膀胱按之內痛若沃
以湯澀於小便以足太陽經其直行者上交巔入絡
腦下灌鼻竅則爲清涕也 腎著湯 茯苓 朮 巴

戟 朮

腎澀湯

姪娠淋

乃腎與膀胱虛熱不能制水然姪婦胞繫

於腎腎間虛熱而成斯證甚者心煩悶亂名曰子淋
也若頸項筋攣語澹痰甚用羚羊角散若小便澹
少淋瀝用安榮散若肝經濕熱用龍膽瀉肝湯
若肝經虛熱用加味逍遙散若腿足轉筋而小便不
利急用八味丸緩則不救若服燥劑而小便頻數
或不利用生地茯苓牛膝黃蘗知母芍藥甘草若
頻數而色黃用四物加黃蘗知母五味麥門元參
若肺氣虛而短少用補中益氣加山藥麥門若陰
挺痿痺而頻數用地黃丸若熱結膀胱而不利用
五淋散若脾肺燥不能化生宜黃芩清肺飲若

膀胱陰虛湯無所生用滋腎丸 若膀胱陽虛陰無
所化用腎氣丸

產後淋 因熱客於脬虛則頻數熱則澀痛氣虛兼
熱血入胞中則血隨小便出而爲血淋也 若膀胱
虛熱用六味丸 若陰虛而陽無以化用滋陰腎氣
丸蓋土生金金生水當滋化源 陳氏云治產前後
淋其法不同產前當安胎產後當去血在麥蒲黃最
爲產後要藥 黃根湯主治產後諸淋

診 腎脉滑實爲癰瘡 痺脉滑甚爲癰癰 少陰

脉數婦人則陰中生瘡男子則氣淋 盛大而實者

生虛小而澀者死 下焦氣血乾者死 鼻頭色黃
者小便難 素問奇病論病有癰者一日數十溲此
不足也身熱如炭頸膺如格人迎躁盛喘息氣逆此
有餘也太陰脉細微如髮者此不足也其病安在名
爲何病岐伯曰病在太陰其盛在胃頗在肺病名曰
厥死不治

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

海濱不命

小便數

運氣小便數皆屬火經云少陽之復便數憎風是也
小便數唯二藏有之一屬肺經云肺手太陰之脉氣
盛有餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠是也
以刺言之瀉手太陰則愈一屬肝經云足厥陰之瘡
令人如癰狀而小便不利又云肝痺者夜卧則驚多
飲數小便便是也視虛實補瀉之則愈 數而少茯苓
琥珀湯利之 數而多薯蕷蓮肉益智仁之屬收之
生薯蕷半斤刮去皮以刀切碎於鍋中煮酒沸下
薯蕷不得攪待熟加鹽葱白更添酒空腹下二三盞

妙 蓮肉去皮不以多少用好酒浸一兩宿猪肚一箇將酒浸蓮肉入肚中多半爲度水煮熟取出蓮肉切焙乾爲細末酒煮麴糊爲丸如芡實大每服五十丸食前米飲湯下名水芝丸 夜多小便益智二十四箇爲末鹽五分水一盞煎八分臨卧溫服 衛真湯并丸 桑螵蛸散 戴氏云小便多者乃下元虛冷腎不攝水以致滲泄宜兔絲子丸八味丸元兔丹生料鹿茸丸 有人每日從早至午前定尿四次一日之間又自無事此腎虛所致亦猶脾腎泄早泄而晚愈次日又復然者也 若小便常急徧數雖多而