

種痘新書卷之九

痘後辨症賦

痘結痂皮雖生意已成其八九餘毒未消而變症正慮其多端
是以服合腹脹猶爲危候虛浮不退尙是凶機痂或成而反致
失聲前疔恐爲黑靨腫未消而眼已先開眼開疑是內攻疔氣
極而狂叫喘呼胆胃傷而嘔嘔不寧至于冷風人胃則利下膿
粘挾滲膀胱則小便溺血熱毒逗留不化痂結而壯熱增寒淫
絡各遺餘毒日晡而潮挾往來亢在午前爲實熱煩渴腮紅申

時方作是陰虛便調人靜他如撮唇弄舌心經熱盛何疑扶肚
抬胸肺胃毒中有準身熱燎人而便秘恐來暴急驚風飲攸潮
熱兼泄瀉久變慢脾風症驗喪目于眼合羞明辨口疳于唇焦
齒黑寔挾下注大腸必有秘結之禍虛寒客留臟腑乃成泄瀉
之疴喘渴須分虛實驗症切勿差訛欲覩痂落之餘再審痂痕
之色桃紅潤澤榮衛俱安紫黑乾枯尙留風熱粉白爲氣血之
虛過過也應深逝走馬狀牙疳之烈日餘亦見長驅遍休赤痂
乃是失於解利渾身青紫恐爲風寒所吹餘毒未消不特爲疽
爲癰見風太早恐其復發瘡痂此是先賢之秘訣愈向後學以

宣傳

痘後調治法

痘至十五六日靨齊其功已就至是雖可無虞第恐漿清痂薄致留餘毒爲殃餘毒若在肌膚是必爲痘爲癰疽癰旣形則毒不內攻此兒知其不喪雖綿延亦可全生若熱蘊肝經則目紅頭痛而眼合蓋明肺留餘熱則咳逆痰涎而瘡痕外著實熱下注大腸則大便或來膿血裏急後重致生痢痢之病餘熱若滲膀胱其必陰囊腫脹以致小便赤痛若夫口瘡腐爛齒血牙疳狐惑瘡生皆是胃經有毒至若驚搐狂言昏沉矇瞳弄舌撮唇悉是心家之熱經絡若留餘毒是以變生莫測總隨症以調治有熱則退其熱有風則去其風勿謂痘家之症遂膠固而不通

但用藥不宜太猛恐元氣難任寒涼良以大病之後氣血已耗
不惟病者必須慎其藥餌卽未病者亦宜謹其起居蓋洗浴太
早恐生浮腫冒犯風寒致生潮熱悞服食物致腹脹痛痘痕損
破乃病瘡瘕是以落痂之餘最要避風寒節飲食莫速梳頭莫
早洗浴不可出外行動不可忍飢過食熱物慎勿多食生冷切
須禁忌必待氣回血復精神如故臟腑安寧然後可以無虞
痘收結痂厚遲之三日自落者吉又痂色光潤其癍帶紅更無
他症飲食如常者吉 自食痘痂雖有他症任凶不凶

痘後雜症

潮熱

痘後發熱症有數端有氣血回元而熱者則悠悠潮熱不煩不渴不一二日氣還血復而熱自退矣不必服藥 又有痘後元虧或久坐久視勞動傷神而發熱者只須安息調養不必服藥 又有感冒風寒而發熱者必聲重鼻塞惡寒惡風宜川補中

益氣湯

人參

黃芪

白朮

茯苓

升麻

柴胡

炙草

熱甚則以升柴爲君加前胡有咳嗽加陳皮桔梗半夏南星炒
芩不過一二服其熱自退 又有餘毒攻作將發癰疽而潮熱

者必痘漿清痂薄熱而煩渴舌有黃苔遍身俱熱有一二處尤
熱甚者卽癰之所在也治此宜解餘毒精神旺者用 連喬飲

連喬

牛子

柴胡

前胡

當歸

赤芍

防風

荊芥

水通 車前 炒苓 炒連 出退 活石 甘草 弱者加

人參 黃芪 大便秘者加酒大黃 或頭目大痛者餘毒上

攻目疾將作也仍以連喬飲去木通車前活石加升麻桔梗以

芎藭荷白芷蒙花菊花 目紅去當歸加胆草紅花生地 但

必熱退痛止藥方可止然痘後元氣已虛解毒之藥必傷元氣

若毒清熱退即宜溫補以顧元神 又有氣血兩虛而熱者其

熱稍緩頭熱面不甚熱手足心熱手足背不熱精神怠倦大小

便利者乃虛熱也其熱多在午後改曰癸在午前爲實熱申時

方作是明虛治此宜用十全大補湯 又有餘毒不形疽癰而

特傳于肝肺而癰熱者晝夜不息舌有黃苔或十指攢縮以生

地 柴胡 白芍 炒苓 姜虫 勾藤 牛子 知母 一丹

皮 澤瀉 花粉 束皮 甘草 此必血燥皮紅

痂落不落

痂黑唇紅而舌有苔其身有熱者此餘熱傷殃而不落也宜用
調元化毒湯與服解其餘熱外用細茶猪膏共搗以消盛之邪
于痂上茶以解其熱膏以潤其燥其痂自落矣 若痂薄唇白
而舌無苔者此元虛而血不潤故不落也宜用人參 黃芪

當歸 炙草 虫退典服外用雞膏與茶潤之而自落也 又

有痘痂不落虛弱之甚昏沉不人事者用人參清補湯 人

參 黃芪 當歸 白朮 茯神 束仁 麥冬 陳皮 甘

草 又有痂乾陷入肌肉而不落者用乳香 一錢 醋粉 二錢 共

爲末用猪膏調敷 又或用麝糝燒灰馬齒莧汁和蜜調敷

又或過服辛熱而痂不落者用升麻 乾葛 防風

虫退以去肌熱而自落矣

瘡後發痒

抓破成瘡

此皆血熱之症宜用黃芩 黃柏 生 紫草 甘草 生 牛子 銀

花 生地 紅花共煎油搽之即愈

痘爛復瘡

致成瘡症

亦用前方與搽或用黃豆燒灰調油搽之亦可

癰白

此因漿清而血不足也宜用四物湯加白朮 陳皮 紅花

唇不蓋齒

此氣血兩虛而毒留脾胃也失治將變走馬牙疳宜用人參

當歸

赤芍

元支

牛子

連翹

石羔

石斛

甘草

玄參

坐立戰搖

此氣血虛也宜用八珍湯

飲食倍進

面赤喘急二便秘澀則內熱易于消燥也若不急治必生他

症宜以四順飲主之

大黃

酒制

當歸

芍藥

甘草

瘡後諸瘡

遍身肢節上生瘡者各爲疔蝕此因風寒相搏而氣血滯凝于
腠理而乃生是瘡也宜以前綿蜜散敷之自愈 又有見風太
早致成癰癰而出膿汁者燒乾牛糞敷之 又有痘風瘡者年

年至春即發宜用防風

荆芥

牛子

甘草

苦參

當歸

又或用

當歸

連翹

牛子

防風

荆芥

生地

赤

芍 紫草

甘草

蒼朮

川芎

薄荷與服外用黃丹

黃

柏一黃芩

大黃

輕粉共爲末以猪油調敷

再于風池曲

池三厘諸穴以火灸之則永不發矣

又有皮膚之間隱隱而

起者俗呼爲瘡此皆餘毒滯于皮膚而然也宜服解毒藥外用

漆樹訓問取其腹內之水洗之或用蜆壳煎水亦可蜆形加蚘
壳生魚池泥中凡割漆者必用此壳俗呼漆規其性涼而解毒
又有用活石一而甘草五斤共爲末調敷瘡上者名天水散
凡痘痂之後抓破出血遍身復灌膿漿或血風瘡每至春夏
南風一起其瘡復發秋冬自愈但不纏染他人者洛呼痘風瘡
也欲其不發須用火灸風池曲池三里諸穴內用苦參丸或花
蛇酒與服則永不發矣

又方一掃光治一切瘡疥 銅綠 白礬生 樟腦 流
黃 川椒 膽礬 梣子 白芷 水銀 錫 右方各等分
爲末另將錫融化入水銀攪勻然後人諸藥末調猪油敷上

苦參丸

苦參

炒枝

防風

只壳

玄參

獨活

黃連

黃芩

大黃

菊花

等分

共爲細末蜜調作丸如梧桐子大每服五十

丸

酒送下

花蛇酒

用白花蛇一條蒸米數升先放酒曲次將布袋盛蛇

貯子酒曲之上然後將蒸米與酒藥和均頓于蛇上用帛封缸

口候三七日開缸取酒將蛇去皮骨每服酒時配蛇全服再將

酒腳調苦參末爲丸服

愚謂只將蛇去其首置酒甕中入利

酒封固其口謾火煮熟俟數日取酒與蛇並服

瘰癧

瘡後忽然遍身青紫而發癰癰者蓋血氣既虛肌膚未固感風邪故如是也用虫退木一錢以生薑薄荷取汁調服令其發汗卽愈

赤火流丹

一片通紅從頭起者過心不治從足起者過腎卽死此惡毒暴發乘血橫行也宜內服 玄參 丹尾 紫草 紅花 石羔 連喬 赤芍 骨皮 車前 木通 防風 荊芥 淡竹葉 引外用馬蝗蜢三五條置紅腫處此去惡血以洩其毒乃不延去 又俗呼天虹唾余紅此症其小便赤澀乃用 玄參 紅

花 紫草 生地 防風 牛子 連喬 木通 車前 澤

渴 先苓 活石 甘草與服外用川三漆磨好京墨塗之先

用丸銼刺去毒血後用墨與三七塗之即愈

走馬牙疳

其先牙齒生痒時時出血繼而齲黑腐爛其齒新落或每日落一齒或一日旋落數齒滿口齒俱落盡乃死兄齒生痒即宜施

治此蓋胃經蓄熱所致宜用人參石羔牛子甘草石解與服以

解脾胃之毒再用石羔牛子連喬黃芩生地紫草蛇床枯礬甘

草煎水與噙即愈若牙齲腐爛則用蚕退散敷之 枯礬 三

人中白 即尿脚焙 五倍子 二 蚕退 洗一 蛇床子 二 共為

先用蜡螬虫蘸米泔水洗淨水洗淨腐垢惡血然後

之 又救苦散亦治牙疳 人中白煨 青黛五分 冰片一分 白

薑虫一錢 寒水石三錢 共為末敷之 又用薑虫丹皮甘草心

連喬心生地銀花桑白皮沙參茯苓炒柏等分煎服虛弱者加人參

唇口生瘡

上唇有瘡虫食其臟其名曰狐下唇有瘡虫食其肚其名曰惑皆由裏熱生虫內食臟腑以及于肛而外于唇之上下乃有瘡形也必其人昏昏好睡不思飲食其聲嚶啞而音不亮即狐惑也此最惡之候必致鼻崩齒落失聲而死宜用除隱丸治之

黃連二錢 蘆薈一錢 使君子肉三錢 白蘼蕪一錢 乾蟬五分 燒灰二分 川

練子肉 一錢

共爲末用烏梅洗淨去核搗爛和末爲丸米飲下

又有口舌生瘡赤者名赤口瘡此心脾蓄熱也白者名白口

瘡此心肺有熱也赤者用陰陽散白者用朱礬散 又通用洗

心散與服 又通名驚口瘡以驚涎洗淨卽驚涎煎水洗之亦

可必洗淨乃可敷藥亦有洗之卽愈者 又用地脾虫蘸米泔

水洗之者

陰陽散 黃連 三錢 乾薑 一錢 共爲末敷之

朱礬散 硃砂 二錢 白枯礬 一錢 共爲末敷之

洗心散 黃連 三錢 歸身 三錢 生地 三錢 木通 薄荷 牛子 連翹

桔梗 出痘水 煎服燈心湯引