



鼎鑊幼幼集成卷之三

咳嗽證治

帝曰肺之令人欬何也岐伯曰五臟六腑皆令人欬非獨肺也又曰邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背夫肺為華蓋口鼻相通息之出入氣之升降必由之路故專主氣經曰形寒飲冷則傷肺由兒衣太薄及冷飲之類傷於寒也經曰熱傷肺由兒衣太厚愛養過度傷於熱也又曰皮毛者肺之合皮毛先受邪氣邪氣得從其合使氣上而不下逆而不克收塞咽嗑故令咳嗽也凡有聲無痰謂之咳肺氣傷也有痰無聲謂之嗽脾淫動也有聲有痰謂之咳嗽初傷於肺繼動脾淫也在小兒由風寒乳食不慎而致病者尤多矣經曰五臟六腑皆令人欬然必臟腑各受其邪而與之要終不離乎肺也但因痰而嗽者痰為重主治在脾因咳而動痰者肺為重主治在肺以時而言之清晨咳者屬痰火午前嗽者屬腎火午後嗽者屬陰虛黃昏嗽者火浮於肺二更嗽者食積滯於三焦肺實者須嗽炮首面赤反食肺虛者氣逆虛鳴面面白飧泄肺熱者痰腥而稠身熱喘滿鼻乾而紅手捏眉目肺寒者嗽多痰清面白而喘惡風多涕故治者各因其虛實寒熱而調之斯無誤矣因於寒者則氣壅喘促聲濁而無汗鼻塞聲重參蘇飲微汗之咳而氣逆喘嗽面白有痰此肺本經病宜清肺飲咳其羣應丸微利之咳而喉中介介有聲面赤發熱心煩或咽喉痛聲啞者此肺病兼見心證宜清宣散咽喉痛沆濯湯咳而面黃體倦痰涎壅盛或吐痰或吐乳食此肺病兼見脾證大抵咳嗽屬脾肺者居多以肺主氣脾主痰故也宜橘皮湯咳而面青多怒痰涎壅盛而發搐者蓋因咳嗽聲不能轉所以證目直視此肺病兼見肝證宜集成金異丹咳而面色闇黑久咳而吐痰水此肺病兼見腎證宜六味地黃丸加麥冬五味咳而聲不出口鼻出血者此氣逆血亦逆也須順氣益嗽為主參冬花膠咳而久不止並無他證乃肺虛也只宜補脾為主參五味子湯久咳而胸高骨起其狀如龜者謂之龜胸此胸熱之極陽火熏蒸而致也清燥救肺湯咳而日久胸前疼痛口吐濃血腥臭者此肺火壅盛

已成壅也。桔梗湯治不如法其證多死。凡咳嗽痰涎壅塞逆氣冲并而作搐者多難治故頭搖目上視及閉目呻吟手足擺舞眉息胸突喉中痰鳴口禁不乳喘而手足冷者皆死證也。

入方

人參敗毒散 此方辛平升散為咳門第一神方舉世少有知者凡有咳嗽無論內傷飲食外感風寒夾濕夾青不拘男婦大小胸膈氣急咽痛口苦痰不相應即用此方升散之或感冒重者服此其咳愈甚不知者以為藥不相應棄而勿服不知正是升散之力佳兆也再服之漸次輕減不拘劑數只以痰應為度聲響痰出是其效也桔梗之人數劑之後略加沙參玉竹當歸白芍生地麥冬之類以滋其陰無不愈者再有叮嚀凡咳嗽初起切不可誤用寒涼及滋陰之藥閉其肺竅為害不小但以辛散為先著俟痰應之後漸加滋陰則得矣官揀參五錢枳五錢分五錢桔梗二錢正川芎一錢白雲苓一錢陳枳殼一錢信前胡一錢羌活一錢川獨活一錢北柴胡一錢南薄荷一錢荊芥穗一錢北防風一錢淨連翹一錢炙甘草一錢生薑一錢片為引水煎半饑服每日二劑參蘇飲治四時感冒頭痛發熱咳嗽痰盛此方不如前方用之多不效姑存之官揀參五錢白雲苓一錢陳枳殼一錢法半夏一錢信前胡一錢芽桔梗一錢老蘇葉一錢粉乾葛一錢真廣皮一錢炙甘草一錢生薑三片葱白三寸水煎溫服取微汗蘇方有清肺飲治氣逆而咳面白有痰信錢炙甘草一錢生薑三片葱白三寸水煎溫服取微汗蘇方有清肺飲治氣逆而咳面白有痰信前胡一錢北柴胡一錢桑白皮一錢陳枳殼一錢淨知母一錢川貝母一錢南薄荷一錢白雲苓一錢白梧梗一錢金井膠一錢大麥冬一錢荊芥穗一錢炙甘草一錢水煎熱服切忌油膩葶藶丸治乳食衝脾傷風咳嗽面赤身熱痰多喘嗽甜葶藶一錢黑牽牛一錢炒光杏仁一錢去皮一錢炒漢防已一錢右藥等分為細末入杏仁泥和蒸棗肉為丸棗豆大每五七丸薑湯化下量兒大小加減此丸因乳食傷脾痰甚者及壯實小兒可用之苟不因乳食所傷并怯弱者本方去牽牛易家蘇子等分炒研為丸痰清宣散治心肺有熱而令咳嗽宜從小便利出桑白皮一錢蜜甜葶藶一錢赤茯苓一錢車前子一錢炙甘草一錢右為細末每服五分生薑大棗煎湯調服集成沉瀝丹方見二卷胎熱門橘皮湯治咳嗽痰甚嘔吐法半夏

錢白茯苓錢真廣皮錢旋覆花錢北細辛錢官揀參錢芽桔梗錢陳枳殼錢炙甘草錢生薑三片大

棗一枚水煎徐服錢集成金粟丹方見二卷類搐門六味地黃湯方見二卷胎疾門人參冬

花膏治氣逆咳血痰中見血官揀參錢天門冬錢麥門冬錢款冬花錢川貝母錢桑白皮錢金井

橘一片枯苓錢白當歸錢北五味錢炙甘草錢右為細末煉蜜為丸龍眼核大每一丸燈心湯下人

參五味子湯治久嗽脾虛中氣怯弱面白神白此神方也官揀參錢漂白朮錢白雲苓錢北五

味錢杭麥冬錢炙甘草錢生薑三片大棗三枚水煎溫服清燥救肺湯喻嘉言製治諸氣腫鬱諸疾

喘喘皆屬肺之燥也鮮桑葉錢經霜者得金氣而柔潤炙甘草錢肺錢胃生熟石膏錢肺錢熱用一錢二分官揀

參錢生胃之津養胡麻仁錢研真阿膠錢杭麥冬錢北杏仁錢炒黃錢七分枇杷葉錢一片剉去毛蜜塗炙黃用水一碗

煎六分頻頻分二三次服痰多加川貝母錢瓜蒌仁錢血虛加生地黃錢熱甚加犀角錢羚羊角錢桔梗湯治

肺癰出膿血芽桔梗錢白當歸錢川貝母錢瓜蒌仁錢漢防己錢光杏仁錢陳枳殼錢意以仁錢生

黃耆錢鮮桑葉錢潤玄參錢用蘆茅嫩根三錢為引水煎熱服

百啞嗽論

凡乳子百日內有痰嗽者謂之百啞嗽或出胎暴受風寒或浴兒為風所襲或解換襁褓或出懷喂乳而風寒得以乘之此病由外來者或乳汁過各吞嚥不及而噎者或啼哭未定以乳哺之氣逆而嗽者此病由於內生者皆能為嗽第前汗下之劑難於用之以其胃氣方生不能勝藥故也故曰百啞嗽難醫然雖曰難醫正未嘗曰不醫予之治此未為不多其用藥之治有案在後復有不治之治更為捷徑而又百治百愈但須乳母聽戒治之無難凡遇百啞嗽先用荆防敗毒二小劑母子同服服完正藥惟令乳母忌口凡葷酒油膩鹽醋酸鹹薑椒辛辣青菜麵食之類一概屏絕惟用香茶白飯少佐橘餅橙片以清其乳雖免嗽至重者不過十日八日得哺清乳嗽自愈矣倘不聽戒復不擇醫徒然服藥有名無

實錢益錢訶

附案

遂陽明經高君作梅翁與令弟雲軒翁同於甲寅五月舉子然皆膏粱之稟胎元怯弱於七月間兩兒同患百啞嗽予謂雲翁曰公郎面白唇淡白眼帶青嗽聲連續痰不相應此肝風有餘肺氣不足雖有喘嗽未可以常法治之設投疎風清肺適足益燥傷陰不特嗽不能愈而證必加重雲翁深以為是乃投人參五味子湯其應如響四劑全瘳計用人參二錢八分作翁者其體更弱外候面白眼青自汗多嗽滿頭青筋顙門寬大因謂之曰令姪正同此證已服補脾保肺之劑愈矣公郎中氣更虛速宜用參始不費手適有老姬專挑馬牙者從內阻之復有醫者從外阻之力言不可用參服參則不可治且云未見百日之兒敢用參者老姬便囑其母曰道翁丸藥切不可服其中多有人參服之為害不淺其母聞之以為誠然於是視予藥如砒毒矣作翁因素艱嗣息莫能主張於予言似有陽是陰否之意予見其遲疑不決亦不敢強姑聽之此醫曰一診視自七月下旬治起直至十月初旬作翁往府考責其病愈治愈竟至於奄奄一縷而逆證叢生無可救藥醫者束手之策老姬緘口無言皆絕迹不至矣夫人輩無所倚仗復聽於予予嘆曰早聽予言何有今日乃入診視見其面目如藍形體惟皮束骨聲啞無音咳嗽氣促雨汗淋漓四肢搐掣逆證全具毫無生機因不忍釋手詳為審視惟兩目神光尚存予曰生機或在是乎遂以大參一枝桂員五粒蒸湯與服初服小羊予為抱之環步室中審其呼吸之息氣雖未減而亦不見其增即與服完良久覺氣稍順予喜曰得之矣遂用大參二錢桂員肉七粒蒸湯服之竟獲大效是夜汗搐俱止喘嗽亦輕減第苦於人瘦體弱即二錢之參湯亦須一夜方能服完幸予此時行功習靜數載未嘗設榻終夕無眠竟與抱之晝夜不釋手醒即予服服後仍睡數日之後則鼾聲如雷睡眠極穩呼吸極長予知為氣服神歸之效如此十晝夜諸證已愈八九惟形色未復音聲未亮予曰功程雖半未敢暫停參須倍之於是每日大參四錢桂員十四粒如前調理計前後二十晝夜共用官揀六兩有零始奏全績於是聲音清亮面色紅融肌肉腹生精神勝舊今已長成儼然美丈夫

矣而且聰明特達經史皆通他日翱翔奚能限量如此之證如此之治不特世人未見醫家未聞即諸書亦未載半週乳子而用六兩之參起沈疴於萬難之日苟無定識者未必有成故拜懇同道但須認證真確不必泥定古方神而明之存乎人耳或問二證皆有咳嗽何以前證用藥而後證獨用參者何也曰各有理焉前證在七月間正肺金旺時為風邪衝併但傷其中氣他臟無涉故以四君子補脾生脉散保肺收其耗散之金得返清肅之令中氣一回應手而愈受證自七月起至於十月金已退氣正當水旺木相之時由腎水無源所以肝木失養誠母病子傷故面目俱青手足搐掣此非肝強實肝敗也內經有善則不見惡則見之之言顯然可證在常俗之輩見其搐掣又必為之鎮驚化痰截風定搐矣復誰為之保固真元維持竭絕哉不知此等之證陰陽兩敗臟腑俱傷苟非大力之品莫可挽回所以屏去雜藥獨用人參之甘溫桂員之甘潤味極純正飼之兒喜况人參之力在陰益陰在陽益陽榮衛氣血精神意志無不補者而且晝夜不微則真元陰受其長養之功烏得不效又曰初服即效而而必待三七之日始奏全續者何也曰剋削過傷枯燥已極如旱苗焦壤暴雨無期必涖涖潤澤始可盈科至於三七之久天地來復之機業已三至人身之榮衛周二百五十度升降有慎神氣已足不藥之慶夫復何疑此等之治非謂世之嬰兒一有咳嗽便當用參第稟受先虧胎元怯弱者有不得不用之勢獨惜前醫偏執已見即數分之參斷不肯用孰知用至六兩之多始收全效可見辨證不真候人非淺故筆此以為擇醫者戒

咳嗽簡便方

小兒咳嗽聲不出者紫苑微炒研末杏仁去皮尖研如泥等分煉蜜為丸芡實大每服一丸北五味七粒煎湯化服肺實咳嗽痰喘葶藶子隔紙炒為末棗肉為丸龍眼核大每服一丸白湯化服咳嗽多痰葶藶子隔紙炒知母微炒各五錢研末砂糖為丸芡實大每服一丸白湯化下小兒咳嗽發熱自汗吐紅脉虛無力人參切片焙乾天花粉切片酒炒等分為末每服五分蜜湯調服以瘥為度秋天

肺燥咳嗽無痰。北沙參一味。每服五錢。淨水濃煎熱服。小兒百啐嗽痰壅喘咳。川貝母五錢。淡薑湯潤溼。上飯蒸過。甘草半生半炒二錢五分。研細末。沙糖為丸。龍眼核大。每服一丸。米飲化服。熱痰咳嗽痰出稠濃。或咽喉痛。製南星製半夏各三錢半。枯黃芩七錢。焙燥為末。砂糖為丸。芡實大。每用一丸。薑湯化下。

哮喘證治

經曰。犯賊風虛邪者。陽受之。陽受之則入六腑。入六腑則身熱不得卧。上為喘呼。又曰。肺病者喘欬逆氣。肩背痛。汗出。夫喘者惡候也。肺金清肅之令。不能下行。故上逆而為喘。經曰。諸氣膹鬱。皆屬於肺。喘者肺之膹鬱也。吼者喉中加拽鋸若水雞聲者是也。喘者氣促而連屬。不能以息者是也。故吼以聲響言。喘以氣息名。凡喉如水雞聲者為實。喉如鼽聲者為虛。雖由於痰火內鬱。風寒外來。而治之者不可不知虛實也。有因外感而得者。必惡寒發熱。面赤唇紅。鼻息不利。清便自調。邪在表也。宜發散之。五虎湯下。有因熱而得者。必口渴咽乾。大小便不利。宜葶藶丸微下之。有因宿食而得者。必痰涎壅盛。喘息有聲。先用山查神麴麥芽各三錢。煎湯與服。消其食。次下緡湯。素有哮喘之疾。遇天寒。暄不時犯。則連綿不已。發過自愈。不須上方。於未發時可預防之。有一發即能吐痰者。宜服補腎地黃丸。加五味。故脂多服自愈。有發而不吐痰者。宜痰喘方。凡哮喘初發。宜服蘇陳丸寶湯。蓋哮喘為頑痰閉塞。非麻黃不足以開其肺竅。故膽用之。百發百中。或胸膈積熱。心火凌肺。熱痰壅盛。忽然大喘者。名馬脾風。蓋心為火屬馬。言心脾有風熱也。小兒此證最多。不急治必死。用牛黃奪命散下之。效。凡大病久病之後。或久服寒涼剋削之後。或久吐久瀉之後。忽然氣急。似喘非喘。氣息短促。名為短氣。短者斷之基。氣將脫也。速宜挽救。人參五味子湯。效。又有虛敗之證。忽然張口大喘。入少出多。而氣息往來無滯。此腎不納氣。浮散於外。大山之兆。速投貞元飲。不效。理陰煎。加入人參鹿茸。或可挽回。如汗出如油。髮潤而喘者。肺絕也。汗出如油。張口大喘者。命絕也。直視譫語而喘者。肝絕。凡大病正氣欲絕。

無根脫氣上衝必大喘而絕矣。入方 五虎湯 治寒邪入肺而作熱喘。為寒痰固結非此方不能

解散。淨麻黃此光杏仁錢陳細茶錢熟石膏五分炙甘草四分淨水煎空心服。葶藶丸 方見三卷咳

嗽門 利溼湯 治痰閉肺竅喘急聲。法半夏錢大皂角錢老生薑錢炙甘草錢水煎服。已上皆

素無哮喘而暴發者用。補腎抱黃丸 治先天不足肝腎虛者通用。熟地黃錢淮山藥錢山芡肉

而嫩鹿茸二錢粉丹皮一錢淮牛膝一錢白雲苓一錢宣澤瀉一錢北五味一錢補骨脂一錢右為末蜜丸棗豆大每

服三錢淡鹽湯空心下。痰喘方 治哮喘無痰者蓋痰入於肺竅不能出故也。官揀麥 製南星

製半夏 瓜蒌霜 香附末 皂角灰 真廣皮 炒蘿蔔子 炒俱等分 共為末薑汁煮神麴糊丸麻

子大每服一錢薑湯化下。蘇沉 膏湯 治風寒閉肺而作哮喘。淨麻黃五錢紅雲皮五錢南薄荷五錢

青化桂四錢紫蘇葉四錢桑白皮四錢大腹皮四錢光杏仁四錢炙甘草六錢生薑三片水煎服。加童便少許沖服。

牛黃奪命散 治胸膈有痰肺脹大喘。黑牽牛生炒五錢錦莊黃酒潤一兩陳枳殼各一兩右為細末每

服一錢五分白湯調下。量兒大小加減。臨服加蜜數匙以氣平為度。人參五味子湯 方見三卷咳

嗽門 貞元飲方見治氣短似喘呼吸急促提不能升。喘不能降勢甚垂危常人但知為氣急其病

在上而不知元海無根肝腎已敗此子子不交氣脫證也。大熟地五錢白當歸五錢炙甘草三錢水煎熱服。

如兼嘔惡或惡寒者加煨薑五片。氣虛脉微至極者速加入參。如肝腎陰虛手足厥冷加肉桂一錢。

理陰煎方見治腎肝虧敗不能納氣浮散作喘。大熟地五錢白當歸五錢炮薑灰五錢炙甘草三錢手

足冷者加熟附子一錢。青化桂一錢。水二鍾煎湯七分熱服。

哮喘簡便方

治痰氣壅塞雪梨汁一杯生薑汁四分之一。蜂蜜半杯薄荷細末一兩和勻器盛重湯煮一時之久任意

與食降痰如奔馬化痰丸。絲瓜燒存性為細末棗肉為丸如彈子大每服一丸薑湯化下。化痰最捷兼

能止嗽。堅痰丸。治一切風痰溼痰老痰痰火胸痞滿氣壅塞黑牽牛四兩炒止取頭末一兩大皂角

去皮紋。及子酥炙黃四錢。生白礬三錢。共為細末。米糊丸。每服一錢。兒稍大者二錢。空心薑湯服。痰涎從大便出。久病之人。五日十日一服。病緩者半月一服。治醋噎成吼。用甘草二兩。去外皮。每段切二寸長。兩半劈開。用豬膽二枚。取汁。浸甘草三日。取起。火上炙乾。為末。蜜丸。菴豆大。每晚臨卧服二錢。茶湯送神效。哮喘久不止。不拘老少。一服即止。并治小兒奶哮。石膏半夏。瓜蒌仁。陳皮。麻黃。各一錢五分。枳殼。杏仁。各一錢。甘草七分。生薑五片。水煎熱服。清金丹。治一切吼疾。或痰或食。過厚味即發者尤妙。蘿蔔子。蒸熟。曬乾。為末。豬牙兒。燒存性。等分。共為細末。薑汁打麵糊丸。如菴豆大。每服一二十丸。薑湯送下。

諸疳證治

夫疳之為病。亦小兒惡候。十六歲以前。其病為疳。十六歲以下。其病為癆。皆真元怯弱。氣血虛衰之故也。究其病源。莫不由於脾胃。蓋胃者水穀之海也。水穀之精氣。為榮悍氣。為衛。榮衛豐盈。灌溉諸臟。凡人身克皮毛。肥腠理者。氣也。潤皮膚。美顏色者。血也。所以水穀素強者。無病。水穀減少者。病。水去穀亡。則死矣。凡病疳而形不魁者。氣衰也。色不華者。血弱也。氣衰血弱。知其脾胃必傷。有因幼小乳食。腸胃未堅。食物太早。耗傷真氣。而成者。有因甘肥肆進。飲食過飧。積滯日久。面黃肌削。而成者。有因乳母寒熱不調。或喜怒房勞之後。乳哺而成者。有二。三歲後穀肉菓菜。恣其飲啖。因而停滯中焦。食久成積。積久成疳。後有因取積太過。耗損胃氣。或因大病之後。吐瀉瘵痢。乳食減少。以致脾胃失養。二者雖所因不同。然皆總歸於虛也。其證頭皮光急。毛髮焦稀。腮縮鼻乾。口飢唇白。兩眼昏爛。操眉擦鼻。脊聳體黃。齒牙咬甲。焦渴自汗。尿白瀉酸。肚脹鳴腸。癖結潮熱。醋嗜尿菓。鹹炭水。泥者。皆其候也。然治寒以溫。治熱以涼。此用藥之常法。殊不知疳之為病。皆虛所致。即熱者亦虛中之熱。寒者亦虛中之寒。積者亦虛中之積。故治積不可驟攻。治寒不宜峻溫。治熱不可過涼。雖積為疳之母。而治疳必先於去積。然遇極虛者而迅攻之。則積未去而疳危矣。故壯者先去積。而後扶胃氣。衰者先扶胃氣。而後消之。書曰。壯人無積。

虛則有之。可見虛為積之本。積反為虛之標也。如惡食滑瀉。乳食直下。牙齦黑爛。頭項軟倒。四肢厥冷。下痢腫脹。面色如銀。肚硬如石。肌肉青黑。肚門如筒。口吐黑血。吐利蛔蟲。並為不治。初病者以集聖丸為主。久病者但以肥兒丸調之。以補為消可也。凡疳之初起者。集聖丸為主方。其五臟兼證。從權加減。不必多求方法。八方 集聖丸 治冷熱新久一切疳證。以為主。真麝香酒炒五靈脂炒夜明砂炒真廣皮酒炒杭青皮酒炒蓬莪朮煨使君子炒南木香屑白當歸炒正川芎酒炒俱各二錢。官揀參三錢乾正川連三錢乾蟾蜍各三錢西砂仁酒炒右為細末。用公猪膽一枚。取汁。將前末和勻。粟米糊丸。龍眼核大。每服二丸。米飲調下。

各症加減法

一病有咬牙舒舌。舌上生瘡。愛飲冷水。唇紅面白。喜伏地卧。此心疳也。本方 莪朮砂仁青皮砂仁川芎木香六味。加生地茯苓膽星各二錢。朱砂甘草各一錢。凡面青口生白膜。泄瀉夾水或青色。此肝疳也。本方去莪朮砂仁陳皮木香四味。加膽草梔子防風天麻蟬退各二錢。青黛一錢五分。一愛食泥土冷物。飲食無度。身面俱黃。髮稀作穗。頭大項小。腹脹脚弱。聞或泄瀉肌瘦。晝涼夜熱。不周乳食。此脾疳也。專用本方。一鼻下赤爛。手足枯細。口中腥臭。或作喘嗽。右腮晃白。此肺肝也。本方去莪朮砂仁青皮川芎木香五味。加桑皮桔梗蘇葉阿膠炙甘草各二錢。外用澤蘭葉銅綠輕粉等分。為末貼爛處。一兩耳內外生瘡。脚如鶴膝。頭縫不合。或齒縫臭爛。變成走馬疳。此腎疳也。本方去莪朮砂仁青皮陳皮木香靈脂六味。加熟地茯苓山藥炙肉各三錢。丹皮澤瀉各二錢。一食積久而成疳。其證形瘦腹紫。時發潮熱。羞見生人。呼之則哭。本方去麝香靈脂二味。加人參黃耆白朮茯苓半夏枳實厚樸炙甘草神麝麥芽驚甲三錢。各二錢。一久泄不止。胃虛成疳。此疳瀉也。本方去麝香莪朮靈脂三味。加白朮茯苓肉蔻柯子各二錢。人參三錢。一久痢不止。胃虛成疳。此疳痢也。本方去麝香莪朮靈脂四味。加訶子肉三錢。一瘡久未已。胃虛成疳。必此有癖。謂之疳瘡。本方去麝香靈脂二味。加黃耆驚

甲柴胡半夏神麴三棱各二錢倍人參三錢 一腦疳皮毛光急滿頭瘡餅腦熱如火髮結如穗遍身多汗腮腫顙高令兒眼痛其病在肝本方去莪朮砂仁青皮陳皮五味加膽草川芎升麻羌活防風各二錢 一脊疳蟲食脊脊發熱黃瘦積中生熱煩渴六痢拍背如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指皆瘡嘔齒指用宜安蟲丸蓋五疳或有停食成積久生蟲或如絲髮如馬尾多出於頭項背腹之間蟲色黃白赤者可治青黑者難治也安蟲丸即本方去莪朮砂仁青皮陳皮當歸川芎六味加苦練根白皮貫衆蕪荑檳榔各二錢名安蟲丸 一蛔疳縮眉多哭嘔吐清沫腹中乍痛痛時腹中結聚成塊摸之梗起滿肚青筋唇口紫黑腸頭噉瘻者是也蛔從口鼻出者難治宜安蟲丸即上方 一凡為疳手足極細項小骨高尻削體瘦腹大臍突號叫胸膈者是也集聖丸本方 一無辜疳因浣衣夜露被無辜鳥落毛所污小兒服之身體發熱日漸黃瘦腦後項邊有核如彈丸按之隨動軟而不痛其由有蟲如米粉宜刺破其核以膏藥貼之內以本方去莪朮砂仁靈脂三味加黃耆鱉甲檳榔各二錢 一疳熱由於脾胃虛弱陽浮於外氣不歸元只以補脾為主使陽氣收斂熱自退矣用麥冬白朮散多服為妙或兼脾陰虛者間服六味地黃丸 一疳渴由胃氣下陷津液不生故也宜補其胃使清陽上升津液漸生渴自止矣七味白朮散 一走馬疳蟲病也齒屬腎腎主虛纏受熱邪直奔上焦初起口臭名曰臭息次則齒黑名曰崩砂其則齕爛名曰潰骨有血迸出名曰宜露甚至齒皆脫落名曰腐根縱得全活齒不復生外證腦熱肌瘦手足如冰寒熱時有滑泄肚痛口臭乾渴齒齕破爛爪甲擊黑身多瘡疥痘疹之後多有此證不可救活毒歸於腎故也初起者清胃散另有治法在齒牙本門 一魛病兒將週歲母復有娠兒飲其乳謂之魛乳以成此證或有母患別病兒飲其乳以類母病者有之蓋母之血氣若調乳則長養精神血氣病乳則反為病根母既妊娠精神下墜衝任之脈不能上行氣則壅而為熱血則鬱而為毒小兒神氣未全易於感動其候寒熱時作微微下利髮毛鬢鬢意殊不悅甚則面色痿黃腹脹青筋瀉青多吐日漸羸瘦竟成疳證俗以孕在胎中因兒飲乳其魄識嫉而致胎妒胎毒一

骨蒸之病。多起於胃。其始也。邪火上冲而能咬。火消燦而善飢。蓋胃為氣血之海。氣血不足。邪火殺穀。水穀之精氣不足。濟之漸成。口微煩燥。夜熱朝涼。毛焦口渴。氣促盜汗。形如骨立。謂之消痺。若大便十餘行。肢瘦腹大。頻食多飢。謂之食併。此皆邪火為害。耗傷津液而致者。大肥兒丸。八方。參苓白朮散。

治脾胃虛弱。飲食不進。或嘔吐瀉痢。及大病之後。補救脾胃。此方為神。官揀參、煉漂白朮、白雲苓、熟地、懷山藥、砂、各錢一、芽桔梗、炒、薏苡仁、炒、建連肉、炒、炙甘草、各錢一、共為細末。每服一二錢。薑棗湯調服。六味地

黃丸。方見二卷胎疾門。七米白朮散。方見三卷泄瀉門。清胃散。治走馬牙疳。雅黃連。

白當歸。綠升麻。懷生地。粉丹皮。白芷。稍鑄北細辛。淨水煎。滾熱服。龍胆草。治小兒。

鬼病。龍胆草。錢鈎藤。鈎錢。北柴胡。錢。芽桔梗。錢。赤芍藥。錢。正川芎。錢。官揀參。錢。白雲苓。錢。炙甘草。錢。并

水煎服。外以夜明砂。不拘多少。以紅砂作小袋。盛之。繫兒胸前。大肥兒丸。治小兒脾胃虛弱。泄瀉。

骨蒸。官揀參。錢。乾山查肉。炒。漂白朮。錢。真廣皮。炒。蓬莖。炒。川厚樸。錢。六丁。錢。炒。雅川連。錢。胡黃連。

炒。杭青皮。錢。白雲苓。錢。杭白芍。錢。酒地骨皮。錢。酒宜澤瀉。炒。肉苁蓉。錢。火橫榔。正川芎。炒。北柴胡。炒。史君

肉。炒。乾蟾蜍。錢。炙甘草。錢。五穀蟲。錢。共為末。煉蜜為丸。彈子大。米飲化下。加減肥兒丸。治一切

久病成疳。總歸虛處。不可前法治之。只宜以此丸久服。以補為消。無不愈者。官揀參。錢。乾山查肉。炒。蓬莖。炒。川厚樸。錢。六丁。錢。炒。雅川連。錢。胡黃連。

漂白朮。錢。白雲苓。錢。廣陳皮。錢。杭青皮。錢。白歸身。錢。酒大蠶甲。錢。正川連。錢。南木香。錢。使君肉。炒。乾蟾

蜍。錢。炙甘草。錢。右為細末。另以山藥打糊為丸。量兒大小加減。日日服之。以米湯調下。病愈藥止。

疳證簡便方。小兒疳積。肚大黃瘦。骨立。頭上瘡癩。髮如麥穗。用乾蟾蜍三五隻。去四足。以香油塗之。

炙焦為末。蒸黑棗去核。取肉。搗膏。和蟾末為丸。龍眼核大。每日三服。積垢自下。多服之。形容自變。其病

如失。又方。買天漿蟲四兩。洗極淨。曬乾。微炒為末。加甘草細末五錢。米糊為丸。彈子大。每服一丸。米

飲化下。小兒諸疳。日久頭面生瘡。爛成孔凹。如大人楊梅瘡樣。用蒸糯米飯。時時蓋四邊。滴下氣水。

以碗盛。取掃瘡上數日即效。百藥不驗者。此方如神。疳蝕口鼻。用蠶蛆洗。漂極淨。曬乾。微炒為末。搗

衣燒灰減半共研勻頻吹口內效。小兒口疳破爛人中白煨過厚黃礬蜜炙焦一味等分少加冰片共研末以鹽茶洗日復以藥搽之。走馬牙疳及齒齦腐爛黑臭者用溺壺內多年積垢名人中白煨紅一兩兒茶五錢黃礬薄荷青黛各一錢冰片三分共研細末先以溫水漱口然後吹藥於疳上每日六七次吹藥之時延從外流者為吉延若向內者毒入裏也不治。牙疳鼻疳人中白煨一錢五分毛褐灰枯白礬各一錢為細末溼者乾搽乾者先以香油潤溼然後搽藥。急疳蝕爛口鼻欲死海中紫貝子煨過俗名南蛇牙齒又名研礬嶺南稱狗支螺者是也炭火煨過為末臘猪油調塗。牙疳潰爛穿唇破舌併治口瘡胡黃連五分膽礬兒茶各一錢五分共為細末搽之。

嘔吐證治

經曰諸逆衝上皆屬於火諸嘔吐酸皆屬於熱。又曰寒氣客於腸胃厥逆而出故痛而嘔。夫嘔吐者陽明胃氣下行則順令逆而上行故作嘔吐其證有聲有物謂之嘔有物無聲謂之噦。又曰乾嘔久病見此者死。蓋小物嘔吐有寒有熱有傷食然寒吐熱吐未有不因於傷食者其病總屬於胃復有溢乳嘔乳嘔噦皆與嘔吐相似而不可以嘔吐治之更有寒熱拒隔之證又有蟲痛而吐者皆當詳其證而治之。凡治小兒嘔吐先宜節其乳食節者減少之謂也。夫嘔吐多渴不可與之茶水水入復吐終不能止必強忍一二時久而後以米湯與之吐自止矣。寒吐者乳片不消多吐而少出面白眼慢氣緩神昏額上汗出脈息沈微宜溫中消食輕者藿香正氣散不止理中湯加藿香又不止參香散再若不止此陰盛格陽之謂拒格急以理中湯一劑用公猪膽汁和童便少許將藥潤溼炒熟煎服即止。此內經熱因寒用之法也。蓋陰寒太過陽熱之藥拒而不納故以猪膽童便為嚮導其始則同其終則異下咽之後陰體漸消陽氣乃發也。熱吐者面赤唇紅吐次少而出物多乳片已消色黃遍身發熱而煩燥夏月多此證宜五苓散加藿香不止藿連湯再不止用理中湯煎熟調六一散冷服即止。寒因熱用也。傷食吐者眼胞浮腫面色微黃足冷其熱夜重日輕或吐酸酸之氣或吐黃水或吐青痰脈其弦實而

滑此有宿食也宜下去其積乃止消積丸傷乳吐吐者纔乳即吐或少停而吐此因乳食無度脾胃嬌嫩不能運化此滿則噎也名噎乳但宜節其乳則吐自止噎乳者時時吐乳而不多似吐非吐皆胃虛所致也宜參香散有乳多而吐出者非真吐也苟不知禁即成真吐也百日內小兒多有之蓋身小身軟必待乳母擁抱之苟有傾側乳即溢出此人事也不須用治嗽吐者兒有咳嗽必待其嗽定定可與乳若嗽未定以乳哺之其氣必逆乳不消化而為痰痰氣壅塞嗽不得轉而吐乳也二陳湯小兒初生三日內吐乳者用丁香三粒陳皮三分生薑三片煎服自止又不若煨薑湯更妙此子用最多者蓋三四日內總皆寒吐也初起噎乳即當調治如噎不已即成吐吐不已即成嘔嘔不已即成噦至此胃氣太虛精神漸脫矣若嘔吐不已日漸沈困胸膈青筋大露者併頻吐不食皆沈語塞喘急大熱常吐腥臭者皆死也噦者有聲無物最危之候凡人久病之候而見此者皆為不治予按為醫者臨病治病貴能體貼病情能用心法大凡嘔吐不納藥食者最難治療蓋藥食即吐安能有功又切不可強灌胃口愈吐愈翻萬不能止予之治此頗多先將薑湯和土作二泥丸塞其兩鼻使之不聞藥氣然後用對證之藥煎好斟出澄清冷熱得中止服一口即停之半時之久再服一口又停之良久服二口停之少頃則任服不吐矣斯時胃口已安焉能得吐惡人不知即其吐藥不納偏以整杯整碗強灌之則一吐傾囊而出又何藥力之可恃乎此等之法不但幼科可用即方脈亦當識此倘臨證不體病情全無心法即如嘔吐一證雖能識病雖能用藥其如不納何哉

方見二卷乳子傷寒門 麥香散 治小兒胃虛作吐諸藥不上 官揀參切 卷類摘門 理中湯 方見二卷乳子傷寒門 麥香散 治小兒胃虛作吐諸藥不上 官揀參切

乾上沉香 雄松子香 研 藿香梗 焙 南木香 離以上俱各等分 共為細末 每服五七分 不底煎湯調服

五苓散 方見二卷中暑門此加藿香 藿連湯 治小兒熱吐不止 真雅連 水 煎 紫厚樸 一錢

炒藿香葉 錢 又 生薑 二片 大棗 六枚 水煎服 一散 方見三卷痢疾簡便門 清積丸 治食停胃口而作吐

西砂仁 酒炒 個 公丁香 香 烏梅肉 三 個 淨法 已 豆仁 一 粒 蝦 共 研 細 末 米 糊 為 丸 菜 豆 大 每 服 三 丸 白

湯送。枳桔二陳湯。

治小兒胸膈有痰咳作吐。

陳枳殼錢芽桔梗錢白雲苓五錢法半夏錢真

陳皮錢炙甘草五分

生薑三片大棗二枚水煎熱服。

嘔吐簡便方。

小兒嘔吐外證不熱不渴面白

唇淡神慢氣怯寒吐也。用生薑一大塊直切薄片。勿令折斷。層層摺疊。以芋麻葉紫外用草紙七層包之。水滋慢火煨令熟。取起去麻紙將薑搗爛。和早米煎湯服。立止。小兒卒嘔不止。生薑取自然汁一

盞煎滾聽用。蜂蜜四兩煉熟聽用。每服用薑汁一匙蜜二匙。白湯調服。每日五六次效。小兒胃熱嘔

吐外證面赤煩燥身熱作渴手足心熱者熱吐也。黃連一錢薑汁炒熟石膏一錢共為細末。每服一錢

白湯調下。吐止止後服。又用枇杷葉火上炙之。刷淨毛。每用葉三片煎湯熱服立止。小兒乾嘔極

惡之證用甘蔗取汁聽用。生薑取汁聽用。臨服用蔗汁六匙薑汁二匙和氣溫熱服。不用湯水調。凡

嘔吐服藥不納者內有蛔蟲有腸間蛔聞藥氣則動動則藥出而蟲不出。但於嘔吐藥中加八川椒十

四粒則不吐矣。蓋蛔得椒則伏矣。治小兒一切吐逆不拘冷熱及久吐諸藥不效者用薑黃五錢水

銀一錢同研至不見生薑汁打米糊為丸。小豆大三歲者三丸大人則三四十丸以陰陽水送下。此

二味加增分兩入陽城礬內封固以炭火升煉之。即靈砂為仙家所用之物。最能升降陰陽交濟水火

乃扶危濟困之神丹也。

泄瀉證治

經曰。水穀之寒熱感則害人六腑。又曰。虛邪之中人也。留而不去。傳合於腸胃。多寒則腸鳴飧泄。食不化

多熱則瀉泄。夫泄瀉之本無不由於脾胃。蓋胃為水穀之海。而脾主運化。使脾健胃和。則水穀腐化

而氣血以行榮衛。若飲食失節寒溫不調以致脾胃受傷。則水反為溼穀反為滯精華之氣不能輸化

乃至合污下降而泄瀉作矣。凡泄瀉腸鳴腹不痛者是溼宜燥滲之。飲食入胃不化或完穀不化者

是氣虛宜溫補之。腹痛腸鳴水痛一陣瀉一陣者是火宜清利之。時瀉時止或多或少是痰積宜豁之

腹痛甚而瀉瀉後痛減者為食積宜消之。體實者下之。如脾泄已久。大腸不禁者宜瀉之。元氣下陷者

宜升提之。泄瀉有五寒熱虛實食積也。但宜分別所瀉之色。凡暴注下迫屬火。水液澄清屬寒。老黃色屬心脾。肺皆實熱宜清解。淡黃色屬虛熱宜調補。青黃色屬寒宜溫。白色屬脾虛宜補。將四屬淫氣宜燥淫酸氣屬傷食宜消。脾土虛寒作瀉。所下白色。或穀食不化。或水液澄清。其候神疲。唇口古俱。白色。口氣溫熱。宜理中湯。或六君子湯。熱證作瀉。瀉時暴注下迫。謂其出物多而迅速也。便黃溺赤。口氣蒸炙。煩渴少食。宜五苓散加梔仁。有傷食及滯瀉者。其候口噤酸氣。吞酸腹脹。一痛即瀉。一瀉痛減。保和丸消之。如食已消。痛已止。而猶泄瀉不止者。乃脾失清升之氣。氣虛下陷。補中益氣湯。有風瀉瀉而色青稠黏。乃肝木乘脾。宜六君子湯。加防風柴胡白芍。有泄瀉腹內腸鳴。肚不痛。身體重而瀉水或兼風者。水穀混雜。宜升陽除瀉湯。凡大瀉作渴者。其病不論新久。皆用七味白朮散。生其津液。凡痢疾作渴亦然。蓋白朮散為渴瀉之聖藥。倘渴甚者。以之當茶。水不可服之。不可再以湯水兼之。則不效矣。久瀉不止。多屬虛寒。宜參苓白朮散。加肉豆蔻煨熟為丸。服之自止。久瀉未止。將成疳者。參苓白朮散。加肉豆蔻煨熟。加懷山藥。共為末。每日服之。則泄瀉自止。不致成疳矣。經曰。五虛者死。一脈細。二皮寒。三少氣。四泄瀉不止。五飲食不入。五虛悉具者死。能食者生。凡瀉不止。精神好者。脾敗也。吐瀉而唇深紅者。內熱也。色若不退者死。面黑氣喘者死。遺尿不禁者。腎氣絕也。入方。

理中湯 方見二卷乳子傷寒門 六君子湯 方見二卷類橘門 五苓散 方見二卷傷暑門此

加梔仁 補中益氣湯方見一卷保產門 升陽除瀉湯 治風溼作瀉 綠升麻錢 北柴胡二錢六

神麴錢 宣澤瀉錢 結猪苓錢 真廣皮五錢 漂蒼朮五錢 炙甘草五錢 生薑三片 大棗三枚 水煎熱服。若胃寒

腸鳴。加益智子半夏各一錢。七味白朮散 治泄瀉津液下降。煩燥大渴。官揀參錢 漂白朮錢 白

雲苓錢 南木香錢 藿香葉錢 粉乾葛錢 炙甘草五錢 水煎當茶飲 此方治小兒陽明本虛陰陽不利

吐瀉而亡津液。煩渴目乾。以參朮甘草之甘溫。補胃和中。木香藿香辛溫。以助脾。茯苓甘淡。分陰陽。利

水溼。葛根甘平。倍於衆藥。其氣輕浮。鼓舞胃氣上行津液。又解肌熱。治脾胃虛弱泄瀉之聖藥也。兼治

久瀉不止。口渴無度。並痢疾口渴。幼科之方。獨推此為第一。後人宜留意焉。參苓白朮散 方見三
卷痢證門

泄瀉簡便方

治水瀉。或飲食過度。或飲涼水。胃暑而發。用生薑搗爛三錢。陳細茶三錢。濃煎湯飲立止。蓋泄瀉由臟腑
陰陽不和。量能和陰。茶能和陽。是以多效。體素薄者。加連子去心二錢。泄瀉因傷溼而起。米穀不化
不思飲食。困弱無力。用白朮土炒白茯苓各三錢。水煎食前服。腹痛者加炒白朮錢。炙甘草五錢。泄瀉
因於寒者。腹痛手足冷。用胡椒粒生薑錢。淡豆豉湯熱服。泄瀉腹痛奇方。田雞蛋一枚。將小頭打一小
孔。入胡椒七粒在內。以紙封孔。紙包煨熟。酒送更效。胡椒吞與不吞不拘。脾虛久瀉。用白朮土炒山
藥酒炒連肉去心蒸熟。砂仁酒炒各一兩。共為細末。以白砂糖二兩和勻。每服二三錢。米飲調下。又
方用早米造飯。鍋已取四兩。研末。連子去心蒸晒為末四兩。白糖四兩。共和平。每服三二錢。白湯調下。
每日三服。集成止瀉散。治久瀉如神。此方經驗最久。用車前子。以青鹽水炒七次。稱過二兩。白茯苓
炒二兩。山藥炒二兩。炙甘草六錢。共為細末。每服二三錢。炒米湯調。烏梅湯更妙。

傷食證治

經曰。飲食日倍。腸胃乃傷。東垣云。飲者無形之氣也。食者有形之血也。由此推之。乳為血液。飲之類也。
穀有糟粕。食之類也。乳之與食。原非同類。豈可不辨乎哉。凡小兒飲食傷脾之證。非可一例而論。有
寒傷。有熱傷。有暫病。有久病。有虛證。有實證。但熱者暫者實者。人皆易知。而寒者久者虛者。人多不識。
如今之小兒。以生冷瓜果。致傷胃氣。而為腹痛瀉痢者。人猶以為火熱而治以寒涼。是不識寒證也。有
偶因停滯。而為脹痛。人皆知其實也。然脾胃之素強者。即滯亦易化。惟其不能化者。則恒有脹滿之證。
又或有不食。亦知饑少。食即作脹。或有無饑無飽。全不思食。或因病有傷胃氣。亦不思食。本非有餘之
證。時醫遇此。無論有餘不足。鮮有不用開胃消導之劑者。是不知虛症也。蓋脾胃原有運化之功用。今