

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷四十



北京中醫藥大學圖書館版權所

欽定四庫全書

小兒驚風

明 張介賓 撰

言語不能通病情不易

人寧治十婦人莫治一

余較之則三者之中又

謂小兒為最易何以見之蓋小兒之病非外感風寒則
內傷飲食以至驚風吐瀉及寒熱疳癩之類不過數種
且其臟氣清靈隨撥隨應但能確得其本而撮取之則
一藥可愈非若男婦損傷積痼癡頑者之比余故謂其
易也第人謂其難謂其難辨也余謂其易謂其易治也
設或辨之不真則誠然難矣然辨之之法亦不過辨其
表裏寒熱虛實六者洞然又何難治之有故凡外感者
必有表證而無裏證如發熱頭痛拘急無汗或因風搖

弱之類是也內傷者止有裏證而無表證如吐瀉腹痛
脹滿驚疳積聚之類是也熱者必有熱證如熱渴躁煩
秘結癰瘍之類是也寒者必有寒證如清冷吐瀉無熱
無煩惡心喜熱者是也凡此四者即表裏寒熱之證極
易辨也然於四者之中尤惟虛實二字最為緊要蓋有
形色之虛實有聲音之虛實有脈息之虛實如體質強
盛與柔弱者有異也形色紅赤與青白者有異也聲音
雄壯與短怯者有異也脈息滑實與虛細者有異也故

必內察其脈候外觀其形氣中審其病情參此數者而精察之又何虛實之難辨哉必其果有實邪果有火證則不得不為治標然治標之法宜精簡輕銳適當其可及病則已毫毋犯其正氣斯為高手但見虛象便不可妄行攻擊任意消耗若見之不真不可謂姑去其邪諒亦無害不知小兒以柔嫩之體氣血未堅臟腑甚脆略受傷殘姜謝極易一劑之謬尚不能堪而況甚乎矧以方生之氣不思培植而但知剝削近則為目下之害遠

則遺終身之羸良可嘆也凡此者實求本之道誠幼科最要之肯綮雖言之若無奇異而何知者之茫然也故余於篇端首以為言然非有冥冥之見者固不足以語此此其所以不易也

陰陽應象大論曰善診者察色按脈先別陰陽審清濁而知部分視喘息聽聲音而知所苦觀權衡規矩而知病所主○按此論雖通言診法之要然尤於小兒為最切也

初誕法二

小兒初生飲食未開胃氣未動是誠清虛之腑此時開口調燮極須得宜保嬰諸書皆云分娩之時口含血塊啼聲一出隨即嚥下而毒伏於命門因致他日發為驚風發熱痘疹等證此說固似有理然嬰兒通體無非血氣所結而此亦血氣之餘何以毒遽如是即使嚥之亦必從便而出何以獨留為害無足憑也惟是形體初成固當為之清楚其法於未啼時用軟帛裹指挖去口中

之血乃用後法并拭去口中穢惡以清臟腑此亦初誕之要法不可無也

開口法凡小兒初誕宜以甘草細切少許用沸湯泡汁以淡為妙不宜太甜乃用軟帛蘸汁徧拭口中去其穢濁隨用胡桃肉去皮嚼極爛以稀絹或薄紗包如小棗內兒口中使吮其汁非獨和中且能養臟最佳法也

若母氣素寒小兒清弱者只以淡薑湯拭口最能去胃寒通神明并可免吐瀉之患此法最妙人所未知也拭後

仍用核桃法如前○一法以牛黃半分同硃砂研勻蜜調如前與吮為佳極能辟痰邪去穢惡除熱安神然必母氣多熱小兒肥盛者可用清弱者不宜用○一古法拭口多有用黃連者不知黃連大寒大苦而小兒以胃氣為主安得初生即可以苦劣之氣相犯致損胃氣則他日變嘔變瀉由此而起矣大非所宜○一古法多用硃砂開口者按陳文中曰小兒初生便服硃砂輕粉白蜜黃連本欲下胎毒不知此皆傷脾敗陽之藥輕粉下

痰損心硃砂下涎損神兒實者服之軟弱弱者服之易傷反致變生諸病是固不可不察也

護養法三出保嬰撮要

巢氏曰小兒初生肌膚未實宜用舊絮護其背不可太煖更宜數見風日則血氣剛強肌肉緻密若藏於重幃密室或厚衣過煖則筋骨軟脆不任風寒多易致病衣服當隨寒熱加減但令背煖為佳亦勿令出汗恐表虛風邪易傷乳哺亦不宜過飽陳氏所謂忍三分寒喫七

分飽頻揉肚少洗澡要肚煖頭涼心胸涼皆至論也又須令乳母預慎六淫七情厚味炙烤則乳汁清寧兒不致疾否則陰陽偏勝血氣沸騰乳汁敗壞必生諸病若屢用藥餌則臟腑陰損多變敗證可不慎歟大抵保嬰之法未病則調和乳母既病則審治嬰兒亦必兼治其母為善

小兒飲食有任意偏好者無不致病所謂爽口味多終作疾也極宜慎之嘗見王隱君曰余幼時酷嗜甘飴忽

一日見飴中有蚯蚓伸頭而出自此不敢食飴至長始知長上為之此可為節戒之妙法

初生兒看病法

四

初生兒以手捻其頭摸其頤頤不作聲者為無病總有病以手指探其口雖發聲而從容咂指者其病輕若即發聲不咂指而色或青紅兼紫者此落地受寒之甚也其病重須急辨其形色虛實而治之若牙關緊閉不納乳或硬而不軟其病極重也此驚邪入足太陽經及足

陽明經而然須急治之庶可平復

一初生兒肥胖色嫩日覺好看者此其根本不堅甚非佳兆且亦最易感邪凡邪入腑者近在第二三日見之其證吐乳夜啼發哭腹鳴皆胎驚之證然猶淺而易治○若邪之入臟者遠在六七日見之此臍風噤風撮口風之候其病深而難醫若大聲口噤舌大痰壅者不治蓋五六日間病傳心肺脾三經也此風氣甚盛而無所洩故形見於喉口牙關聲音也○其面額青紫黑色者

不治爪甲青黑者不治臍青黑者亦不治○凡父母肥者不可生肥兒父母瘦者亦不可生肥兒生而肥胖必當以藥斂之使其肥肉堅實而轉微黃之色則吉不然則凶○生兒怯弱必須以藥扶助之若七日之內肌肉頓肥則必病矣過此以往漸肥者不足慮也治肥之法宜清痰濕解胎毒預防其風氣亦不可過用峻厲以傷脾氣○又當看小兒元氣厚薄厚者十無一失薄者十無一生然其中有死者有不死者則以病之所生有真

偽也凡怯弱者宜專培脾腎為主

看小兒壽夭法五

看小兒法以聽聲為先察色為次凡聲音清亮者生有
回音者生澁者病散而無出聲者不壽○忽然大聲而
無病者須細看其身恐有瘡毒即須治之○臍帶中無
血者生臍帶銀白色者生短帶紫脹者於斷帶之後捻
去紫血可保無虞○額皮寬者壽○卯縫通達黑色者
壽初生下如水泡之狀者險○面轉微黃之色者吉○

生下粉白花色者必主臍風而死○生下皮寬肉瘦五
六日頓肥者亦必有臍風之患○生下皮肉不光者死
○泣不出聲者死○泣而無淚者死○舌如紫肝者死
○口角上有紫色如蝦鬚者死○髮粗長者生細軟不
放者死○陰物不起者死○陰囊不收者死白者死赤
者死○無糞門者死○臀肉不生者死○股肉不生者
不壽○面無彩色者夭○臍帶短大紫色者夭○生下
渾身銀白色者夭○生下牙齒者大凶致傷父母不然

必傷自身○生下未裹即撒尿者殺父母蕩家財在世
一生勞苦

脈法 六

凡小兒形體既具經脈已全所以初脫胞胎便有脈息
可辨故通評虛實論曰乳子病熱脈懸小者手足溫則
生寒則死乳子病風熱喘鳴肩息者脈實大也緩則生
急則死此軒岐之診小兒未嘗不重在脈亦未嘗不兼
證為言也自水鏡訣及全幼心鑑等書乃有三歲以上