

醫學從衆卷四

閩吳航陳念祖修園甫著

次男元犀靈石參訂

心典徽菴

孫男 心蘭芝亭 全校字

瘡 厥 癲 狂 瘡 癰瘻

厥者從下逆上之病也。

傷寒論厥以手足厥冷而
言陽厥用四逆散陰厥
用四逆湯此主內經暴厥者不知與人言及
血之與氣并走於上則為大厥之旨與傷寒不

同瘡者強直反張之象也。癇者猝然昏仆。筋脉瘻癥。口角流涎。或作牛馬猪羊雞之聲。後人分為五癇是也。病有間斷故名為癇。癲者或歌或哭如醉如癡。其候多躁而常昏。狂者語言狂妄。少卧不饑。其候多躁而常醒。癱瘓者病在筋骨。左癱右瘓。將成廢人。六症醫書分治其實一厥陰盡之。治得其要只取數方捷如影響。蓋厥陰屬風木與少陽相火同居。厥陰之氣一逆則諸氣皆逆。氣

逆則火發。火發則風生。風生則必挾木勢而害土。土病則聚液而成痰。其歸并於心也。心氣大虛而不能禦之。或從陽化而為狂。或從陰化而為癲。心氣尚未全虛。受其所凌。則昏倒。正氣一復而遂瘥。其症有作有止。則為癇。其逆行於內也。或乘腎氣之虛。則為瘡癰。而為煎厥。或怒火載血上以擾其陽。陽亢陰虧。而為煎厥。或怒火載血上行。氣血亂於胸中。相薄而厥逆。則為薄厥。或因

怫鬱不解。陽氣不能四達。手足與身俱冷。中風身冷則為氣厥。或陽騰絡沸。則為血厥。或因穢濁蒙神。亂其陰陽之氣。則為尸厥。或於飽食之後。適有感觸。胃氣不行。陽並於上。則為食厥。時見吐衄。則為衄厥。濕痰上逆。則為痰厥。以及陽衰而陰湊之。令人五指至膝上皆寒。則為陰厥。陰衰而陽湊之。令人足下熱。甚則循三陰上逆。則為熱厥。其發見於外也。風火迅發。病起於

驟然手足抽掣。角弓反張。或從實化。為無汗之
剛瘡。或從虛化。為有汗之柔瘡。內經云。諸暴強
直。支痛。綻戾。裏急筋縮。皆屬於風。醫者可於此
而驗風邪之體段焉。土為木尅。則聚液而成痰。
痰挾風而流注。則左癰而又右瘡。左傳云。風淫
末疾。醫者可於此而知風邪之流極焉。凡此六
者。症各不同。其源則一。余只以烏梅丸。益厥陰
之體。以宣厥陰之用。又以風引湯治厥陰風火。

痰涎幻變錯雜之病。舉凡治剛痙。用葛根湯。柔痙用桂枝加栝萎根湯。痙之表症急者。用小續命湯以攻表。痙之裡症急者。用承氣湯以攻裏之類而不效。治寒厥用六物附子湯。熱厥用六味湯。薄厥用蒲黃湯。煎厥用玉女煎。龍薈丸。氣厥用八味順氣湯。血厥用白薇湯。尸厥用蘇合香丸。食厥用加味平胃散。虻厥用掃虫煎。腎厥用地黃飲子。痰厥用瓜蒂散之類而不效。治狂

用白虎湯。生鐵落飲。涼膈散。滾痰丸。治癲用定志丸。天王補心丹。導痰湯。及獨參湯。加竹瀝薑汁之類。而不效。治癇用龍鬚丸。丹鑿丸。五癩丸。及紫河車丸之類。而不效。治癰瘍用二妙散。及舒筋保肝散之類。而不效者。種種方藥無不對症。對症而猶不效。其故何也。蓋緣未嘗求於厥陰一經。而信服烏梅丸。風引湯。二方之神妙也。二方本於仲景。而喻嘉言獨得其旨。但引而不

發淺學人。拘索不來。至葉天士則引伸觸類。妙義無窮。若風火犯於上者。此風火二字。即上厥陰風木與少陽相火之義。勿誤解為外來風火。不免凌金燉液用麥門冬湯及瓊玉膏。為補金柔制法。若風火犯於中而為嘔為脹者。用六君子湯去术加木瓜薑芍之類。及附子粳米湯。加人參為補脾凝肝法。若風火震動心脾。而為悸為消者。用甘麥大棗湯合龍牡之屬。為緩其急。鎮其逆法。若少陽相火挾厥陰風

木之威而乘巔搖絡者。用羚羊鈎藤、元參連翹
之劑。為熄風清絡法。若肝膽厥陽化風旋逆者。
用龍膽蘆薈木通青黛之類。為苦降直折法。若
本藏自病。而體用失和者。以椒梅桂芍之類。為
寒暄各得法。若因母藏之虛。而擾及子藏之位
者。用三才配合龜甲磁硃及復脉湯去薑桂入
雞子黃之屬。為安攝其子母法。至於瘧厥之治。
厥陰病、風旋陽冒、神迷、則為厥、陽明病絡空、四末不用、而為瘧厥、陽尤覺神奇。取

血肉介類改湯為膏。謂其力厚重實。填隙止厥最速。凡此之類雖不明用烏梅丸風引湯成方而細味其旨無一不從此二方神悟出來。甲寅歲余在吳航書院掌教嘗與學徒講論以讀於無字處文到有神時二句為舉業妙諦而學醫者亦必到此境地方許出而論證也。

脉息

宜實大 忌沉細 漸緩則漸愈 漸數則漸

甚 若數而弦緊及見牢草促代諸脉難治

葛根湯

方見傷寒

小續命湯

方見時方

風引湯

方見金匱

桂枝加栝蔞根湯

方見金匱

原方加栝蔞分兩倍於桂芍

六物附子湯

治寒厥

附子

肉桂

防已

各二錢

炙艸
一錢

白朮

茯苓

各一分

水煎服

六味湯

方見時方

白虎湯

方見傷寒

麥門冬湯

方見金匱

白薇湯

本草

人平居無疾苦，忽如死人氣過血還，陰陽復

通移時方寤名曰血厥婦人多有之

白薇

當歸

各二錢

人參

甘艸
炙各五分

水二杯煎一杯溫服

蒲黃湯

治薄厥

蒲黃

一兩

清酒

十六盞熱沃之

溫服

八物順氣湯

治氣厥

白芷

台烏藥

青皮

陳皮各一

人參分

茯苓

白术

各一錢炙艸分七

水煎服

地黃飲子

方見時方

平胃散

方見時方

玉女煎

見頭痛

爪蒂散

大小承氣湯

調胃承氣湯

俱見傷寒

附子粳米湯

方見金匱

三才湯

見咳嗽

涼膈散

方見時方

或加膽南星石菖蒲見中風

舒筋保肝散

治左癱右瘓筋脉拘攣身體不遂脚腿少力
乾濕脚氣及濕滯經絡久不能去宣導諸氣

木瓜

五兩

草薢

五靈脂

牛膝

酒浸

續斷

白僵蚕

炒

松節

芍藥

烏藥

天麻

威靈仙

黃芪

當歸

防風

虎骨

酒炒各一兩

右用無灰酒一斗浸上藥二七日緊封扎日