

良嵩厓尊生

上海錦章圖書局印行

嵩厓尊生書卷之十四

宋高景日診

岳生堂纂著

○婦人部

○經候

先期是虛中
分有熱

歸身 白芍

生地各二

黃柏

知母俱酒炒

條芩

阿膠炒各八分

香附

甘草各六分

分各三
○若素脾虛

白芍 條芩 阿膠俱加倍

加白术

錢去黃柏

知母

俱經前五日服之至經去

不服兩三次獲效甚穩安。

後期是虛中有寒或有熱

歸全 川芎 熟地 香附各一

桃仁 紅花 菟絲子

木通各四

火草

肉桂

香附各一

肉桂

甘草各六分

分各三
○若素脾虛

白芍 條芩 阿膠俱加倍

加白术

錢去黃柏

知母

俱經前五日服之至經去

桂 火草各四

照前服法。

紫黑成塊

熱極也

歸全

川芎

白芍

生地

黃柏

知母各八分

香附錢

後期色淡

瘦多也肥人多此

二陳湯加

南星

蒼朮

川芎

香附子

當歸各等

滑石

經水未行

瘀滯也

歸全

香附

玄胡

川芎

酒煎熟服

壯人加

炒大黃

經水既去

疼痛虛也

八珍湯加

香附

川芎

白芍

生地

黃柏

知母各八分

逆經吐血

當歸

白芍

生地

黃柏

熟地

川芎

炒大黃

重便一錢

降香

當歸

白芍

生地

黃柏

熟地各二錢

炒大黃

重便一錢

或用麝金

引下湯

川芎

白芍

生地

黃柏

熟地各二錢

炒大黃

重便一錢

或用麝金

固經湯

川芎

白芍

生地

黃柏

熟地各二錢

炒大黃

重便一錢

或用麝金

經水過多

不正或先期或後期陰虛熱也

黃柏

白芍各五分

炒大黃

重便一錢

或用麝金

炒大黃

重便一錢

阿膠

地榆

黃耆各八分

炒大黃

重便一錢

或用麝金

炒大黃

重便一錢

或用麝金

經水過多

五心煩熱日晡潮熱

四物湯倍

白芍

生地

黃柏

重便一錢

或用麝金

炒大黃

營湯

川芎

白芍

生地

黃柏

重便一錢

或用麝金

炒大黃

重便一錢

引下湯

川芎

白芍

生地

黃柏

重便一錢

或用麝金

炒大黃

重便一錢

固經湯

川芎

白芍

生地

黃柏

重便一錢

或用麝金

炒大黃

重便一錢

生血湯
止經丸

調經丸

消積湯

經水少只是虛四物湯
歸身
熟地各三錢川芎
白芍各一錢
紅花
澤蘭各八

木香三分

○崩下

五十歲後經尚行或是盛丹皮
澤瀉
炒梔
陳皮各一兩
阿膠二兩條芩四兩
醋糊丸空心服百丸

熟地兩兩

蜜丸服

經水或前或後時多時少血虛當歸
白芍
山萸
山藥
生地香附各二
當歸
白芍熟地四兩
香附十兩父葉二兩
當歸

經閉多是血虛

當歸
白芍
白木各一兩
益母
川芎熟地兩兩
當歸
白芍

醋糊丸與前丸間服

蜜丸服

亦服前丸不必妄用斑貓等破藥成勞血不和也川芎
白芍
生地
桃仁
紅花三棱
赤芍
乾漆各一兩
當歸
白芍

醋糊丸與前丸間服

蜜丸服

我术兩
十八九最安

成勞先用逍遙散十餘劑退潮熱

當歸
白芍
茯苓
白术
甘草各一錢銀柴胡
丹皮
炒

共為末酒下一錢服日三

錢

白正分○腰腿痛

四物四錢
羌活
防風各一錢肥人加
蒼术
半夏
南星○腹痛者黃連
黃柏
各五分當歸
各五分

加黑畫分○吳萸分

木香分
立胡分
從治之○素氣血虛弱者熟地半錢
山萸
黃芪熟地半錢
山萸
黃芪當歸
各五分

○帶下

治赤白帶神效

白馬毛二錢和板
末火燒龜甲四錢
醋炙牡蠣一兩半
醋炙鱉甲五錢
醋炙帶下多是濕熱

腹不痛者

椿根皮錢
炒二錢

醋香附

白芍

白芷分○腰腿痛

四物四錢
羌活

防風各一錢

肥人加
蒼术半夏
南星○腹痛者

加黑畫分○吳萸分

木香分
立胡分
從治之○素氣血虛弱者熟地半錢
山萸
黃芪熟地半錢
山萸
黃芪當歸
各五分

人參白术當歸各一錢

山藥陳皮各八丹皮

茯苓各六
炒分升麻澤瀉各三分
神效當歸
白芷分
燒

○崩下

崩斷非寒病宜急止之

錦片木賊棕衣柏葉艾葉乾漆亂髮當歸荆芥白芷分

黑荆芥炒各一分

條芩一錢

防風

止崩湯

崩斷非寒病宜急止之

補陰益氣湯

當歸川芎白芍生地荊芥

黑荊芥炒各一分

防風

止崩湯

升麻 白术 蒲黄各八錢 阿膠 地榆 黄柏各六錢 調髮皮服。○止後其人必虛。

黃耆 人參 當歸 白术各一錢 生地三錢 陳皮 甘草 白芷 荆芥穗 升麻各四錢 成勞必

川芎 麥冬 失補必

○血病雜見 不與男子同治法。餘不關血者悉同。不另立方。

柴胡三錢

半夏各一錢 生地二分 甘草五錢

一服立效。

熱入血室。夜譫語。白芍 五靈脂 木通各一錢 醋水各半煎服立止。

寒熱往來。防風 知母 生地各一錢 柴胡 半錢 青皮錢 赤芍 丹皮各一錢 炒梔子 地骨皮 老附各一錢

甘草三分

前胡 泰光 甘草各五錢 人參五錢

共為末酒

固本丸

擗舟湯

大秦艽湯

柴胡地黃湯

關帶湯

柴胡地黃湯

白濁白淫。糊丸鹽湯下。

○虛弱

虛傷勞倦者。

黃耆一錢半

人參

白术

當歸

炙草各八錢

陳皮五錢

升麻

柴胡各三錢

頭疼加

香附分

砂仁二錢

炮薑分

砂仁二錢

炮薑分

砂仁二錢

炮薑分

砂仁二錢

炮薑分

砂仁二錢

炮薑分

砂仁二錢

炮薑分

川芎分

身痛加

羌活

獨活

川芎各六錢

薑棗煎

午前服

○傷飲食加

香附

神曲

山楂

各六錢

○素覺氣虛不足者。

時時服之。

脾虛不善食而瘦。

人參

白术

茯苓

甘草

陳皮

當歸各八錢

香附分

砂仁二錢

炮薑分

多鬱見虛症。

黃耆

人參

白术

茯苓

棗仁

龍眼

歸身各一錢

遠志

災草各五錢

木香三分

砂仁二錢

炮薑分

砂仁二錢

人參養氣湯

調養食人湯

脾氣丸

九

丸亦可。或加五味。

山萸遠志。

棗仁○覺下部寒加

肉桂多少酌用

久病虛寒。

白芍。

人參陳皮黃耆桂心當歸白术。

熟地等分。

茱苓災草遠志五

味減半。

棗肉為丸服之。

久病虛而不寒。

黃耆白术。

茱苓各一。

人參山藥當歸白芍。

熟地麥冬遠志各一。

陳皮八錢。

五味大錢。

生地五錢。

用鴨一隻取血入煉蜜為丸。

下部虛。

熟地兩錢。

山藥山萸各四錢。

龜膠炒珠四兩。

川牛膝蒸酒。

鹿膠炒珠兩。

枸杞各三。

當歸四兩。

煉

蜜丸。

火動者去枸杞。

鹿膠加貞實。

麥冬各三兩。

加百合三兩。

骨蒸加地骨皮三兩。

○小便不利。

加茱苓。

兩大便燥去兔然。

加肉蓯蓉酒洗。

上寶下虛加牛膝三兩。

火衰加肉桂半兩。

或更加川附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

從來男不舉子。其病有六。女不宜男。其病有十。然女可更置。而男不能換身。故當而論治男之法。何謂六病。精寒精溼。氣弱肝鬱。相火太旺。痰氣夾雜。有一於此皆不能舉子。若夫多女少男。及生男不育者。此亦男身不能調養之故。此際轉移。猶易為力。易曰。乾道成男。坤道成女。先儒蔡林二公。謂男精先至。則精裹血而成男。女精先至。則精裹血而成女。此成男成女之別。只在頃刻間也。先儒又謂天時物力中。

○求嗣論

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛加吳萸兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

附一兩。

○腰軟無力。

加杜仲四兩。

○兼氣虛加人參三兩。

○便溏加故紙三兩。

或再加肉蔻兩。

○小腹痛

分出男女其說更精。今細推其理。天時之說有三。以逐日言之。則子寅辰午申酉為陽日。丑卯巳未酉亥為陰日。以逐時言之。亦子寅辰午申戌為陽時。丑卯巳未酉亥為陰時。又天氣晴明和爽為陽。雲露風雨為陰。交媾之際。其日其時其氣皆合於陽。則成男也必矣。至於物力之說。吾身精氣是也。精氣壯旺。男勝於女。則結胎成男。精氣微弱。女勝於男。則結胎成女。故寒儒經年遊學。歲暮歸家。一舉而得男。精力濃厚故也。膏梁之室。佳麗滿前。往往生育多女。精力淡薄故也。欲培養精力。其法有四。一日養無漏本體。齋居絕慾。勢必不能。但御房幃。宜使點滴無洩。用弱入強出之法。當初出時。提吸陰崎一穴。口中微微呵氣三口。久久行之。自無走漏之虞。每年冬至夏至各前後兩月。尤宜守固。二曰得少陰滋補。易曰枯陽生稊。老夫得其女妻。言能成生育之功也。大凡女子二十左右者。生機洋溢。交接有補。若三十二歲以外者。陰衰火熾。動能損人。斷不可近矣。三曰守命門之關。內經謂七節之中有小心。歧伯謂命門對臍輪之後。貼脊骨之前。兩腎相抱。左水而右火。其中空穴。謂之命門。命門壯而十二經皆旺。命門衰而十二經皆衰。命門生而人生。命門絕而人絕。此人身壽夭存亡所係也。其法日間則守午時。夜間則守子時。午時端坐。返觀內照。凝神入於命門。夜間正卧。屏絕他念。亦凝神入於命門。心思萬一。不過七日之中。水火交濟。陽氣勃盛。從此每日間得一二時。息心顧腎。獨寢三月。可以養精蓄銳。一舉成男矣。新安吳柱史祖孫三代。八旬皆能舉子。用此法也。四曰審月庚之候。女子經水一月一來。就經水初至之刻。記其何時。且如初一子時經到。即從子時數至第五日戌時。是血盡氣生之時。即乘其勃然意濃。以我蓄銳之體。一舉成胎。決然得子。此又繫要之訣也。但此一時須合日陽時陽氣陽方為得力。養子聰明俊秀矣。後二方煎藥先飲十劑。丸方後服三料。約味中正不雜。可以補氣填精也。

○煎藥方

大熟地
蒸九兩酒一兩

巴戟天
洗去心一兩

枸杞子
酒洗二錢

人參錢

山萸肉
酒洗四錢

肉蓯蓉
酒洗去筋膜一錢

茯神二錢去皮末 遠志肉一錢甘草水製 杜仲一錢鹽水炒斷絲 大白朮三錢麪炒黃 肉桂一錢 龍眼肉一枚
用水二碗半煎至八分服。渣再煎服。此方能益氣強陽。服至十劑頓然改觀矣。

○丸藥方

大熟地半斤蒸 人參三兩 肉蓴卷三兩酒洗 山萸肉四兩蒸 白朮四兩去皮土炒 懷山藥四兩研去油 栀子仁一兩炒
遠志肉一兩製 白茯苓三兩去皮 砂仁五錢去殼炒 巴戟天三兩酒洗去骨 杜仲一兩鹽水炒 补骨脂一兩鹽肉桂兩一
當歸身三兩酒洗 白芍藥三兩酒洗 五味子兩 鹿茸一副乳酥炙 川附子一個重一兩二三分錢童便製去皮臍 麥門冬三兩去心

棗仁一兩炒 紫河車一具火焙乾入藥 炙甘草一兩

己上諸藥磨細末。煉蜜為丸。梧子大。每日空心服五錢。大能填精補氣。雖老年亦能舉子。兼別有妙益。
精氣衰薄不能結孕。好魚蠶者。用蛤粉炒無聲為度。去蛤粉。再以酥油炒斤。沙苑蒺藜炒蓮蕊。

當歸五兩 兔絲子三兩酒煮 共為末蜜丸。

男子止宜寡慾。如精氣已衰者。大赤何首烏內有錦紋者連皮打碎入乳浸。

蹇加枸杞人乳浸一宿乾二兩 白蓮花蕊十一對選將開者去梗連根房瓣並用晒乾各為末 生地黃酒浸一宿八兩 用木鼈安煮羊腎。

鍋上蒸極爛。羊外腎對。淡鹽浸一宿。用白酒滌于砂鍋內。煮至黑深色。取起去囊皮。並筋膜。同地黃先杵千餘下。和入再杵二千九。如黃豆大。如乾再酌入煉蜜。每服三錢。空心淡鹽湯下。須戒定色。然後婦女經盡交媾。即成孕矣。

婦人止宜調經。不可用春方種子。不可用香附丸耗氣血。亦宜寡慾。使血不妄動。或服六味丸。

相傳交合擇月生子。父母之年上下舉。坐胎之月為中正。乾坎艮震是男胎。巽離坤兌決是女。

○妊娠

驗胎 川芎 當歸各三 共為末。艾湯調下。覺腹內頻動是胎動罷即愈。

加胃湯

安胎飲

惡嘔 白朮 陳皮 半夏油炒 茯苓 蕺香各一 當歸 白芍各八 砂仁 竹茹 甘草各四
 紫蘇八 薑煎服○弱人加人參分

曾三個月墮胎血虛當歸身錢 川芎五白芍熟地生地各一 白朮二砂仁錢 陳皮五
 蘇梗五分 杜仲二錢 繢斷分 阿膠一錢 條芩一半○見血加 地榆 炒蒲黃各一 預防五月七
 月為丸亦可。棗肉丸。

心胃脹滿 當歸 川芎 白芍 人參 蘇梗 陳皮 腹皮各六 甘草三 木香分
 腹痛或下墜 安胎飲 砂仁 白芍倍 加熟地亦倍

胎動 安胎飲

面目虛浮 是水氣或久病所致宜健脾利水 人參錢 白朮二 川芎八 當歸錢 甘草三分 木香分

漏血 分 茟芩皮一錢

大率因勞因虛或食炙燙熱物過多宜謹房事服安胎飲。

心驚胆怯煩悶不安 人參一錢

白朮 當歸各二錢 川芎七分 甘草四分 陳皮三分 黃芩分 蕺仁

麥冬各一錢 八分 遠志分 生地分

竹葉十個○渴加竹茹分

腰脚腫虛人有此 甘草四分 青木香腰子妙 香附 紫蘇各六分

陳皮四分 烏藥五分 人參八分 當歸一錢 白朮一錢

甘草四分 木香二分○或兼服補中益氣湯。

心痛 立胡錢 歸身錢 乳香五分 甘草錢 加鹽鹵一滴少頃愈。

跌打傷胎 安胎飲

類中風 羚羊角一錢 川芎分 當歸二錢 獨活分 蕺仁一錢 五祐皮分 茄仁一錢 防風分 茆神

八分 杏仁十粒 木香二分 甘草四分○虛加人參一錢○瘦加竹瀝○胃弱加白朮一錢 薑煎

加味天地散
立胡散
安胎飲
羚羊角散

安營飲
加味逍遙散
二陳升提飲

淋病 白术 當歸 錢各二 茯苓皮 通草錢各一
便血或過勞或多食炒炙

當歸錢 呉藥錢 白术錢 茯苓分

柴胡 半夏油炒六分 柴胡 分升麻各四○或空心飲鹽湯探吐以升其氣則下自行。

甘草分 燈心分 黃芩分 竹葉十個

丹皮分 桔子分 甘草分

川芎分 人參一錢 甘草 陳皮各四

甘草分 燈心分 黃芩分 竹葉十個

丹皮分 桔子分 甘草分

川芎分 人參一錢 甘草 陳皮各四

上取法
鯉魚湯
桔梗湯
地黃湯

轉胞 淋閉不痛或微痛與淋
有別由氣虛胎壓胞

當歸錢 白术 生地各一分

白芍錢 橘皮少許 薑半斤 水四盃魚汁一盃半煎七分服

白芍分 丹皮分 桔子分 甘草分

黃芩分 貝母分八分

杏仁分 陳皮分 甘草分

黃芩分 丹皮分 桔子分 甘草分

黃芩分 丹皮分 桔子分 甘草分

黃芩分 丹皮分 桔子分 甘草分

大和湯
胃苓湯
金花湯
香蘇散
散邪飲
葛根湯
加味香連湯

遍身腫 白术
咳嗽寒風
咳血

白术錢 茯苓錢
天冬分 桔梗半錢

紫苑分 紫苑分
知母分

白术錢 陳皮分
陳皮分

麥冬錢 當歸錢
當歸錢

天冬錢 甘草分
甘草分

黃芩分 丹皮分
黃芩分 丹皮分

黃芩分 丹皮分
黃芩分 丹皮分

黃芩分 丹皮分
黃芩分 丹皮分

霍亂吐瀉
茯苓分○單瀉者
傷食

陳皮分
厚朴
蒼术

半夏分
茯苓分
厚朴

陳皮各一
砂仁
香附各四

陳皮錢
砂仁
香附各四

杏仁粒
橘皮少許
扁豆分

木瓜一錢
砂仁五分

黃芩分
甘草分

黃芩分
甘草分

黃芩分
甘草分

大和湯
胃苓湯
金花湯
香蘇散
散邪飲
葛根湯
加味香連湯

遍身腫 白术
咳嗽寒風
咳血

白术錢 茯苓錢
天冬分 桔梗半錢

紫苑分 紫苑分
知母分

白术錢 陳皮分
陳皮分

麥冬錢 當歸錢
當歸錢

天冬錢 甘草分
甘草分

黃芩分 丹皮分
黃芩分 丹皮分

黃芩分 丹皮分
黃芩分 丹皮分

黃芩分 丹皮分
黃芩分 丹皮分

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

青皮各七分
煎服。不愈者之

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

茯苓分
錢各一錢

陳皮錢
各一錢

黃柏八分酒
煎服

瘧疾初起
愈。但發熱太渴。加

白术
錢各一錢

紫蘇各二錢

陳皮各一錢

白芍
錢各一錢

黃芩各二錢

遺尿人有此 六味湯去 茶芩 澤瀉加

白薇 白芍 益智等煎服

口乾

安胎飲加

麥冬

乾葛 知母

炒梔

花粉

犀角

竹漿各八

八珍湯

潤胞湯

救生湯

月足。八珍湯服十數劑，再無難產之患。

漿破胎澀產難。

蜜 香油 酒各半

煎滾溫服。

催生歸全一錢

川芎二錢 龜板一片炙

頭髮皮存性一握燒

水酒煎服。

○虛人或產多力衰者加 人參

錢二三如人行四五里即下不下即宜再服。

其他催生藥皆受傷不可用。

○方產同小產

先用佛手散 當歸一錢

川芎七分

水酒合煎探之。○若未死則子母俱安須二三服。

○若已死 即用麝香五分 官桂末三錢

葱湯調下即出。

○胎死產母面赤舌青者死

生蒲黃 生靈脂各三分

水酒合煎探之。○元氣虛薄者。川芎 當歸各二錢 官桂四錢

○產後

方產未達食 川芎三錢 當歸八錢 炙草五錢 炮薑四錢

桃仁什五水二鍾煎七分加酒半盞溫服。連進

三服則血塊速化新血驟長自無量厥且產婦精神倍增不可厭煩若常一日一服豈能挽回將絕之氣血也。

素弱見諸危症。前湯不拘帖數服至病退止。

勞甚血崩形色脫

前湯加 人參三錢

煩服無虞。

汗多氣促

前湯加 人參二錢二湯敢用參者以加在生化湯內不能滯瘀血也。

血塊痛是瘀血

一應破血藥不可用只煩服前湯塊消痛止破血多致崩量戒之。

滋榮養氣
復神湯

妄言妄見 氣血兩虛
神魄無依 連進大補十數劑方效不可求速○痛未止者 川芎一錢 當歸三錢 炮薑四錢
火草四錢 桃仁十二錢 人參二錢 益智八錢 柏仁一錢 陳皮三分 裹煎服○真知瘀血不行
合失笑散○痛止者 圓肉八錢 川芎一錢 當歸熟地錢各二錢 火草四錢 人參二錢 黃耆 白木

棗仁

柏仁

茯神

益智

陳皮

麥冬

五味子

蓮肉

桃仁

山

白木

傷食不可忘○痛未止者

川芎二錢

當歸五錢

神曲

麥芽六錢

炮薑

火草四錢

桃仁十個

健脾消食
活命丹

查

砂仁

人參

白木

山楂

砂仁

神曲

麥芽五錢

餘脫前或用揉按或用炒

神曲

湯

扶正湯

滋營益氣

川芎一錢

當歸錢

熟地

吳萸一錢

肉桂五錢

虛人加

人參

水煎先用一錢送飯焦二三匙後漸漸

活命丹

草五分

人參

白木

半錢

砂仁

人參

水煎先用一錢送飯焦二三匙後漸漸

加多以引胃氣煎參不可用藥鍋恐聞發

川芎一錢

當歸六錢

炮薑

火草四錢

木香

陳皮

人參

若怒後傷食照前傷食加

類瘧症

寒熱往來應時發作或日晡夜間更甚或有汗或頭汗不及

川芎一錢

當歸錢

火草五錢

人參

水煎先用一錢送飯焦二三匙後漸漸

滋營益氣

扶正湯

參

熟地

黃芪

麥冬

白木

陳皮

人參

水煎先用一錢送飯焦二三匙後漸漸

加麻黃

錢

間股

六味丸

如明知感寒頭痛無汗

生化湯

羌活

防風

人參

水煎先用一錢送飯焦二三匙後漸漸

養胃湯

散之○如頭痛無汗

川芎

當歸

藿香

炙草

人參

水煎先用一錢送飯焦二三匙後漸漸

○有痰加

竹瀝

薑汁

半夏

川芎一錢

當歸三錢

乾薑四錢

桃仁十個

水煎先用一錢送飯焦二三匙後漸漸

辛散湯

七日內外發熱頭痛腸痛

氣血虛陰陽不和血症不可

川芎

當歸

白芷

當歸

乾薑

桃仁

水煎先用一錢送飯焦二三匙後漸漸

潮熱有汗大便不通○口燥舌乾而渴○汗出譖語便秘

川芎

當歸

白芷

當歸

細辛

烏梅

人參

水煎先用一錢送飯焦二三匙後漸漸

養陰湯

便祕

肉蓯蓉

陳皮

麻仁

黃耆

麻黃根

人參

水煎先用一錢送飯焦二三匙後漸漸

人參

水煎先用一錢送飯焦二三匙後漸漸

湯
瀉藥活絡
順腸粥

冬人參各一○腹滿便實加麥冬錢一枳殼分○汗出譫語伏神遠志棗仁柏仁黃耆人參白术各一○若明知感寒照上類瘧治法大抵此症屬虛者多不可輕易大便日久不通非大料芍歸至數斤不能取效。芝麻升和米合煮粥食即愈。

口噤筋搐類中風

勿用風痰藥方產只用生化湯連服三服後即加入參少佐橘紅炒芩○如痛止

川芎半錢

當歸錢一熟地二黃耆茯神天麻

麥冬各一陳皮荆芥防風羌活四

分苗連姜炒三分

人參錢一痰加半夏餘症悉照前方

天麻湯

天麻湯

中風恍惚語澁四肢不利

天麻防風各五錢一熟地川芎分七

棗仁錢一羌活分八人參遠志

山藥柏仁麥冬各一

細辛四錢一南星麵半夏麵各八錢一當歸一

棗仁錢一羌活分八人參遠志

砂為衣亦可

亡陽脫汗速灌加生化湯倍參以救危急方產形色脫瀉汗出為脫汗

麻黃根湯

虛汗不止

當歸錢一

黃耆半錢一

麻黃根錢一

桂枝五錢一

人參一錢一

牡蠣浮參

麥冬各一錢一

○痛止加

白术錢一

熟地三錢一

○手足冷加

熟附片一錢一

炮薑分四

○渴加參冬一錢一

五味子十粒一

○惡風寒加

防

風邪○肥人加

竹沥蓋一小

并間服六味丸加

黃耆五錢一

五味子煎湯下

止汗湯

生津飲

盜汗

湯能治

各四分葛根錢一

○渴甚生脉散代茶不可疑而不用

○單渴人參麥冬小麥花粉黃耆當歸竹葉

口噤背反氣微類症汗多附子

川芎錢一

當歸錢一

麻黃根錢一

桂枝防風

羌活

羚羊角

天麻各六

漏氣虛兼濕○痛未止

川芎 茶芩各二

當歸錢一

炮薑 炙草各五

蓮肉粒八○痛止

川芎錢一

當歸錢一

炮薑分

炙草五 人參三

肉蔻一

白术錢二

陳皮五 分

澤瀉八分○下清水寒

炮薑

砂仁各八

○色赤黃肛門痛為熱

加黃連五分○米食不化加

砂仁

山楂

麥芽○少食不安漏即覺安快者亦以食積論消

加升麻五分○水多

加 蒼朮一錢

完穀不化脾

傷

非胃苓能治○痛未止

川芎一錢一當歸四

炮薑分 炙草五

桃仁什

益智各一

益智錢一

茯苓半錢

砂仁一錢○痛止

川芎

當歸

白芍

茯苓

益智各一

人參

白术錢二

炮薑

炙草各五

蓮肉粒

肉蔻固○水多加

澤瀉

木通各八

○漏痛加

砂仁分○漏加

砂仁分○漏加

砂仁

五味○寒

加 炮薑

木香分

餘治同上○若漏久

六君子湯加

肉蔻

木香○久漏痢虛者

參耆散

人參 木香各二

肉蔻 茯苓

扁豆各四

陳皮

粟殼各一

為末米飲下

利膈

治產病此最難

○七日內

川芎一錢二

當歸五

甘草分

桃仁十

茯苓一錢一

陳皮四

砂仁分○

七日外可加

白芍

黃連炒

蓮肉

厚朴分五

○胃氣虛漏黃色

補中益氣加

木香○傷食

照前加○四肢浮腫

六君子合

五皮

荳皮

腹皮

五茄皮

薑皮

桑白皮

六合湯

附子湯

霍亂

氣血虛損○傷食感寒

○痛未止

川芎

當歸

乾薑

茯苓

人參

草豆蔻

生薑

嘔逆

生化湯加

霍香

半夏

砂仁

生薑

陳皮○痛止更加

白术

前胡去桃仁

水腫

脾腎虛

人參

白木各二

白芍一

陳皮五

木瓜分

紫蘇

本通

附子湯

補中利水

厚朴各四

○因寒濕傷加

半夏

生薑

蘇葉

五茄皮亦可

腹皮

歸脾湯

安神丸

清骨散

保真湯

立效方

怔仲驚惶

(二錢)

白术

木香

柏仁

素壯火盛者

炒番蓮

黃耆

當歸

川芎

地骨

五靈脂

木通

赤芍

腹痛

不語

惟調脾胃補心血方產○痛止。茯神、棗仁、黃耆、人參、麥冬各一錢。當歸、遠志分、當歸。

服生化湯連服即愈。

白术錢一。龍眼肉八個。炙草三分。虛煩加。竹茹○瘀加。竹懸。薑汁或更加。

木香分。炙草一分。虛煩加。

柏仁○素壯火盛者。炒番蓮。生地。歸身各三錢。炙草伍分。蒸餅九株。砂為衣。每服四十九粒。

木香分。當歸。柴胡。前胡。黃連。烏梅各八錢。猪骨髓段。韭白根。煎成入猪膽汁少許服。後服。

川芎。地骨各八錢。人參。茯苓。麥冬。白芍。枸杞。生地。熟地各一錢。白木錢。甘草。

黃耆。天冬各二錢。五味子十粒。黃柏六錢。知母一錢。棗煎服。

胃脘痛。因寒冷。生化湯加。肉桂。吳萸○傷飲食。昭前加。便祕加。肉從蓉○如不止。蒲黃三錢。

五靈脂一錢。木通。赤芍。沒藥各一錢。炙草。薑黃各一錢。鹽鹵滴○如喜按少止。是虛。

腹痛。但服生化湯○稍久。調失笑散下玄胡錢一錢。如虛寒痛。生化湯加。白芍炒。桂枝各五錢。

痛止減去。傷食。昭前加。

小腹痛。血塊者。生化湯加。玄胡錢一○如無塊喜按屬虛。加。熟地錢三錢。玄胡。肉桂各八錢。

骨指痛。頭痛也。當歸。人參。黃耆。生薑。淡豉。韭白。取豬腎汁煎服。

遍身痛。非傷寒由氣。當歸二錢。甘草三分。白术。牛膝。獨活。肉桂各八錢。韭白根。薑三分。

腰痛。屬勞傷或風寒所乘。當歸二錢。獨活。桂心。川芎。杜仲各八錢。續斷分。防風四錢。桑寄生分。薑煎。

二服後不。虛也。加。熟地錢三○失血過多者。加。當歸二錢。黃耆。白芍各五分。

乍熱乍寒。陰陽不和。當歸。白芍。川芎。人參。炙草各八錢。炮薑一錢○小腹痛。提血。照前法治。

虛腫。因敗血者。當歸。赤芍。桂心各一錢。沒藥。琥珀各一錢。麝香。細辛各五錢。炙草二分。為末。每服五分。薑汁酒調下○因膽虛水不利者。昭前服。

七珍散

養榮壯督湯

不語。人參。石菖蒲。生地。川芎各一錢。細辛分。防風分。辰砂分。薄荷分。合生化湯服。

