

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷四十二



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

欽定四庫全書

傷寒

傷寒論

陽明病

在裏

不得卧 潮熱 譫語

明 王肯堂 撰

黃陽明之為病胃家實是也謂之正陽陽明屬下證輕

欽定四庫全書

證治準繩

一

則大柴胡重則大小承氣此邪自陽明經傳入府者經
曰陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿
有潮熱者此欲解可攻裏也手足濇然汗出者此是大
便已鞭也大承氣主之若汗多微發熱惡寒者外未解
也其熱不潮未可與承氣湯若腹滿不通者可與小承
氣湯微和胃氣勿令大泄下謂陽明亦有在經者未全
入府猶宜解外縱有大滿大府不通亦不過小承氣微
下之入胃在經猶宜兩審也其陽明一證少有自病多

因太陽傳入魚與太陽陽明合病用葛根湯者是也少陽陽明合病用黃芩芍藥湯者是也自少陽傳入陽明及未合併病者亦然

陽明經治法有汗吐下溫和解刺

汗

桂枝湯

麻黃湯

五苓散

此亦作汗劑

麻黃連軹赤

小豆湯

吐

梔子豉湯

下

調胃承氣湯 大承氣湯 抵當湯 麻仁丸

茵陳蒿湯 小承氣湯

溫

吳茱萸湯 四逆湯

和解

白虎湯 白虎加人參湯 猪苓湯 小柴胡湯

蜜導煎 猪膽汁 土瓜根 梔子蘖皮湯

刺

熱入血室刺期門

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也

答曰太陽陽明者脾約是也

經曰跌陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇

相搏大便則難其脾為約麻仁丸主之 太陽病三正

日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣湯主之

陽陽明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便已胃

中燥煩熱大便難是也

宜小承氣湯微瀉之蓋少陽復不可下也 按本草大黃酒浸

入太陽經酒洗入陽明經病之高下全在酒之多少以引之耳又按太陽陽明正陽陽明承氣湯中俱用酒浸惟少陽陽明為下經故小承氣湯中不用酒浸也以此推之則太陽陽明當用調胃承氣湯蓋以調胃承氣既附在太陽篇中而大黃下註曰酒浸正陽陽明當用大承氣其大黃註曰酒洗少陽陽明當用小承氣湯不惟大黃不用酒浸洗而少陽禁汗下故去芒硝之峻劑而且當少少與之也書此以駁成氏之誤又須識太陽陽明脾約九少陽陽明又可大柴胡也又有說在不大便之條

問曰何緣得陽明病答

曰太陽病發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因

轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明也

成本太陽病不

解因發汗利小便亡津液胃中乾燥太陽之邪入府轉屬陽明古人登廁必更衣不更衣者通為不大便不更

衣則胃中物不得泄故為內實胃無津液加之蓄熱大便則難為陽明裏實也傷寒脈浮而緩

手足自溫者是繫在太陰太陰者身當發黃若小使自

利者不能發黃至七八日大便鞭者為陽明病也成浮為陽

邪緩為脾脈傷寒脈浮緩太陰客熱邪在三陽則手足熱邪在太陰則手足溫邪在少陰厥陰則手足寒今手足自

溫是知繫在太陰也太陰土也為邪蒸之則色見於外當發身黃小便自利者熱不內蓄不能發黃至七八日

大便鞭者即太陰之陽明病若能食名中風不能食名邪入府轉屬陽明也

中寒成陽明病以飲食別受風寒者以胃為水穀之海風為陽邪陽氣殺穀故中風者能食寒為陰邪陰

邪不殺穀故傷陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其寒者不能食

人必咽痛若不欬者咽不痛

按目眩之眩其字從目从玄謂其眼中黑暗也頭眩

之眩當作若藥不瞑眩之眩訓之謂眩憤亂也謂其頭岑岑然憤亂而不寧也凡書皆當活看不可拘執成陽

明病身不重痛但頭眩而不惡寒者陽明中風而風氣上攻也經曰陽明病若能食名中風風邪攻胃胃氣上

逆則欬咽門者胃之系欬甚則咽傷故必咽痛若胃氣不逆則不欬其咽亦不痛也胃氣主嘔肺氣主欬成

氏以胃氣上逆則欬恐非蓋風邪侵肺陽明病不能食也肺雖不為足經肺主氣風為氣類

攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故

攻其熱必噦

成不能食胃中本寒攻其熱復虛其胃虛寒相搏故令噦也經曰關脈弱胃氣虛有

熱不可大攻之熱去則寒起此之謂也

陽明病脈遲食難用飽飽則微煩

頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然

者脈遲故也

成陽明病脈遲則邪方入裏未化為熱也胃中有寒食難用飽飽則微煩而頭眩者

穀氣與寒氣相搏也寒熱相搏必小便難利者不能發黃言穀熱得泄也小便不利則穀氣醞釀成熟不得泄

出身必發黃疸黃也以其發於穀氣之熱故名穀疸熱實者下之則愈脈遲為寒故雖下之祇益其寒腹滿亦

不減也經曰脈遲尚未可攻

陽明病欲解時從申至酉止

陽明燥金旺於申酉

戌向旺時傷寒嘔多雖有陽明證不可攻也

見嘔陽明病

面合赤色不可攻之必發熱色黃小便不利也

成合通也陽明

病面色通赤者熱在經也不可下之下之虛其胃氣耗其津液經中之熱乘虛入胃必發熱色黃小便不利也

張夫陽明病理必近於可下但以面赤其熱猶在經故云不可攻若攻之則經中之熱悉入于胃鬱蓄而發黃色譬如下之太早成結胸之類陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之

利遂不止者死利止者愈

陽明病腹滿者為邪氣入府可下之心下鞭滿則邪氣尚

淺未全入府不可使下之得利止者為邪氣去正氣安正氣安則愈若因下利不止者為正氣脫而死尚淺
淺字不如高字

胃實不大便

大便難

大便鞭

燥屎

成不大便大便難大便鞭燥屎悉屬裏證宜下者多矣然有表未罷風濕相搏尤宜先解表已而下之可也

如經曰傷寒不大便六七日頭痛有熱者小便清知不在裏仍在表是也其證多見於陽明蓋胃土萬物所歸無所復傳自太陽少陽傳入者衆所共知而於三陰傳入者鮮或能識若能熟視其微則三陰有急下之證多矣豈非仲景之微意歟

胃實有表者先解表傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也須當發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯

三時羌活湯成不大便六七日頭痛有熱者故宜當下若

小便清者知裏無熱則不可下經曰小便數者大便必
鞭不更衣十日無所苦也況此不大便六七日小便清
者不可責邪在裏是仍在表也與桂枝湯以解外若頭
痛不已為表不罷鬱甚于經迫血妄行上為衄也丹
謹按外證未解不可下下為逆今頭痛有熱宜解表反
與承氣正是責其妄下之過也故下文又言小便清者
知其無裏邪不當行承氣又繼之曰須當發汗曰頭痛
必衄血宜桂枝湯反覆告戒論意甚明而註反直曰故
當宜下想因六七日不大便爾雖不大便他無所
苦候表解然後攻之正仲景法也註意似未瑩陽明

病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯陽明病脇

下鞭滿大便不利而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上

焦得通津液得下胃氣因和身濇然汗出而解也陽明病腹

滿不大便舌上胎黃者為邪熱入府可下若脇下鞭滿
雖不大便而嘔舌上白胎者為邪未入府在表裏之間
與小柴胡湯以和解之上焦得通則嘔
止津液得下則胃氣因和汗出而解 陽明中風脈弦

浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾
不得汗嗜卧一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦

耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小

柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦

者不治 成脈浮大為陽風在表也弦則為陰風在裏也
短氣腹滿脇下及心痛風熱壅于腹中而不通

也若寒客于內而痛者按之則寒氣散而痛止此以風
熱內壅故雖久按而氣亦不通陽明病鼻乾不得卧自

汗出者邪在表也此鼻乾不得汗而嗜卧者風熱內攻不干表也一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦者風熱攻于胃也陽明之脈出大迎循頰車上耳過客主人熱勝則腫此風熱在經故耳前後腫刺之經氣通腫則小差如此者外證罷則可攻若外證不解雖過十日脈續浮者邪氣猶在半表半裏與小柴胡湯若其脈但以浮而不弦又無諸裏証者是邪但在表也可與麻黃湯以發其汗若不尿腹滿加噦者關格之疾也故云不治難經曰關格者不得盡其命而死

口苦咽乾脈浮緊宜和陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難也

發熱惡寒表未

解也而悞下之則亡陰無陰則陽無以化陽明腹滿脈故腹滿小便難也許學士云宜小柴胡湯

浮緊口苦咽乾而喘若發熱汗出不惡寒反惡熱身重者忌發汗忌加燒針忌下論見自汗陽明病脈浮而緊者潮熱發作有時但浮者必盜汗出

右胃家實不大便雖三尺之童亦知可下也殊不知仲景之法雖有胃實證若表未解及有半表者亦先用桂枝柴胡以解外然後視虛實消息之也

胃實表解無證者忌攻大便鞭者導之陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖硬不可攻之當

須自欲大便時宜用蜜煎導而通之若土瓜根及人猪膽汁皆可導之

蜜煎導法

用蜜七合入銅器中微火熬稍凝似飴狀攪之勿令焦候可丸以手捻作挺子令頭銳大如指長二寸許乘熱急作之納穀道中用手急捺住欲大便時乃去之又猪膽汁方用大猪膽一箇瀉汁和醋少許和勻灌入穀道中如飯時頃大便自去