

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百五十八



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

大正四年...

普濟方卷一百五十八

周王朱櫛撰

霍亂
治法
食治法
霍亂言

霍亂
治法
霍亂言

無名為霍亂也皆為飽
所不食多飲寒漿眠卧
食結而不消陰陽二氣

陰陽交錯變成吐利而

大正四年...

普濟方

一

已百脈昏亂榮衛俱虛冷搏於筋則令轉筋宜以食治之也

方

訶梨勒粥方 治霍亂不止心胃煩悶

訶梨勒皮兩半生薑一兩切粳米二合

右以水三大盞煎訶梨等取汁二盞去滓下米煮粥不計時候食之

高良薑粥方 治霍亂吐利腹痛等疾

良薑一兩 粳米二合

右以水三大盞煎良薑取二盞半去滓下米煮粥食之

蠟粥方 治霍亂後氣脫虛羸或瀉不止

黃蠟五錢 粳米三合
細研

右先以水煮粳米作粥臨熟次下蠟更煮臨蠟清溫服之

食治五噎附論

夫五噎者一曰氣噎二曰憂噎三曰食噎四曰勞噎五曰思噎由陰陽不和三焦隔絕津液不利氣不調理之所至也此皆憂恚嗔恐氣結在於心胃不得通變是以成噎宜食治之也

方

烏雌鷄切麵羹方 治五噎飲食不下胃中結寒瘦弱無力

烏雌鷄半隻治如食法白麵四兩桑根白皮三分末赤茯苓三分

末桂心末一分

右二味末入麵中以水煮桑根白皮湯溶麵切入豉中煮熟與鷄肉調和一如常法食之

羊肉索餅方 治五噎胃膈妨寒飲食不下瘦弱無力

羊肉四兩炒白麵半生薑合陳橘皮一分湯浸
作臠
去白焙

右以橘皮末及生薑汁和麵作索餅於豉汁中煮熟入臠食之良

黃雌鷄臠索餅方 治五噎飲食不下胃膈妨寒瘦弱

無力

黃雌雞

一隻去毛
腸炒作臠

白麵

半挂心末
一分赤茯苓末

右以挂心等麵和末作索餅於豉汁中煮入臠食之

治氣噎方

蜜

半斤酥兩三生薑汁合

右相和以微火煎如稀湯每於酒中調一匙服之或

空食亦佳

挂心粥方

治胃膈痰氣壅結食飲不下如似鯁噎

桂心分三赤茯苓兩一桑根白皮兩二

右細剉以水三大盞煎至二大盞半去滓下粳米二合煮作粥食之

治噎病不下食方

春杵頭細糠合半白麵兩四

右相和溶作餽飩於豉中煮食之

治噎不下食方

右用崖蜜每於粥中化半匙食之

又方

右用老牛噉沫如枣許大置稀粥中飲之終身不復
噎矣勿令患人知

食治反胃嘔吐

方

粳米粥方 治反胃羸瘦四肢萎弱

粳米

一合

薤白

七葉細切

豉

二十粒

枳殼

去麤末一分

生薑汁

半大棗

擘破二枚

陳橘皮

去白焙乾為末一分

右除薤白米外以水三盞先煎除藥至兩盞去渣下薤米與煮以熟為度空腹任意食之

羊肚方 治反胃食

羊肚淨洗一枚陳橘皮湯浸去白切二兩豉半斤葱白十莖鹽少許

右將四味貯入羊肚內以繩繫頭煮熟去藥拌將羊肚細切任意食之

猪肚羹方 治嘔吐

猪肚淨洗去脂膜一枚人參一兩陳橘去白切三分生薑去皮細切一兩

蘆根

細切
半兩

右以水一斗煮蘆根至七升去滓次用人參等三味
貯在猪肚中以線縫合再用蘆根汁煮令爛熟去藥
滓將猪肚細切作羹任意食之餘汁勿棄作三五次
飲盡

生薑粥方 治反胃嘔吐不下食

生薑

去皮細切
研一兩

枇杷葉

拭去毛炙
七片為末

右以水二升煎至一升去滓用白粳米一合煮粥更

入鹽醬汁五味等空心溫食之

人參粥方 治反胃吐酸水

人參半兩生薑取汁半兩

右以水二升煮取一升入粟米一合煮為稀粥覺飢食之

撥粥方 治反胃羸弱身不能動氣泛醋心亦治赤白

痢及水痢

生薑三兩研白麵取汁四兩

右以薑汁和麵作撥粥煮食之

羊肉生湯 治反胃朝食夜吐夜食朝吐諸藥不差

羊肉

去脂膜切
作生五兩

大蒜

去皮細
研一顆

右先將蒜入鹽醋蘸羊生空腹任意食之

薄荷餠飪方 治反胃朝食暮吐

紫薄荷

新者一握
搗取汁

麵

四兩

右和作餠飪煮熟空腹食之

羊肝方 治反胃食畢即吐出

羊子肝

一具切為條

礪砂

五錢取霜

右調和令勻以竹杖穿炙空腹食之一方無礪砂生

切羊肚五味調

又方

右用蜎皮一枚炙令焦為末先以水二盞菹豆煮粥續入蜎皮末一錢和服之

又方

右用蒼耳不限多少嫩者端午日取煮熟作菜茹食

治反胃

右用糯米半升裏流水擺取清暴乾燒為末砂糖溶
令和旋吃立止

食鷄子法 治反胃飲食不進

附子一个 炮去皮臍 鷄子 三个

右先将附子為粗末同水二碗煮鷄子水進為度然
後取鷄子溫水洗去殼令病者旋食之

烏鷄法 治結腸翻胃飲食入腹經宿則吐食粒不化

天南星

三个極大者
切作三片

右以純烏雞一隻去腸并毛內南星在內以繩縛定
用紅酒三升煮乾為度去南星不用取雞食以人參
末半兩調溫酒送下次用糯米壓之然後以平胃散
多加薑棗煎神

食治煩熱

附論

夫心煩者由陰陽更虛陰氣偏少陽氣暴勝故也亦有
風熱相搏風毒攻心煩燥昏憤狂言失志宜食治之