

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷十七



北京中醫藥大學圖書館版權所

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷十七

訂正傷寒論註目錄

正誤

存疑

陶隱居名醫別錄合藥分劑法則

三陰三陽經脈圖註

傷寒刺灸等穴圖

御纂醫宗金鑑卷十七目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷十七

訂正仲景全書傷寒論註正誤存疑篇

仲景傷寒論篇篇可法但成於漢末傳寫多訛錯

簡亦復不少如論中下利嘔逆用十棗湯峻劑攻

之陽重衄血以麻黃湯發之發汗病解反惡寒病

解之中多一不字心下痞按之濡濡字之上少一

不字之類諸家遵經註解不得不穿鑿附會致令

千古不可多得之書不能傳信於世良可惜也今
加正誤一一列明每條凡小字傍右者原文也傍
左者改正之文也居中者原文所有或移上或移
下或他處移入及原文所無而補之者也字上加
□刪去者也尤有整節舛謬者三十五條證不與
脈符藥不與病合雖有是方世無其病即有其病
難用是藥承訛襲謬無濟實用然其中尚有可採
之句所以各篇不動經文強加註釋復錄原文附

於卷末以誌闕疑云

太陽上篇正誤

桂枝湯方

桂枝

三兩
去皮

芍藥

三兩

甘草

二兩
炙

生薑

三兩
切

大棗

十二
枚擘

按桂枝湯方原文有去皮二字夫桂枝氣味辛甘全

在於皮若去皮是枯木矣如何有解肌發汗之功

耶當刪之後倣此

若衄和其人煩目重

衄

內際黃者此欲解也

按臉字當是瞼字瞼眼弦也作臉字非當改之

太陽中風

不利

嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出

發

作熱

有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出

不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之

按

下利之下字當是不字若是下字豈有上嘔下利

而用十棗湯峻劑攻之之理乎惟其大便不利痞

鞭滿痛始屬裏病小便不利嘔逆短氣始屬飲病乃
可峻攻發作之作字當是熱字始與太陽陽邪熱
飲之義相合若無熱汗出乃少陰陰邪寒飲真武
湯證也且作字與上下句文義皆不相屬當改之
太陽病下之其_{浮促}不結胸者此為欲解也_{浮促}者必
結胸也_{細數}者必咽痛_{細數}者必兩脇拘急_{細數}者必
者頭痛未止_{細數}沉緊者必欲嘔_{細數}沉滑者協熱利_{細數}
滑者必下血

按 衄促當是衄浮始與不結胸爲欲解之文義相屬
衄浮當是衄促始與論中結胸胸滿同義衄緊當
是衄細數衄細數當是衄緊始同論中二經本衄
衄浮滑當是衄數滑浮滑是論中白虎湯證之衄
數滑是論中下膿血之衄均當改之

太陽病二三日不能臥但欲起心下必結衄微弱者此
本有寒分也反下之若利止必作結胸未止者四日復
下利此作協熱利也

按四日復下之之字當是利字上文利未止豈有復下之理乎當改之

太陽病下之後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若汗出微惡寒去芍藥方中加附子湯主之

按微惡寒之上當有汗出二字若無汗出二字乃表未解也無加附子之理當補之

太陽病脈浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫

反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣煩躁心中懊懣陽氣內陷心下因鞭則爲結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出餘無汗躋頸而還小便不利身必發黃也

按數則爲虛句衍文也當刪之

寒實結胸無熱證者與三物

小陷胸湯

白散亦可服

按與三物小陷胸湯當是三物白散小陷胸湯四字

當是錯簡桔梗貝母巴豆三物其色皆白有三物

白散之義溫而能攻與寒實之理相合小陷胸湯
乃栝蒌黃連皆性寒之品豈可以治寒實結胸之
證耶亦可服三字亦衍文也俱當刪之

太陽中篇正誤

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之
按發汗病不解之不字衍文也發汗病不解則當惡
寒何謂反惡寒病解惡寒始可謂虛當刪之

病發熱頭痛脈反沉若不差身體疼痛下利清穀當溫

其裏宜四逆湯

按身體疼痛之下當有下利清穀四字若無此四字則當溫其裏之文竟無着落矣未有表病而溫裏之理也閱後太陰篇中云傷寒醫下之續得下利清穀不止身痛者急當救裏四逆湯其義益明遵經補之

傷寒若汗若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時汗惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎

加人參湯主之

按傷寒之下當有若汗二字蓋汗較吐下傷津液爲多也時時惡風當是時汗惡風若非汗字則時時惡風是表不解白虎湯在所禁也論中謂發熱無汗表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之細玩經文自知當補之改之發汗已衄浮數小便不利煩渴者五苓散主之

按衄浮數之下當有小便不利四字若無此四字則

為陽明內熱口燥之煩渴是白虎湯證也惟其小便不利而煩渴斯為太陽水熱瘀結之煩渴始屬五苓散證若非小便不利而用五苓散則犯重竭津液之禁矣況太陽上篇類此證者數條惟水入即吐一條乃水不下行故無小便不利之文餘皆有小便不利四字今此四字必是傳寫之遺當補之

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿

微痛小便不利者桂枝湯去桂藥加茯苓白朮湯主之

按去桂當是去芍藥此方去桂將何以治仍頭項痛發熱無汗之表乎細玩其服此湯曰餘依桂枝湯法煎服其義自見服桂枝湯已溫覆令一時許通身皦皦微似有汗此服桂枝湯法也若去桂則是白芍甘草茯苓白朮並無辛甘走榮衛之品而曰餘依桂枝湯法無所謂也且論中脈促胸滿汗出惡寒者用桂枝去芍藥加附子湯主之去芍藥者