




38

中西醫學報
(德華醫學雜誌)

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

中國近代
中醫藥
彙編
期刊

第一輯

38

中西醫學報

(德華醫學雜誌)

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目 錄

中西醫學報 第九卷第九號		1
中西醫學報 第九卷第十號		81
中西醫學報 第九卷第十一號		165
中西醫學報 第九卷第十二號		261
德華醫學雜誌 第一卷第一號		357
德華醫學雜誌 第一卷第二號		469

THE MEDICAL PRESS LTD. 221 MYBURN ROAD, SHANGHAI

中西醫學報

The International Medical Journal
September 1927 Vol. IX No. 9.

月九年六十 號九卷九

最新發現的D維他命與軟骨病	丁惠康
疾病新療法叢談	丁錫康
難之藥物療法	丁錫康
麻瘋治法述要	傅樂仁
白喉患者脈搏之研究	丁錫康
傷寒之調理	丁錫康
咯血與吐血之分辨	曾立羣
小兒疾病之一般預防法	煥長
試	丁惠康
外科學大綱	丁惠康
小論	丁惠康

The Medical Press Ltd.

221 Myburn Road, Shanghai

總發行所上海英大馬路二二一號

勒吐精代乳粉原料 完全乳質別無他物



勒吐精代乳粉乃純潔鮮牛奶用
最新科學方法將水份取出而成
粉形

將勒吐精代乳粉之原質及成分
用化驗法分析之可以證明其原料內完全

乳質別無他物

勒吐精代乳粉用六份半水沖調後與康健

母乳相同而為嬰孩代乳聖品

最新發現之 ERGOSTERIN 與軟骨病

丁惠康

Dr. W. K. Ting Assistenzarzt Paulun Hospital Shanghai

菌類與酵母 (Hele) 中每含有一種「愛格司太林」者。Ergosterin 其化學的成分爲 $C_{27}H_{42}$ 自危德 (Windaus) 與伯而 (Pohl) 二氏經過種種之研究後始知「愛格司太林」實與化學上純粹的「可來司太林」Cholesterolin (註一) 具有同樣的化學與物理的性質。但純粹的「可來司太林」抵抗軟骨病毫無功效。而「可來司太林」若含有「愛格司太林」時。復經過紫外線作用 (Ultravioletbestrahlung) 之後。即有抵抗軟骨病之功能。據危德氏之動物試驗。則此「愛格司太林」者。實爲抵抗軟骨病維他命 (Vitamin) 中之原動物質。

危德氏之動物試驗。係將「愛格司太林」先經過三十分鐘繼增至六十分鐘之感光作用。然後溶解於一比一千或一比二千之橄欖油中 (Oliveoel) 但在試驗之際。尚須將此基本溶液沖淡。至每〇・一耗 (ccm) 中。約含有四百分之一糖 (mg) 之純粹「愛格司太林」。含以上數量之溶液。已可治愈患軟骨症之鼠類。同時若注射兩倍容量之橄欖油。而不含「愛格司太林」時。則於軟骨病之治療上。毫無影響。不見功效。又同樣試驗之結果。曾得之於廿五例患軟骨病之孩童。其治療的成績。至爲圓滿。吾人若每日予以一至四糖 mg 之感光性的「愛格司太林」。則急性及各種之軟骨病以及痙攣等。

最新發現的 D 維他命與軟骨病

一

最新發現的D維他命與軟骨病

二

皆可全愈。其痊愈之程度。雖各有遲速之不同。但從無一次之失敗。吾人若欲其治療迅速見效。可漸漸增加其分量。至二—四糖mg之外。同時並予以牛乳蛋黃及光線療法等。

以克凱氏 Gyoerdy 之觀察。則維他命不僅在兒童軟骨病之治療上有效。即成人之癱攣 Tetanie 及骨軟化症 Osteomalacie 亦有佳良之結果。據海台山病院中克來而氏 Geh-Rat von Krehl 之報告。謂一四十八歲之患婦。已患骨軟化症十七載。是症最初發生於產後之半年。以後每年夏季。則病情稍形輕減。入冬則復加劇。於一九二〇年。雖施以卵巢切開術。亦無效果。自一九二二年以來。患婦即完全不能行動。乃自今年二月入院以後。即予以感光的「愛格司太林」治療。二星期後。各種之痛苦。即已減輕不少。三星期後。已能扶杖起立。自由行動。其功效可謂巨矣。此種感光性的「愛格司太林」已有製劑行世。名維康士 Vigantol 也。

(註1) Cholesterin 可來司太林。其化學成分爲 $C_{27}H_{46}(OH)$ 多含於膽汁、血液、腦、卵黃中。

疾病新療法叢談

丁錫康

Dr. med. S. K. Ting

(一) 塞克氏對於凶險之孕婦嘔吐。(不進飲食并身體消瘦) 用因蘇林甚有效。初時每天注射二次。每次 5 Units (五單位) 可加增至 20 Units (二十單位) 注射前不食澱粉質。效驗甚速。病者不嘔吐。胃口良好。體重加增。

(二) 羊癲 Epilepsy 一症。克福二氏施行 Calcium Chloride 及 Gluco-calcium 之靜脈注射。其結果不甚美滿。

(三) 赫斯氏以下列藥物治流行性感。甚有效。驗較用 Salicylic Acid 或他種藥品為佳。每藥一管含

Quinine Hydrochloride gr. ½

Camphora Monobromate gr. ½

Hexamethylenamine gr. ½

Methylene Blue gr. ½

以上藥物。須細心混和。加入管內。初起時服一粒。四時內最服一粒。惟二十四小時內至多服四粒。

疾病新療法叢談

1

疾病新療法叢談

二

小孩之分劑須減輕。

(一) 休氏用愛米丁 *Emetine Hydrochloride* 治潰瘍性大腸炎注射 0.02gm. 每天三次。患者須靜臥。并每天行肛門灌洗一次。

(二) 格何二氏以大量之因蘇林 *Insulin* 每天六十至一百單位。用于肝病患者。謂可減却黃疸症狀。
(一) 貧血症 *Secondary Anemia* 用馬血清 *Horse Serum* 口服治之。此特別製之血清。其名爲 "he-nostyle" by Roussel.

(一) *Potassium cyanide* 中毒。用百分之三十之 *Sodium Thiosulphite* 靜脈注射。治之。凡打二次。每次十西西。強心劑及 *Dextrose* 溶液同時並用亦佳。

(一) *Trypsamide* 治神經系梅毒。頗效。百分之七十之患者。其症狀中止增進或見佳良。

(一) 鵝口瘡 *Thrush* 用 2.5% 或 3. % *Ferric Chloride* 溶液置諸局部。有效。惟溶液不宜太濃。因有刺激也。

(一) 才納亭氏用 *Sodium Thiosulphate* 治肺結核七十例。其結果百分之七十六有效。初時分量須輕。自 0.05 gm. 至 0.10 gm. 以後逐漸增加至 1 gm. 自始至終。共可注射 10 至 12 gm.。

(一) 十二指腸蟲病馬氏用 *Carbon Tetrachloride Oil* *Chenopodium* *Thymol* 三藥試用。其結果以 *Carbon Tetrachloride* 一藥爲最佳。

(一) 維休氏有一例之化膿性氣管枝炎。其原因爲 *Vincent's Spirochets* 及 *Fusiform bacillus* 用

Nearsphenamine 靜脈注射。注射三次。效驗極佳。分量第一次0.15 gm. 第二次0.3 gm 第三次0.6 gm

(一)開姆氏對於輕症或重症之結核患者。治以塞拿克拉新 Sanocrysin[®] 三日以內。其痰質現象完全變化。痰量大減。痰內結核細菌。初時增加。後即減少。以至絕跡。(白血球增加。白血球內有含結核細菌者)故此類金類藥物療法。能助白血球破壞細菌或減少其抵抗力。

死海

瞻廬

人以死海爲畏途。而人無有不至死海者。或遠或近。所差者距離問題耳。富靜也。澹泊也。葆養也。皆所以延長死海之距離也。麴蘖戕其性。粉黛搖其精。而又益以種種患得患失之計畫。是猶航行死海者。星夜遄征。兼程並進。而又駕以輕舟。掛以片帆。鼓以雙槳。務求增進其速率而後快。彼豈與生爲仇哉。何兩兩焉縮短死海之距離也。

死海之距離本遠。而人乃百出其計以縮短之。問諸其人。冥然罔覺。猶曰。死海者我之畏途也。嗚呼。是謂惡醉而強酒。

Lehrbuch der Tuberkulose

新撰虛癆講義

丁福保譯述 醫學書局出版

一名結核全書共二十五章其一日總論凡結核之名義歷史及病理皆詳焉二曰肺結核即肺癆凡原因解剖的變化症候及診斷豫後療法皆詳焉而療法中述空氣療法物理學療法食物療法注射法資佩爾苦林療法為尤詳三曰腸結核其內容之次第皆與肺結核同不贅述四曰胃結核五曰喉頭結核六曰咽頭結核七曰舌結核八曰鼻腔結核九曰腎臟及膀胱結核十曰副睪丸及睪丸結核十一曰攝護腺結核十二曰全身粟粒結核十三曰結核性腦膜炎十四曰頭蓋骨結核十五曰結核性腹膜炎十六曰結核性肋膜炎及心囊炎十七曰結核性肋骨骨瘍十八曰腺病即淋巴腺結核(癰癤)十九曰骨結核二十曰結核性關節炎(關節結核)二十一曰結核性脊椎炎二十二曰狼瘡二十三曰結核性腱炎及腱鞘炎二十四曰結核性黏液囊炎二十五曰孤發性結核
每部定價七角

癆蟲戰爭記

亘古以來人類之殲於結核者已無量數矣歐美人士對於結核如臨大敵設會集議力謀防禦之法以期翦滅此而朝食么麼小醜始有不敵之勢惟其在亞洲一隅者跋扈自若蹂躪直前哀我黃人水旱疫癘之淬臻刀兵之不戢又加此耳目無所聞見之勁敵殘殺極慘其何以堪丁福保先生矢志去此蠹賊既譯肺癆病一夕談肺癆病救護法肺癆病豫防法以為同胞與結核對壘之援又恐措詞過深雅俗不能共賞乃著癆蟲戰爭記以稗乘之體裁談精確之學理使人讀之樂而忘倦書中之語託於結核菌自述尤足惹起讀者之注意讀者苟據此而投以其所忌人類其終戰勝結核乎 每部四角
肺病叢刊 是書彙刻治愈肺癆病各療法使最難治愈之肺病確有治愈之良方洵為醫家病家均所必備之書精裝一冊 每部五角

醫學書局發行

癰之藥物療法

丁錫康

Dr. med. S. K. Ting

癰 Carbuncle 之原因。由于葡萄狀球菌 *Staphylococcus Aureus* 或連鎖狀球菌 *Streptococcus pyogenes* (約占百分之十) 之傳染。以致皮下組織分子之壞死而起。迨大塊之腐肉脫落。此症方能漸漸痊癒。大都衰弱者最易患之。癰或爲一種內病之合併症。如糖尿病者所患之癰是也。癰之療法分爲全體及局部二種。

全體療法 (一) 增加病者全身之抵抗力。

(二) 排除體內之毒質。

(三) 助患者得充分之睡眠。

局部療法 (一) 止痛。

(二) 除去腐爛之組織。

(三) 防止細菌傳染。不致蔓延四周。

(四) 腐肉脫落後。使皮膚生長。

全體療法——對於病者所患之內病。例如糖尿病。設法先治療之。原因一。去。外症自癒。飲食須輕

癰之藥物療法

1

癰之藥物療法

11

便宜于消化。而多含滋養料者。總以雞蛋牛乳爲主。如病者抵抗力太薄弱。須採用輸血法。Transfusion 至葡萄狀球菌伐克辛注射療法。于急性期內。常無效驗。惟對于慢性患者。或稍有試用之價值耳。排除體內毒質。不外乎利小便。通大便。并增進皮膚排泄機能。每日須服足量之硫苦。使每日腹瀉一次。如腸內有敗壞質分。可服少量之甘汞。大量之飲料如清水檸檬水等。最爲緊要。每天可飲一加倫。洗浴亦甚有益。病者如因痛失眠。可用嗎啡治之。

局部療法——局部療法分手術與藥物二種。其宗旨不外乎消除疼痛。并助患處安靜。不宜多動。患處四周之皮毛。須剃去。并用水或以脫洗淨。極大之熱敷布 Hot foment 上覆棉花。每半小時換一次。頗有益也。茲迷格立非醫士之局部藥物療法。可以避免手術。頗有效驗。首先用此法者爲馬立孫氏。其療法之宗旨。即用硫苦糊漿。Magnesium Sulphate Paste 敷諸局部。使癰四周組織內之液質 Serum 被吸收外出是也。製造硫苦糊漿之法。茲列之如下。

先用乾燥硫苦 dried Magnesium Sulphate 1 磅半。與十一兩 11 oz. N Glycerine acid, carbolic and pure glycerine 攪和。(按乾燥硫苦乃一種白色粉末。較諸平常所用之愛潑孫鹽 Epsom Salts 其所含水量少百分之十二。)

先取 Glycerine 置于甚熱之臼內。加入 Sulphate。徐徐攪動之。成一厚白之乳脂狀物質。性能吸

水分。如置諸空氣間。

吸收濕氣甚速。瞬息即亦爲流質。故須置于有蓋之缸內。

癰之周圍先剃毛。用以脫洗淨。使乾。即以厚層之糊漿置于方塊之麻紗布上。敷患處及其四周。再加厚層之棉花。多量之液體。即被吸出。二十四小時內須換二次。敷後疼痛消失。中央之腐肉數日內即脫落。

中毒症狀減少。熱度降低。如腐肉已脫落。馬立孫醫士謂可用消毒之麻紗布。塞滿空洞內。此紗布須先浸于硫苦之飽和溶液內。(此溶液內須加 Glycerine 5 oz. to a pint)

按此局部藥物療法之佳處。在免去手術開刀之手續。惟治愈時間稍爲遲緩。不如開刀之有把握。故此法爲病者之不願開刀或麻醉劑不宜于其身體而設也。面頰部及鼻部之癰。最爲危險。對於此種患者。根本之手術療法。亟須應用也。

中風之原因及治法

一册五角

是書共八章一緒論二解剖說詳述腦髓動脈系統腦髓靜脈系統等三原因詳述年齡遺傳性時期卒中質酒精之影響腦風脂肝病鉛中毒及癱瘓質斯與微毒之關係血壓之變化精神狀態補助原因等四病理解剖的變化五症候六診斷七癱後八療法詳述預防法卒中發作療法反應期療法晚期療法與特發性腦出血之外科的療法等末附脊髓出血詳述原因解剖的變化症候癱後類症鑑別療法等學說豐富治療確實洵為中風一症之專門書也

癱瘓之原因及治法

一册七角

我國患癱瘓者最多惜大抵不能悉其症原又不能明其病理之變化故數千年來皆無正當之治法本書論治法及原因詳備無遺經丁福保先生譯成漢文又恐閱者於新名辭不易了解別將書中各種專名詳細解釋冠之編首名曰誘導篇是書勾深索隱開發詳盡不但吾國論癱瘓書中無此鉅作即在日本亦為不可多得之新著也

脚氣之原因及治法

一册六角

是書分上下兩編上編為中國舊法分名義原因症狀治法四章諸家學說經臨良方無不搜羅備載下編為新醫治法凡脚氣之症狀剖解的變化診斷預後療法及其所以發生之原因載之尤詳脚氣衝心唯一之療法為射血法他書多不載其手術此書並其學理亦詳載之洵最佳之脚氣病專書也

胃腸養生法

一册七角

胃腸病學中國向少專書本書可為胃腸病之豫防法其內容論飲食之目的消化之生理齒齒之預防胃腸之運動官能營養品滋養物之區別食品之分析肉類魚類之選擇法穀類豆類菜蔬類果實類以及飲料水乳汁肉汁鳥卵嗜好品等之良否攝食之時間食物之分量食時後之規則食器之取舍病人及康健人之標準食餌等燦然布列查為大觀其文淺其理明其試驗確實而易行雖屬養生一門實非尋常衛生書可比吾國之苦胃腸病者不可不讀也

癱瘓質斯彙編

一册六角

癱瘓質斯病 Rheumatism 中名曰風濕骨痛為最普通流行之一種病老年人及貧苦人因營養不良或有別種原因致患此病者尤多其他婦女農工人等一患風濕骨痛則百事被阻醫生束手診治十八九罔效故宜專讀「癱瘓質斯彙編」一本書臚列急性慢性關節肌肉各種癱瘓質斯病之原因及療法等詳確無遺病家醫家誠能按方治療洵無不可癒之風濕病矣

人體寄生蟲病編

一册七角

吾人各種疾病大半因寄生蟲而發故宜專讀本書第一章為腸管內之寄生蟲內分圓蟲類及扁蟲類如蛔蟲蟯蟲條蟲是也第二章第四章為肺臟肝臟腎臟之寄生蟲如肺臟二口蟲肝臟二口蟲及腎蟲等是也第五章為糞便之檢查法第六章為生活于血液中之寄生蟲第七章為侵襲於外皮之寄生蟲第八章為生活於結締組織內之寄生蟲皆搜輯東西諸家之學說細大不遺加以實驗故精而不謬博而不濫綴分部析具有條理能使世之治蟲病者左右而逢其源為吾國絕無僅有之譯本

麻瘋治法述要

傅樂仁博士

(一)麻瘋是一種慢性傳染病。患病的根本原因是。

(甲)密切的接觸——長時間的接觸。

(乙)致病的媒介——譬如花柳病、瘡疾、鉤蟲和其他一切衰弱症。

(二)起首醫治麻瘋時。應該問問有沒有他種疾病。同時並發。如果有的。那末在開始注射之前。先把這病治好。

(三)皮膚麻瘋差不多和其他皮膚病相類似的。所以應該辨別清楚。牠的特徵是。

(甲)麻木。

(乙)在皮膚或鼻管中發見微生物。

用懷疑的態度。檢視神經纖維。如不能十分確定。再找他種證據。

(四)患了麻瘋。皮膚上就要生出紅斑來。這種紅斑少有刺激性。但在斑塊的邊上。一定可以找到微生物。

(五)麻瘋神經纖維。其色不是白的。——白斑症和麻瘋是沒有關係的。這種纖維。色素極淡。毫不

麻瘋治法述要

一

麻瘋治法述要

二

隆起。輕輕按觸牠。沒有知覺。也無微生物散佈其間。

(六) 麻瘋有三個時期。

(一) 初起麻木時期——不傳染。

(二) 皮膚腐蝕時期——傳染力的強弱。與皮膚及黏液膜裏微生物的多少成正比例。(注意：如欲檢驗微生物。須通過表皮。從真皮中割取。方才有用。)

(三) 神經腐蝕永遠麻木時期——在這點我們要知道麻瘋會不治而自愈的。等到把病人犧牲掉了。病菌也就消滅了。在第三期內。麻瘋開始潰爛。四肢因神經毀壞而脫落了。

(七) 醫治麻瘋。須經過六個月至數年之久。大概須看他種雜症已否醫好。飲食是否充美。和能否有充分的運動而定。在第一第二兩時期中。當病菌初入身體時。對於藥力的反動。頗感困苦。到了第三期。反動便覺安適了。切弗誤認永遠的麻木為暫時的麻木。因在初時。麻木是暫時的局部的。以後便不然了。

(八) 如果你知道了這幾個事實。懷疑時徵求人家可靠的意見。那末許多的麻瘋病人。一定不至於進入悲慘絕望的境地了。

治法

(一) 先醫其他一切雜症。(二) 用下開藥方施治——

Hydnocarpus Ester 大楓子油

50 c.c.s