

欽定四庫全書

子部

金匱要畧論註卷二十七至
二十四



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

金匱要略論註卷十七

嘔吐喘下利病亦治

大嘔家有雜膿不可治

漢張機撰

嘉興徐彬註

自愈

胃或痰壅氣逆氣有餘皆屬於熱故行痰降逆

榮分熱而非氣分熱矣

因而亦嘔此毒盛也以治嘔法治之行痰降逆固為
無益而積熱成毒尚堪溫熱乎故曰不可治嘔然即
不治嘔不因氣由於榮分熱毒則膿盡而邪衰邪衰
而嘔止故曰膿盡自愈

先嘔却渴者此為欲解先渴却嘔者為水停心下此屬
飲家嘔家本渴今反不渴者以心下有支飲故也此屬
支飲

註曰此二條言嘔渴必相因故可於先後辨其水於

反不渴知其飲示人治嘔中有辨飲之法也謂先嘔者內有惡涎也涎盡而渴病氣已解若先渴則必多飲飲多即同惡涎因而嘔知水停心下乃驟至之病未必是支飲風病故但曰此屬飲家然多嘔則必傷津故渴為嘔家必然之理今反不渴若非心下原有偏著之飲氣潤其燥火則渴何能免但飲果在中之孔道豈有不與嘔俱出則知此飲不在孔道矣故曰此為支飲支者偏旁而不正中也

問曰病人脉數數為熱當消穀引飲而反吐者何也師
曰以發其汗令陽微隔氣虛脉乃數數為客熱不能消
穀胃中虛冷故也脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變
為胃反寒在于上醫反下之令脉反弦故名曰虛

註曰此論嘔吐之脉從誤汗來則初脉或見數誤下
則反弦也謂數脉不外君相二火所以寸數咽喉口
舌生瘡或吐紅欬嗽肺癰兩關數則胃火或肝火尺
數則陰虛或相火故曰數為熱當消穀引飲而反吐

為疑以數脉必主于熱也不知虛亦能使脉數况見吐症吐為一時膈病而脉數則非君相二火明甚因推其致病之由曰以發其汗汗則傷陽而陽氣微人身唯真陽氣足如太陽中天令人溫和調適陽虛則燥火乘之故曰膈氣虛脉乃數數既非本然之陽和則為客熱客熱則病胃何能助胃消穀名曰熱其實無陽不能運之使下故曰胃中虛冷故也若脉更見弦是胃中之陽氣不充而結故曰胃氣無餘無餘者

胃氣無餘力勝穀氣也因而朝食暮吐見胃未嘗不
受穀受不能消則變為胃反其原由寒在上焦本當
溫胃助其消導又誤下之則陽之微者反見弦狀所
謂弦則衛氣結故曰虛也

寸口脉微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足
血不足則胸中冷

註曰此段推原胃中虛冷之故故于寸口脉證之謂
寸口主上焦微則胸中少元陽之氣榮氣隨衛氣者

也血即榮之成流者也無氣以引滿其榮氣而榮虛
虛則血少不能如平人之充盛而不足矣雖陰火炎
而見數象胸中之榮衛實虛元陽大虧焉得不冷

趺陽脉浮而濇浮則為虛虛則傷脾脾傷則不磨朝食
暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脉緊而濇其病難
治

註曰吐乃胃家病脾氣通於胃趺陽者脾胃脉也故
復以趺陽診之謂趺陽脉浮而且濇土主中州不沉

不浮今太浮則知其虛矣蓋虛則脾胃氣不交而脾陰傷不能固結其氣故脉浮濇正既虛則失醞釀之本故不磨因而朝暮之間不能容穀宿而不化此胃反之由然其脉不緊則胃氣尚能勝邪若又加緊而濇緊為寒邪濇為液竭正不勝邪故曰難治病人欲吐者不可下之

註曰此因上文論吐故推及之治病之法貴因勢利道故內經曰在上者越之在下者引而竭之言病欲

上吐不可強之使下凡病皆然故曰病人欲吐者不可下之是槩言非止反胃而反胃在其中

噦而腹滿視其前後知何部不利利之即愈

噦字恐是嘔字

註曰已下數條皆論嘔此首條恐亦是論嘔謂嘔乃中上焦病不應與腹滿並見然而腹滿明是積滯在腹上蒸于胃不安而嘔邪在腹則宜下故曰視其前後部前後者大小便也因不利而利之則病隨利減而愈

嘔而胸滿者茱萸湯主之

註曰胸乃陽位嘔為陰邪使胸之陽氣足以禦之則未必嘔嘔亦胸中無恙也乃嘔而胸滿是中有邪乘虛襲胸不但胃不和矣虛邪屬陰故以茱萸之苦溫善驅濁陰者為君人參補虛為佐而以薑棗宣發上焦之正氣也

茱萸湯方

吳茱萸

升一人參 三兩

生薑

六兩

大棗

十二枚

右四味以水五升煮取三升溫服七合日三服

乾嘔吐涎沫頭痛者茱萸湯主之

方見前

註曰乾嘔者有聲無物也物雖無而吐涎沫仲景曰
上焦有寒其口多涎上焦既有寒寒為陰邪格陽在
上故頭痛比胸滿而嘔似有輕重表裏不同然邪必
乘虛故亦用茱萸湯兼溫補以驅濁陰謂嘔有不同
寒則一也

嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之

註曰嘔本屬熱然而腸鳴則下寒而虛痞者陰邪搏飲結于心下即傷寒論所謂胃口不和腹中雷鳴也故主半夏瀉心湯用參甘棗以補中乾薑以溫胃洩滿半夏以開痰飲而以芩連消痞且苦寒亦能洩滿也親見一乳母吐嘔五日百藥不能止後服乾薑黃連二味立止即此方之意也

半夏瀉心湯方

半夏洗 黃芩 三兩 乾薑 三兩 人參 三兩

黃連

一兩

大棗

十枚

甘草

炙 三兩

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服
一升日三服

乾嘔而利者黃芩加半夏生薑湯主之

註曰傷寒論芩甘棗芍四味為黃芩湯治太陽少陽
合病蓋太少之邪合而內入則協熱而利故以黃芩
為主也然邪既內入或有復搏飲者嘔多此其明證
矣故加半夏生薑

黃芩加半夏生薑湯方

黃芩

三兩

甘草

二兩

芍藥

一兩

大棗

十二枚

半夏

半觔

生薑

三兩

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服

諸嘔穀不得下者小半夏湯主之

方見痰飲中

註曰嘔固屬火然使胃中無痰則食可稍進至穀不得下非痰礙之而何痰必由于氣逆故以半夏生薑

降逆開痰

嘔吐而病在膈上後思水者鮮急與之思水者猪苓散主之

註曰嘔吐兼心腹等證原非嘔吐本證也以常言之其病在膈上大約邪熱搏飲至于思水則飲邪去故曰鮮急與之恐燥邪不堪也然元陽未復正須防停飲再發故以猪苓去水為君茯苓白朮以培其正氣不用薑半其嘔已止恐宣之反動虛氣即降逆消痰