

欽定四庫全書

子部
醫說卷十



南京中医药大学图书馆版权所有

校書宋一

和

小號

日

方

王

日

王

女者一也

下黃帝無說中古有巫
始有小方則小兒方藥

宋 張杲 撰

善醫小兒

杜任郎中善醫里人王奉職宗簡時任於汶陽時有郡人孟生家甚溫厚惟一子數歲抱疾他醫數人治之無驗召任治之數日而良已踰月而平復人詢任曰君以何藥主之任語之故其人驚曰公所言皆藥之至溫者也他人不取君用之能起其疾其義可聞乎任曰孟生富家也而衆醫皆用犀珠金銀主之其性至涼多則寒其胃又從而投之由是多不喜食日益羸瘠則潰其元

失其本矣吾之劑先溫其胃使其飲食如故然後攻其
他疾是以先壯其本而無失者焉又知杜君之善醫也

如此

青箱
雜記

瘡豆禁雞鴨子

療病豌豆瘡欲無癰頻搗去痂勿令隱肌乃不成癰縱
搗傷有微血但以面膏塗無苦也瘡家不可食雞鴨卵
即時盲瞳子如卵白其應如神不可不戒

良方

小兒夜啼

井口邊草主小兒夜啼著母蓆薦下勿令知之

酉陽雜俎

小兒不可食雞

養生論曰雞肉不可令小兒食食之令生虺蠱又令體

消瘦

杜陽雜編

治兒語遲

社壇餘酢酒治小兒語遲以少許喫吐酒噴屋四角辟

蚊蟲

本草

兒得母寒下痢

東陽陳叔山小兒一歲得下痢嘗先啼日以羸困問華佗佗曰其母懷軀陽氣內養乳中虛冷兒得母寒故令不時愈佗與四物女姜丸十日即除

魏志

小兒感冷身熱

有小兒感冷身大熱惡寒此有表證用發汗藥汗出遂涼過一日復熱醫謂表解裏未解驗之服四順飲子利動臟腑一行遂涼隔一日又再熱醫云經熱未解驗之小便赤故知心熱未解服生氣湯遂涼過三日又熱其

家無所措手醫曰脉已和非病也既發汗又利大小便其兒已虛陽氣無所歸皆見於表所以身熱以和胃氣藥如六神散之類加烏梅煎令微覺有酸味收其陽氣歸自此全愈

小兒糞青

此脾虛生風之證也脾屬土其色黃糞黃則是脾家正色今乃青肝木尅脾也肝屬木其色青肝盛脾虛受肝之尅故糞青也當用益脾去風藥如半硫丸加白附子

蝎稍可以治之雖然小兒青糞拋下便青者是風冷也良久然後青者非病也小兒糞自然如此

小兒瀉後脚弱

小兒因患泄瀉或疳氣服藥瀉之却患咳嗽治得咳嗽少愈已五六歲脚弱不能行師曰脾傳肺故咳嗽肺傳腎故不能行脾屬土土生金金生水故傳之腎腎主腰脚故不能行因用猪腰子煎汁服五疳保童丸半月遂能行

小兒得地氣方行

小兒未會行能坐不可常常抱在手中可以入坐車能獨坐春夏坐於地上寒則以薦席襯之人得地氣方能行惜之過當常抱持之所以當行而不能行也萬物非土不生故小兒亦要得地氣也

以上
醫錄

小兒初生畏寒

小兒初生候浴水未得且以綿絮包裹抱大人懷中暖之及浴了亦當如此雖暑月亦未可遽去綿絮漸漸去

之乍出母腹不可令冒寒氣也預煎下沸湯以器収之
臨時漸暖不犯生水則兒不生瘡以此一月為佳

小兒初生回氣

小兒初生氣欲絕不能啼者必是難產或冒寒所致急
以綿絮包裹抱懷中未可斷臍且將胞衣置炭火爐中
燒之仍撚大紙燈蘸油點之於臍帶上往來徧帶燎之
蓋臍帶連兒臍得火氣由臍入腹更以熱醋湯將洗臍
帶須臾氣回啼哭如常方可浴洗了即斷臍帶

小兒初生服藥

小兒初生急以綿裹指拭盡口中惡血若不急拭啼聲一出即入腹成百病矣亦未須與乳且先與拍破黃連浸湯取濃汁調朱砂細末抹兒口中打盡腹中舊尿方可與乳兒若多睡聽之勿強與乳則自然長而少病

小兒初生通大小便

小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水先漱口了吸咂兒前後心並臍下手足心共七處每一

處凡三五次漱口吸啞以紅赤為度須臾自通不爾無生意有此證遇此法可謂再生

小兒夜啼有四證

小兒夜啼有四證一曰寒二曰熱三曰重舌口瘡四曰客忤寒則腹痛而啼面青白口有冷氣腹亦冷曲腰而啼此冷證也熱則心躁而啼面赤便赤口中熱腹煖啼時或有汗仰身而啼此熱證也若重舌口瘡則要乳喫口到乳上便啼身額皆微熱急取燈照口若無瘡舌必

腫也客忤者見生人氣忤犯而啼也

小兒傷乳食發熱

小兒傷乳及食者或時發熱熱有退時退熱後但肚熱或夜間熱者此傷乳食也其糞有酸臭氣異常千金紫丸主之

小兒發熱治法

小兒積熱者表裏俱熱則遍身皆熱頰赤口乾小便赤大便焦黃先以清涼四順飲子利動臟腑熱則去既去

復熱者裏熱已解而表熱未解也當用惺惺散或紅綿散內加麻黃微發汗表熱乃去表熱去後又發熱者何也世醫到此盡不能曉或再用涼藥或再解表或以謂不可醫誤致夭傷者甚多此表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外所以再發熱非熱證也只用六神散入粳米煎和其胃氣則收陽氣歸內身體便涼熱重者用銀白散

小兒血熱

小兒血熱者每旦食後發熱夜則涼世醫多謂虛勞或

謂疳熱此血熱也宜用豬胆丸

急慢驚風

小兒發癇俗云驚風有陰陽證因身熱面赤而發搐搦上視牙關緊硬者陽證也因吐瀉或只吐不瀉日漸面色白脾虛或冷而發驚不甚搐搦微微目上視手足微動者陰證也陽證用涼藥陰證用溫藥不可一概作驚風治也又有一證欲發瘡疹先身熱驚跳或發搐搦此非驚風當服發散藥

小兒吐瀉用藥

小兒暑月多吐瀉其證不一宜詳審用藥不可差謬有
伏暑吐瀉小水必不利宜服五苓散香薷散有傷食吐
瀉者其吐及糞皆有酸臭氣宜服感應丸三方易知今
不復載瀉多日口唇白及糞色亦白及瀉糞頗多者因
而成冷也宜以前方六神散每二錢匕加附子末一錢
匕煎作三四服以防變癰也

小兒瀉痢

小兒暑月多瀉者一則伏暑心臟熱小水不利清濁不分因成泄瀉可服五苓散或大順散二藥皆用沸湯調若小水快而瀉者冷瀉也宜于六神散內加附子煎服若肚大瀉色白者疳瀉也宜服官局六神丸瀉者不可急以熱藥止之若以熱藥止之便變成痢凡病痢者皆因有積赤痢熱積也白痢冷積也赤白痢冷熱不調之積也赤多白少者熱多而冷少也白多赤少者冷多而熱少也