

欽定四庫全書

子部
外科理例附方



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

外科理例附方

醫家類

明 汪機 撰

耗裏溫中湯

而內陷者膿出消解皮

痛

使微澹食即嘔氣短呃

逆不結

益智仁

陳皮

附子

甘草

炙

去炮

皮臍各
二錢

作一劑水二鍾姜三片煎八分不拘時服

二六君子湯 治一切脾胃不健或胸膈不利飲食少

思或作嘔或食不化或膨脹大便不實面色痿黃四

肢倦怠

人參

白朮 炒

茯苓

半夏 姜製

陳皮 各一錢

甘草

炙五分

作一劑水二鍾姜三片煎八分不拘時服

三内踈黃連湯

一名黃連内踈湯

治瘡瘍腫硬發熱作

嘔大便秘澀煩躁飲冷嘔哕心煩脉沉實此邪在臟也急服以內除之使邪不得犯經絡

黃連

山梔子

當歸

酒拌

芍藥

木香

枳榔

黃芩

薄荷

桔梗

甘草

各一錢

連翹

大黃

炒各一錢

作一劑水二鍾煎八分食前服

四
十宣散

治瘡瘍脉緩瀦身倦怠惡寒或脉弦或緊

細者皆宜用之散風寒助陽氣也

人參

當歸

酒拌

黃芪

鹽水拌炒
各一錢

甘草

白芷

川芎

桔梗

炒各
一錢

厚朴

姜汁製
炒五分

防風

肉桂

各三
分

作一劑水二鍾煎八分服

五小柴胡湯 治療癰乳癰便毒下疳及肝經分一切

瘡瘍發熱或飲食少思

半夏

姜製
一錢

柴胡

二錢

黃芩

炒二
錢

人參

一錢

甘草

炙五
分

作一劑水二鍾姜三片煎八分食遠服

六防風通聖散 治一切風熱積毒瘡腫發熱便秘表

裏俱實者

芍藥

炒

芒硝

滑石

煨

川芎

當歸

酒拌

桔梗

石膏

煨

荊芥

麻黃

各四分半

薄荷

大黃

煨

山梔

炒

白朮

炒

連翹

甘草

炙

防風

黃芩

炒各五分

作一劑水二鍾煎八分服

七荆防敗毒散

治一切瘡瘍時毒腫痛發熱左手脉

浮數

荆芥

防風

人參

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

枳殼

茯苓

川芎

甘草

各一錢

即人參敗毒散加荆芥防風

作一劑水二鍾煎八分食遠服

八黃連解毒湯

治積熱瘡瘍焮腫作痛煩躁飲冷脉

洪數或口舌生瘡或疫毒發狂

黃芩

黃栢炒

黃連炒

山梔各一錢半

作一劑水二鍾煎七分熱服

九
四物湯 治一切血虛或發熱之證

當歸

酒拌

川芎

各一錢

芍藥

炒

生地

一錢

作一劑水二鍾煎八分食遠服

加四君湯即八物湯又名八珍湯治症詳見于後

十
大黃牡丹湯

大黃

四兩

牡丹皮

三兩

芒硝

一兩

桃仁

五十箇

每服五錢水煎服

十隔蒜灸法 治一切瘡毒大痛或不痛或麻木如痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨而散蓋火以暢達拔引鬱毒此從治之法也有回生之功

大蒜去皮切三文銅錢厚安瘡頭上用艾壯于蒜上灸之三壯換蒜復灸未成者即消已成者亦殺其大勢不能為害若瘡大用蒜搗爛攤患處將艾鋪上燒之蒜敗再換如不痛或不作膿及不發起或陰瘡尤

宜多灸

二十
清涼飲

治瘡積熱煩躁飲冷熇痛脉實大小便秘

澁

大黃

炒

赤芍

當歸

甘草

各二錢

水二鍾煎八分食前服

三十
十全大補湯

治瘡潰膿清或不潰不斂皆由元氣

虛弱不能營運服此生血氣壯脾胃兼補諸虛及潰瘍發熱或惡寒或作痛或膿多或自汗盜汗及流注

瘰癧便毒久不作膿或膿成不潰而不斂若血氣不足結腫未成膿者加枳殼香附連翹服之自消

人參

肉桂

地黃

酒蒸焙

川芎

白芍炒

茯苓

白朮炒

黃耆

鹽水拌炒

當歸

酒拌各一錢

甘草

炙五分

作一劑水二鍾姜三片棗二枚煎八分食前服

四十八珍湯

調和榮衛順理陰陽滋養血氣進飲食退

虛熱此氣血虛乏之藥也

當歸 酒拌 川芎 芍藥 炒 熟苧 酒拌 人參

白朮 炒 茯苓 各一錢 甘草 炙五分

水二鍾姜三片棗二枚煎八分食前服

五十加味十全大補湯

人參 肉桂 地黃 川芎 白芍藥

茯苓 白朮 黃耆 甘草 當歸

烏藥 香附 各等分

姜棗水煎空心溫服每劑一兩

十補中益氣湯 治瘡瘍元氣不足四肢倦怠口乾發

熱飲食無味或飲食失節或勞倦身熱脉洪大無力

或頭痛或惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩

黃耆

炙一錢半

甘草

炙

人參

當歸

酒拌

白朮

炒各一錢

升麻

柴胡

陳皮

各三分

水二鍾姜二片棗二枚煎一鍾空心服

七十聖愈湯

治瘡瘍膿水出多或金瘡出血心煩不安

睡卧不寧或五心煩熱

地黄

酒拌蒸半日

生地黄

酒拌

川芎

人參

各五錢

當歸

酒拌

黃耆

鹽水浸炒各一錢

水二鍾煎八分食遠服

十人參養榮湯

治潰瘍發熱或惡寒或四肢倦怠肌

肉消瘦面色痿黃呼吸短氣飲食無味或氣血原不足不能收斂若大瘡愈後服之不變他病

白芍

一錢五分

人參

陳皮

黃耆

蜜炙

桂心

當歸

酒拌

白朮

甘草

炙各一錢

熟苧

酒拌

五味子

炒搗

碎茯苓各一錢半遠志去心炒五分

水二鍾姜三片棗一枚煎八分食前服

九十歸脾湯 治思慮傷脾不能統攝心血以致妄行或

吐血下血或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛

茯神 白朮 人參 黃耆蜜炙 龍眼肉

酸棗仁蒸各一錢木香各三分甘草炙一分半

水一鍾姜一片棗一枚煎六分食遠并臨卧服

十二遠志酒

遠志 不拘多少泔浸洗去土槌去心

右為末每三錢用酒一盞調遲少頃澄清飲之以滓
敷患處治女人乳癰尤效

二黃著建中湯

黃耆 蜜製 肉桂 去皮各三兩 甘草 炙二兩 白芍

每服一兩姜棗水煎服

二內補黃耆湯

黃耆 炙 麥門冬 各一兩 熟地黄 人參 茯苓