



馮氏錦囊秘錄痘疹全集卷三

總論痘要略述

男 乾元龍

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯 門人孫顯達惟良仝校

男 豐亨禮齋

發斑

發斑者陽明受暑炎之毒所致也。然斑有二。陽毒發斑者必壯熱渴燥。五心如焰脈洪有力色紅赤者胃熱也可治。紫黑者胃爛也不治。色純黑者熱毒入胃已極尤爲不治之症。若熱毒壅盛而大便秘結者宜急下之。否則胃熱不得以泄其斑益熾。但不可下之太早。否則中氣餒弱。其斑

難出而爲陷伏。且熱乘虛入胃。症毒更爲難療矣。此與傷寒下法之理相同也。如陰症發癧者。必身無大熱。手足指甲俱青。其脈沈細。其色微紅。此乃無根失守之火。聚於胃。熏於肺。傳於皮膚。而爲癧也。妄投涼劑。則又誤矣。故宜溼潤調中。爲主。胃氣和。則火自下。癧自退。而痘自出也。

凡腎症腰疼難立之候。而必有癧者何也。蓋腎爲胃之閑。如熱毒蘊蓄。而不得泄。是以傳注胃經。胃主肌肉。故發爲癧。宜用鼠粘升麻之類。於清涼解毒之中。兼以升提。出表爲主。如始驟以清胃寒劑。則血不行。肌肉冰。烏能載毒以出。必至沉匿於腎。而爲壞症矣。若至身發紫赤黑色等症。

而眼中白睛之肉色如桃花水紅色者。蓋白睛屬肺。是生  
內潰肺胃敗壞。必不可治。其色乃內起淡淡一種水紅之  
色。非若筋膜赤障。外浮於睛也。

夾疹

痘出而夾疹者。先哲謂之兩虎蹲欄。蓋痘宜補而不宜瀉。  
瀉則不鼎峻。疹則宜瀉而不宜補。補則乃發喘。然在痘初。  
只宜透托。一旣表痘。又兼發疹。疹出卽解。故兩安而無礙。  
者也。惟在灌膿之際。不可太發。僅宜助漿劑中去參耆之  
類。加入黏子。桔梗。蟬退殼。蠶等藥。一助灌膿。而兼理肺氣。  
肺氣旣清。而陽毒自徹散於上矣。至於痘後發者。惟獨治。

疹可也。然凡先見疹子而夾出如水痘者。此是正痘因疹子耗去榮血。故白似水痘。但與發散疹子。則疹散而痘自成。不可認作水痘。蓋疹子從不次水痘者耳。

夫膚癰者。是熱毒之氣發越而然也。其暴出之時。點如麻狀。但色鮮赤成片耳。治宜清涼敗毒。若癰散數目而痘點出者。則勢稀朗而自美。有癰癰者。多屬於脾。以其隱隱在於皮膚之間。故名之也。其發時多癢。或麻木不住。此兼溼痰之殊。若色紅者。又兼火化也。治宜亦與解毒爲主。更有謂痧者。其形如粟一般。尖圓而稍礙。指中含清水。是也。他屬訛毒之所發。名殊而源一也。

夾丹

夾丹者血熱也。在痘之未出時見者只宜升提發散而用紫草升麻粘子蟬蛻川芎荆芥防風桔梗乾葛之類痘出而丹白淡若過用寒涼則痘必冰伏若在痘出三四日間則宜涼血解毒而用生地牛蒡木通荆芥犀角紫草之類然又須看其顏色何如紅紫者熱極也白者痰溼也。至於清黑不可爲矣。

夾癰

癰者卽頤毒也。每有於未痘數日之前發一小塊色同肌內不紅不腫不痛最宜急治否則痘時而加透托則勢尤

潰爛痘必伏而不起甚有至痘入九日間連肉跌出此塊而內無膿汁者尤極危症是由虛火挾痰所致故宜貝母花粉甘桔之類預爲清利解散以免後患

夾癰一症多屬痘毒痰毒凝結而成有結於頸頸成結於耳後或結於腋下大者如桃小者如李初起則症候如常次必身煩熱渴而變凶危然痘在三四日而癰作焉則毒隨痘洩膿隨痘灌自可挽回而無害故治宜攻痘爲主倘癰在紅腫將膿而痘隨標焉則毒膿一潰元氣囂漓其痘焉能表暴充灌乎治法惟宜培元補托兼與消痰解毒爲主若在七八之期痘已黃蠟而癰作焉則雖潰無妨但訛

毛之後大宜保養元氣。佐以消痰解毒耳。

### 夾凡瘡

痘夾凡瘡則氣血爲瘡所奪。痘多不能起。發成漿。況瘡乃陰毒。痘乃陽毒。陽乘乎陰。遇隙而發。故痘愈密。臭炎退燥。玄冰不滋。多變焦紫。且衛氣易洩。風癢自作。升發則竅益開。寒涼痘毒又遏若是。則治法雜。何必先審其患瘡之久近。兒質之強弱。毒勢之起伏。如瘡已久而收在或頭或足者。則宜封其瘡。使氣不外洩。則痘自起。自灌。倘瘡繼起而周身密布者。則宜解毒涼血。而兼托痘。則痘自鼎。燭熾者。和之仗者攻之。仍以大補氣血爲主。使其接續。膿漿而無

乾枯內攻之患。又有若火炙而無皮無汁者。是名火灼瘡也。尤宜涼血化毒爲主。

### 夾癰

夫痘癰爲陽毒。然癰夾於痘中。不可槩以陽毒爲論。蓋發於七日前者。凡瘡也有因素積熱毒內伏。遇痘毒火感激。乃相併而發者。更有素患凡瘡未痘。或初結癰處。肉分空虛。遇痘熱毒氣血攻擊。復趨虛處而發。是以陽瘡陰毒潤雜一堂。須看其毒溼潤者。則氣血俱盛。而痘與毒自易成漿也。若毒枯燥乾紅。則氣血俱弱。必毒與諸瘡相抗。而俱不能成漿矣。治宜大加補托。如枯轉潤紅變白。其漿自溢。

可。惟在七日後發癰者。陽毒也。此卽痘之毒併聚一處。以假其名也。蓋因氣血不能拘收。乘載其毒。以致氣弱血盛。陽分空虛。而乃血載其毒。傳注四肢。合虛合者。海也。如曲池委中是也。總七日前後見者。宜縱之。以發則毒亦從此而出矣。若治其毒。則必隨痘而散。內攻臟腑焉可救乎。惟於痘毒已解。血氣豐盛者。則宜解散其餘毒。然癰之成也。多由氣血不和。畱結所致。况病久必虛。故解毒毒湯中。必君以調和榮衛。補益氣血爲主。卽痘始夾癰者。亦須大用芎歸黃耆生地。殭蠶之類。大補氣血。以托解其毒。否則氣血爲毒所耗。而痘必難成功矣。

夾傷寒

夫傷寒自表入裏。痘疹從裏達表。候雖相似。症實天淵。若痘正發而夾傷寒者。是邪在表。可用發散以微汗之。則腠理疏通。而痘出自易矣。若傷寒在痘三四朝。而有煩躁譫語。腹脹惡渴。睡臥不寧。便閉者。是邪在裏。可用微下。次卽隨以升提。則表裏和平。邪壅自解。經絡無滯。榮衛得行。而毒化成漿。自易矣。此所謂應犯而犯。似乎無犯。至如可以不汗不下。尤爲順候。然卽汗卽下。又宜兩安。貴乎急則治標。緩則治本。而兼以痘之期。痘之候。竝參之。然真傷寒者。少。類。傷。寒。者。多。况。小。兒。八。歲。以。下。無。傷。寒。切。勿。以。頭。痛。發。

熟者便作傷寒例論也。

夾瘡

夫瘡與瘧皆來而有難保全者何也。蓋瘡多脾寒則脾先受傷而虛矣。瘞者豆也。賴土而生長若土先受伐則焉能滋培化育。况似瘻非瘡者多哉。陽虛則惡寒。陰虛則惡熱。陰陽虛而寒熱交作若不大爲補益而投以毒藥則殆矣。

夾瘡

夫有蒸熱作渴。肉瘦肌黃。而患瘡反多無恙者何也。請云。氣者不於肌肉論。肥瘦言血氣者不於形骸定虛實。况毒從外病而化肌。由潮熱而致乎。日肥白之兒。內浮骨脆腎。

氣多虛能耐諸症而獨難於痘瘡黃瘦之兒骨勁筋強腎元多實雖多生疾病而獨於痘瘡恒無苦也。

夾損傷

有因跌撲所傷是以血氣虧損者不可槩用歸尾桃仁之類。蓋受傷已耗榮血何堪又復敗之夫痘豈可破敗其血以成功耶故宜參耆芎歸紅花熟地蟬蛻之類以流行其滯而宣補於內再加茯神遠志以寧固其心外用文蛤棕灰膏於傷處收斂其表若痛甚者再加乳香若外傷痕癰弗克收曆者則用白芨白斂象皮未以摻之若傷而不破者則用蝦蟆灰貼以手徐徐摩撫散其滯血可也至於湯

濱火者。則宜燎以清涼之劑。不可敷以寒冷之方。蓋恐  
凝滯其痘。而且熱氣內攻也。

### 嘔吐噦

凡聲物兼出者爲嘔。如物獨出者爲吐。如聲獨出者爲乾  
嘔。其乾嘔與噦皆聲之獨出。惟乾嘔其聲小而短。噦則其  
聲重大而長。吐在初起。是火炎上之徵。至於嘔噦。乃毒內  
攻之兆。然有暴大吐瀉不已。神亡欲絕。脈微欲脫。而青厥  
冷惡瘡。備見而反覺膈快。神强者。是正氣雖脫。內熱方去。  
熱則神昏。寒則神清。是以暫覺寬快。但正氣大虛。邪氣必  
奪。故不久頓。發喘汗。昏悶而死。猶燈盡復明也。至如嘔噦

在病深者尤爲惡候。蓋人以胃氣爲本。胃者土也。土敗則木本侮之。故木挾相火之勢上乘乎胃。其氣自臍下直犯清道。上出賁門。微則乾嘔。甚則發噦。總皆土敗之象。經曰。木陳者葉必落。弦絕者聲必嘶。病深者聲必噦。

凡痘初吐瀉不可驟止者。以吐乃出熱瀉乃出毒之義。蓋痘毒在內。愈止愈甚。夫熱毒壅塞於胃口。火氣炎上之象不治。痘而吐愈者未之有也。但宜表痘。痘出而吐自止。不治吐而吐自愈。若以尋常治吐之法。益增嘔逆煩躁之端。更不可用辛燥之藥。以致血不華色。雖似胃寒。勿用熟藥。蓋暴病非陰。况痘本熱毒耶。至若痘後惡心乾嘔不止者。

是衝任虛火上冲犯於清道多係臟敗毒攻不救之惡候也急宜分陰陽利小便蓋治乾嘔之症法以利小便爲主耳若利而不通者危也

泄瀉

經曰陽氣在下則生飧泄蓋積熱之氣不能上升卽下注而爲泄瀉故治瀉劑中多加升藥者恐其氣下陷也又曰溼勝則瀉總病初而瀉者爲熱病久而發者爲寒水液澄澈清冷而色白者皆屬於寒青黃赤黑而燥澀者皆屬於熱瀉利完穀不化身涼不渴脈遲而微小便清白不澀者虛寒也宜用參朮炮薑炙草之類小便赤澀完穀消化身

熱發渴而脈洪數者實熱也宜用木通猪苓赤茯之類在初出以及收虧之際暫瀉無妨惟起脹灌膿而瀉者最須急治但求其瀉之因以治之不必治瀉之爲病也若每日只一二二次者亦不可輕用止瀉以致毒氣不得走洩則反畱餘毒變生別症惟宜調固中氣聽其天然百病强行止過皆非良法猶之以力制人何如以德服人之爲勝凡瘡未出而利者是邪氣併於裏腸胃熱甚而傳化失常也宜從熱毒而治如瘡已出而利者是邪氣併於表正氣方逐邪氣故主乎表而不主裏裏氣適虛不能運納水穀故亦自利宜從氣虛而治如瀉利而不渴者是臟寒下利