

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百七十七



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷三百七十七 明

周王朱橚 撰

嬰孩一切癇門

癲癇 附論

大黃帝曰人生有病願疾者疾名謂何安所得之岐伯曰病名為胎病此得之在母腹中時母或感驚恐上而不下精氣失舍故令子發為癇也○巢氏病源癇者小兒病也十歲已上為癲十歲已下為癇其發之狀或口

眼相引而目睛上搖或手足掣癡或背脊強直或脛上反折由風邪熱毒傷於手少陰之經故也心為帝王神之所舍其藏堅固不受外邪若風熱蘊積乘於心則令恍惚不安精神離散榮衛氣亂陰陽相病故發為癲癇也又小兒在胎之時其母卒有大驚精神失守則令子癲癇也

方

虎睛丸 治小兒一二歲發癲至大不瘥成癲病發無

時口出白沫并大小便出不知

虎睛

一具酒浸
一宿炙黃

丹砂

鐵精

子芩

大黃

龍齒

梔子仁

銀屑

各四分

蜂房

炙

鈎藤皮

柴胡

白鮮皮

麻黃

去節

雷丸

炙各二分

羌活

沙參

升麻

各三分

牛黃

半分

蚱蟬

四箇去翅
足自死者

防葵

蛇蛻皮

各七分
分炙

細辛

一分半

石膏

五分

右和蜜丸四五歲服大豆大十九與顱顱經藥味同
多牛黃及分兩不同

治小兒熱癇

右用蚯蚓破之去泥以鹽塗之化成水服

虎睛丸 治孩子從一歲至大癲發無時口出白沫小

便淋瀝不利治之

虎睛

一隻在眼佳暴乾酒浸令黃色

真珠

蜂房

各三錢

麻黃

二分去節

鈎藤

三分

鐵精

防葵

大黃

子芩

龍齒

銀屑

梔子仁

羌活

各四分

柴胡

升

麻

白鮮皮

雷丸

燒令赤

人參

各三分

細辛

一分半

蛇皮

五寸灸

石膏

五分

蚱蟬

四枚去翅足灸

右研為末煉蜜為丸四五歲如赤豆大五九日再服

大兒十九米飲下忌生冷油膩等物

虎睛丸 治小兒癩癧至大不瘥或發即口出白沫并

大小便出不知

虎睛

一對酒浸一宿微灸細研

硃砂

石膏

各細研飛水過

鐵粉

龍齒

細研各半兩

露蜂房

微灸

羌活

鈎藤

防葵

麻黃

去根節

川升麻

各半兩

細辛

一分

牛黃

半分細研

蚱蟬

四枚去翅足炙

右件都研令勻煉蜜和丸如麻子大每服以溫水下五丸更量兒大小加減

鐵粉丸 治小兒心臟積熱時發癲癇嘔吐涎沫作聲

迷悶

鐵粉

龍齒

各細研一兩

鉛霜

麝香

各細研

天南

星

各一分

天麻

三分

硃砂

細研水飛過

水銀

黑鉛

各半兩與水銀結為沙子細研

右為末都研令勻以煉蜜和丸如菜豆大每服以竹
瀝研化五丸服之量兒大小加減

雄黃丸 治小兒癲發動無時心悶吐沫

雄黃

鐵粉

各細研

硃砂

細研水飛過

獾猪膽

二枚

龍膽

一分

鯉魚膽

七枚

烏牛膽

半枚

青羊膽

二枚

麝香

一錢
細研

右以諸般膽汁相和令勻即入諸藥末和丸如菜豆

大每服以金銀湯下五丸量兒大小加減

天麻散 祛風治癰瘡

天麻 防風 麻黃

去根節 各一兩

甘草 炙

川麻黃

羌活 黃芩 川大黃

炮各半兩

右為末每服一錢水一盞煎至五分去滓放溫服

熊膽丹 治癰瘡鎮心安神

真熊膽 鐵粉 各細研

硃砂 細研水飛

生天南星 末

雄黃 水磨精明者 同研各半兩

粉霜 一分研

腦麝 各研一錢

右同拌勻用獾猪膽一枚取汁和諸藥丸如黍米大

每服十粒至二十粒煎金銀薄荷湯下

雄黃丸 療五癩牛癩則牛鳴馬癩則馬嘶狗癩則狗

吠羊癩則羊鳴雞癩則雞鳴五癩病者臟腑相引營

衛氣亂厥不識人氣爭制手癢吐沫久而得蘇

雄黃

研

雌黃

一方無一方用一兩

真珠

末

水銀

各一兩

金方水銀使八分

鉛丹

二兩熬成屑千金方此一味是君

丹砂

半兩研千金方二兩

右搗和入蜜又搗三千杵為丸先食服胡豆大三丸

日再驚癇亦愈千金方云小兒三九如小豆忌生血

物

黑錫丹 治癰瘤及諸瘤胞絡涎盛

黑錫

二兩同水銀半兩慢研結沙予

粉霜

鐵粉

各細研半兩

麝

香

一分細研

天南星

一兩炮取末

右同研勻滴水如黍米大每服十粒煎竹葉湯下

日應丹 治癰連年不瘥

金銀箔

各三十片

黑錫

硫黃

水銀

細研

鐵粉

各研

一兩

右先將錫於鐺子內鎔令消即入硫黃炒不住手就
鐺研攪候硫黃煙氣似息次入水銀鐵粉金銀箔同
攪用緊火燒少時都傾出置地一宿出火毒再研和
勻用粟米飯和如菜豆大每於食後服五粒至七粒
煎人參湯下量兒大小加減一方以硃砂為衣

治小兒癩癰連年不瘥方名水銀丸

鉛 水銀

各二兩

硫黃

鐵粉

各一兩

右先將鉛於鐺子中令消即下硫黃炒不住手就鐺

研攪待硫黃煙氣似息入水銀又攪次下鐵粉以武火燒少時將出置地一宿出火毒後研令極細即以粟米飯丸如菜豆大每於食後以金銀湯下五九量兒大小加減一方食前

硃砂丸 治小兒癩癧發歇不定

硃砂

細研水飛過

鉛霜

鐵粉

馬牙硝

各一兩

右研細如麵以棗肉和丸如菜豆大每服於食後以熟水下三九量兒大小加減

雌黃丸 治小兒癩癧欲發精神不足眼目不明癰癤

惡聲嚼舌吐沫

雄黃

研細炒
令褐色

黃丹

炒令褐
色一兩

麝香

一分

右相和細研如粉用牛乳一升慢火熬成膏可丸即
丸如菉豆大每服以溫水下三九日三服量兒大小

加減

此方得自明醫之家後余嘗
傳與友因施是藥醫道大行

治小兒癩癧等疾方

右以光明硃砂一兩顆塊者金箔隨硃砂顆塊大小

各裹之用磁石固濟了餅子內築實中心留一坑子
即以硃砂置坑子內上更以磁石末覆之餅子口更
以鉛片可餅口大小蓋之以文武火燒七日又常令
露鉛以筋刺得又養七日後去鉛大小煨之候冷取
出於乳鉢中細研即置於通油盒子內上以馬牙屑
末偏覆之即置飯甑中蒸一炊久其硃砂化成水有
患者食後以溫水調下半錢量兒大小加減服

露硃丸 治十歲已上癲狂夫陰盛為癲陽盛為狂陰

陽相并則癲狂亂走語言錯雜悲歌不定憂喜無常
右以辰砂一兩琉璃器內盛露四十九夜遇陰雨日
不筭入牛黃一錢煉蜜和如豌豆大空心一丸冷水
下更常服寧心膏

治驚邪癲癇小兒客忤消食及冷氣

右以鐵屑煎汁服之

真珠丸 治小兒自一歲患癲癇發動無時口內沫出
小便不覺呼喚不應