

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄

第一百八十九卷目錄

醫部全錄一百六十九

頭項門四

鍼灸

導引

醫案

華佗典第一百八十九卷

醫部全錄一百六十九

頭項門四

鍼灸

素問曰熱病者先腰痛肘疫苦渴數飲身熱熱爭則項痛而強肝寒且逆足下熱不欲言其逆則項痛員員漚漚然戊己甚于癸大汁氣逆則戊己死刺足少除太陽

先項背痛者先刺之

大風頭項痛刺風府風府在上椎

靈樞曰太陽手陽明之脈其支者從缺盆上頸貫頰入下齒中還出頰口交人中左之右右之左一挾鼻

孔是動則痛痛滿腫痛盛虛熱寒取之也

胃足陽明之脈是主血所生病者狂逆溫淫汗出鼽

鼽口喘唇乾喉嚨喉痛盛虛熱寒取之也

小腸手太陽之脈其支者從缺盆循頸上頰至目登

皆入耳中其支者別頰上頰抵鼻至目內眥斜絡

於頰是動則痛痛滿腫不可以動耳似振動似折

是主液所生病者耳聾目黃頰頰頰頰目瞤肘臂外後廉痛視盛其熱寒取之也

陽明足太陽之脈是動則病衝頭目眩就項如拔

脊痛熱似折臂不可以曲頸如結胸如發是為譫厥

視盛虛熱寒取之也

手陽明之筋其支者繞肩膊俠脊直者從肩膊上循上

親其痛當所過者支痛及轉筋利不舉頸不可左右

視治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸名為五夏痹也

手太陽之筋起於小指之上入結於腋下其支者從

走腋後廉上循肩膊循腋出足太陽之前結於耳後

完骨其病緩後廉痛絕肩膊引頸而痛應耳中鳴痛

引領目眩良久乃得視頸項急則為筋急頸項寒熱

在頸者治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸其為難

者復而銳之

手少陽之筋起於小指次指之端結於腕上循臂結

於肘上循臂外廉上肩走頸合手太陽其痛當所過

者即支轉筋舌卷治在燔鍼劫刺以知為數以痛為

輸名為五夏痹也

邪在臂則病骨痛痛滿腫者按之而不得腹脹腰

痛大便難則背項項痛時眩取之湧泉臍脊視有血

者盡取之

厥頭項項九痛腫即為患先取入柱後取足太陽

項痛不可使仰刺足太陽不可以頰刺手太陽也

黃帝曰風寒其熱之毒氣去之奈何岐伯曰風寒之

本皆在於臟其末上出於頸項之間其浮於脈中而

末內著於肌肉而外為膿血者易去也黃帝曰去之

奈何岐伯曰以湯從其本引其末可使衰去而絕其寒

熱善按其道以手之徐往徐來以去之其小如麥者

一刺知三刺而已

甲乙經曰頭項痛者暫足偏仆與空軀軀喘息不得

通風主之

項上痛風頭項目如脫不可左右顧百會主之

頸項痛不得顧目泣出脫軀軀軀目內皆赤痛氣

厥耳目不明咽喉腫引項痛擊不收風池主之

項腫不可俯仰頸項引耳完骨主之

頸項痛不可以俯仰頸項痛擊擊擊擊擊擊擊擊擊擊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊脊

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄

第一百八十九卷目錄

醫部全錄一百六十九

頭項門四

鍼灸

導引

醫案

華佗典第一百八十九卷

醫部全錄一百六十九

頭項門四

鍼灸

素問曰：熱病者，先腰痛，肘腋苦滿，數飲身熱，熱爭則項痛而強，肝寒且逆，足下熱，不欲言，其逆則項痛。員員漚漚然，戊己甚，壬癸大汁氣逆，則戊己死，刺足少陰太陽。

先項背痛者，先刺之。

大風頭項痛，刺風府，風府在上椎。

靈樞曰：太陽手陽明之脈，其支者從缺盆上頸，貫頰入下齒中，還出頰口，交人中，左之右，右之左，手少陰、手太陽之脈，是主血所生病者，其逆溫汗出，散。

小腸手太陽之脈，其支者從缺盆循頸上頰，至目眦，皆入耳中，其支者別頰上頰抵鼻，至目內眦，斜絡於頰，是動則頰痛，頰痛不可忍，以手按之，則痛，折。

是主液所生病者，耳聾目黃，頰頰頰頰，目眦眦眦，皆外後廉痛，視盛其熱，寒取之也。

陽明足太陽之脈，是動則病，衝頭目，目眦眦眦，如拔，脊痛，熱似折，折不可曲，頸如結，頭如發，是為譫，厥視盛其熱，寒取之也。

手陽明之脈，其支者繞肩，肩膊後直者，從肩膊上，頸上，頸其痛，當所過者，支痛及轉筋，不可不左右，親治，在燭鍼，切刺，以知為數，以痛為輸，名為五五，其也。

手太陽之筋，起於小指之上，入結於腋，下其支者，從走腋，後廉上，繞肩膊，循頰，出足太陽之前，結於耳後，完骨，其病，後廉痛，繞肩膊，引頸而痛，應耳中鳴痛，引頰口，頰口久，乃得視，頸急，則為筋，筋急，則為寒，寒在頸者，治在燭鍼，切刺，以知為數，以痛為輸，其為難者，復而銳之。

手少陰之筋，起於小指大指之端，結於腕上，循臂結於肘上，腕外，腕上，有走頭合手太陽，其病，當所過者，即支，轉筋，舌卷，治在燭鍼，切刺，以知為數，以痛為輸，名為五五，其也。

邪在臂肘，臂痛，痛者，按之而不得，腹脹，腰痛，大便難，則有臂項痛，時眩取之，湧泉，是為有血者，寒取之。

厥頭項痛，九痛，即為患，先取入柱後，取足太陽，項痛不可忍，仰刺足太陽，不可以頰刺手太陽也。

黃帝曰：風寒其熱之毒氣，去之奈何？岐伯曰：風寒之本，皆在於臟，其末上出於頰，頰之間，其浮於脈中，而末內著於肌肉，而外為膿血者，易去也。黃帝曰：去之。

余何岐伯曰：素從其本，引其末，可使衰去而絕其寒，熱者，按其道，以手之，徐往徐來，以去之，其小如索者，一刺即三刺而止。

甲乙經曰：頭項痛，重，是風，仆與空，乾乾，喘息，不得，通，天，主之。

項上痛，風頭重，目如脫，不可左右，顧，百會主之。

項痛，項不得顧，目泣出，脫，脫，脫，脫，目內皆赤，痛氣，厥耳，目不明，咽喉，引項，筋急，不收，風池主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

項痛，不可俯仰，伸屈，引耳，完骨主之。

脈衰於此血盛之證也。以小菜調之一劑少愈更一劑年下七項下時或作痛乍寒乍熱如赤痢狀一月生黃九治之而痊瘳人見方云韋華之病自今未有言者唯公傳與褚澄澄及言婦病猶無開復故吳男子問可得已醫便死病難也易曰天地絪縕萬化醇男女媾精萬物化生厥陽陰可乎有既虛則憂心萌而不達致陰陽交爭生寒生熱有類氣鬱久而為癰又有燥閉白淫痰涎逆風喘氣痞悶而腹脹等語皆氣滯之疾若此腸胃肝脾發出寸口而面唇察其脈象經之病皆血虛而得經止于斯而面唇察其脈象經之病皆血虛而得經止于斯楊堅則思慮入血虛則懷胎輒其精血過半矣

一婦人患心不作腰脹浮而濡平以氣血俱虛欲補之便自潰流故內清導服整夜及散啞之藥氣血愈虛而死

一男子新產後發不爾此氣血皆虛用托裏養榮湯氣血漸復時尚在以移延齡去又服前藥月餘而登

一男子氣血已極耗尚不慮用針頭散及必效散各三次旬日而癒

一婦人因怒致患月經不通四肢浮腫小便如淋此血分凝結以枳殼丸九散服行積消更以六君子湯加柴胡投散刺頸額亦治矣亦有先因小便不利後身重發熱者不通日水宜單重丸九治之婦人良方不通者人應早治因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通者血分水化為膏血不通則復化爲水矣自服枳丸七若先因小便不利後身浮腫

致經水不通名曰水分宜服葶藶丸

室女年十九頸腫而面色不凝肌肉削削瘠瘠最痛此七情所傷血氣皆損之證也當先滋養血氣後不使乃服風藥後傷不起虛風疑曰經云神傷於思遠則肉脫思傷於憂則肌脫厥傷於悲其則筋弛就傷於喜樂則皮弛志傷於怒則肝合難以下仰而一癯瘠四肢倦怠殊類瘵證以養血氣復脾胃藥而愈

便作瘡如瘰癧之狀此血虛也思慮過度入陰道爲此男
女失孕之證也經水不調不來也思慮過度而致此男
女不孕之證也幸遇爲商常在外可免此婦在內久懷
幽鬱及在外又不能如願是以致此病哉見流注腫痛
癰疽疔瘡氣血已損得不可用攻伐之藥故然
故指血腫痛不來未過旬日而返其精則五臟有不足
之氣日有難舉之疾陰已痿而思治以陳其精
情不使內取小使遠道而爲舉精已耗而復損之
精不使內取小使遠道而爲舉精已耗而復損之
若夫人大寒既至雖十一年無男子小使遠道而爲
思男子合亦令不調不調則舊血不出新血誤行
或流而骨或變而爲腫或難合而亦難子合男子
多則精枯虛人走乳衆則血枯乾人觀其精血思乃男
子失矣

渴則神氣先散而水先閉也火既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故發熱嗽水氣絕故四肢乾水氣不充故多怒鬱氣焦傷骨痿候五臟傳遍然後死矣此一種於勞中最近治著病起於五臟之中無有已期藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶按如此則可得九死一生集此為例其餘諸方可按脈與證而治之張氏云室女月水久不行切不可用香薷等寒劑醫家多以室女血熱故以涼藥解之殊不知血得熱則行冷則凝養生必用方官之甚詳此段大有理不可不知若經候微少漸漸不週手足骨間疼痛麻痺漸生潮熱其脈數此由陰虛血虧得生乘之小水不能滅盛大火逼水瀉亡津液當養水益陰使母以養子之宜柏子仁丸澤蘭丸

沈氏室患瘧久而不消自汗惡寒此氣血俱虛也遂以十全大補湯月餘而瘧然其核雖取而瘧口不欲更食以豆漿餅仍與前藥加局藥香附兩月而愈大抵堅固不虛諸而不合皆由氣不足也嘗思此瘧者瘧口雖合而不加神往往變為瘧證以及赤脈貫腸胃為元陰

一婦人因怒胃下痛痛以刺防敗毒散加連翹黃芩四點而愈者治此旬日不消者以益氣血藥及飲定志酒其腫自消若無腫者亦自消不戒忿怒者則難治

一婦人亦因怒胃下痛腫頭毒熱與刺防敗毒散加黃芩治之未幾愈但飲食少思日腫發熱未退云腫有虛熱不可大攻熱去則藥生也遂以小柴胡

湯加地骨皮川芎當歸茯苓白朮陳皮十餘點而愈次年春復發堅硬不潰來索方子定八珍湯加香附藥

胡地骨皮枯梗白蜜服之至六七劑以效遂熱仍服八參散毒勢愈烈又服流氣飲則盜汗熱口乾少食至秋後未治診視氣血虛極予辭不治果疑今人有瘡瘍不審元氣虛弱在表裏服散毒流氣藥殊不知敗毒散乃發表之藥果有表證亦止立一二服多則元氣反損其毒愈甚雖有人參麥補其耗流氣飲乃耗血之劑果氣結腸滿亦止宜二三服多則血氣愈傷反為敗證雖有芍歸難以俾其丹溪云此不係香薷丹毒之變因虛勞氣鬱所致也

一婦人患瘧不消瘧不斂予以八珍湯治之少愈忽肩背痛不能回顧此膀胱經氣鬱所致當以防風通氣湯治之蓋膀胱之脈始於目內眥上額交頰下耳角復上頂至腦後過風府下項走肩膊一支下照背是滯氣動則各痛項強似折此非膀胱經證而何彼乃云瘧變癰經病也其脈主行項側即是經大動而然遂自服清肝降火之藥反致不食痛甚復請予診其脈胃氣愈弱先以四君子湯加陳皮砂芍藥半夏羌活黃芩劑子四劑食進痛止繼以防風通氣湯二劑而愈

田氏婦年踰三十患瘧已潰不愈與八珍湯加柴胡地骨皮厚朴香附母白母五十九粒貼形氣漸漸更與必效散一服瘡口遂合惟氣血未平再用前藥三十餘劑而平後復生就此散方不問虛實藥以治人殊不知方中斂斂性毒藥能專治瘡癰多服則損元氣若氣血實者先用此下而投補劑或可愈若虛

而用下藥或退熱藥於內雖去而瘡口不愈反致難治

廣東陳方伯子遠遊勞傷發熱脈大無力耳下患腫此項瘡也飲補中益氣湯白然熱退癰消瘡毒則有虛虛之禍後不聽脈降火藥及必效散果吐瀉不食而死八人勞傷則損氣氣衰則火旺火旺則乘其脾土故傷愈而熱此元氣傷也丹溪云室補氣調經散其毒自消不可下若不詳脈證經路受病之異而輒下之鮮不危矣

汪中翰姪年及二十下患瘧瘧補五臟脈數此肝經風熱所致以刺防敗毒散二貼表證悉起由與散腫潰堅九月愈而平復

一婦人二十耳下結核極大每過期十後頭痛瘰癧風藥愈盛予以八珍湯加柴胡地骨皮二十餘劑而愈

楊文魁年踰三十勞心過度頭暈發熱腹敗毒散愈盛予以補中益氣湯數劑而消一瘰癧潰後發熱煩燥作渴脈大熱力此血虛而熱也以當歸補血湯六劑頓退以是瘰癧潰數劑少愈更以八珍湯加白母連志十餘劑而愈然其下發熱熱熱大渴不止煩躁熱熱不欲近衣其脈洪大按之無力或日痛瘰癧者非白虎湯證也此虛熱發瘰癧以當歸補血湯主之又有火鬱而鬱者如不能食而熱口舌乾燥大便難者以辛苦大寒之劑下之以瀉火補水

一男子頸間結核大潰予用梔子清肝火養肝且益

桑木灸法早晚二次灸之又塗紫雲膏數日患者頭面俱腫雙目合縫形狀可畏然後腐潰並作膿出日漸收升如此半月同前藥不善其事內加煩躁不寧

堅執強阻，豈後變證一出，煩悶昏憤，人事不省，彼方驚悔，隨用鉞鉗左右耳邊，併項之中各開一竅，內有

用葱艾湯洗盡舊藥，連藥筒拔提二處，拔出瘀血，俟餘髓用銀鉗斜斜插入，根腳透通，患底數處，以蟾酥蘸入，凡內北邊，隔海為最惡，以黃益土散處，以

眞君妙貼散數之日漸日消其毒收歸後項原是又兼服內托降火療之藥三四日候其大熱已退內膿已通膿脫十全大補膚凡堅而不化有膿之癰而不痛者數日而後生膿之癰之如此調理將近三月方得完口半後復虛者請戒忌醫之過幾平至於喪命者多矣

一女人年過六旬係官族素患怯弱聞思道初起頭便如票謂可容數之病也喜其形體不能難登之後必易於臨瀆此則不妨前說先用隔紙灸之次用蠟酥餅貼灸上四邊以吸毒散敷之收其根腳不散內服托裏消毒散散服瘡聖藥疼苦不止子到某日方止現今瘡不腐潰其脈細而無力此內瘡之故不能解解爲膿以疼爲苦豈可待止大換益氣養榮湯加角鐵白芷三服癰亦漸起外用桑香附倍用參氏又敷服方得膿潰潰後痛亦不止子曰再三日午後痛可止也至期腐肉將脫小半隔午用乳香定痛散一服午後疼痛頓退安睡不醒思家欣悅子曰不然此在用藥過其時也雖平日之言應於今刻信則不失其後當某日腐盡某日脫半某日完口此二者思家以蜜糖記候期日果實並無過與不及也此法要在眼力精巧量難易新膿速速補助有無用藥合式然後復相量日數可決於前後之必中也

一婦壯年進症二日其形徑對前口後家相畏人辟不需療醫此穴也子視頂高脚趾難發不妨按發內治之方安子曰藥治則不能鍼治則可取彼從之用

錢錫當頂鍼入六七分貼至軟肉方住隨去瘀血又以蠟酥條插入孔內服蠟酥丸得大汁而解次日藥上微退出之漸消九惡內毒未盡又用消毒清熱之藥數服不出十日而血大抵凡欲清瘡先斷根本大泄毒氣使毒自衰無得內攻爲妙

一男子年復生疽十餘日自謂小恙不治將近半月根脚漸大癰腫惟流血水稀惡汚穢四邊紫黑脫陷無膿而慘惡欲手冷氣促脈數散大無根此內敗證也何必治之辭不用藥又延客醫治之固詢無事患者恨子不治凡遇親友勉力支持屬聲自囑決不甘此子曰心不服死也再五日必死果然子會說瘡但犯此難離山岳之舉一敗無不傾倒

一男子項核腫痛均急急用荆防敗毒散一劑未盡退熱核不宜用散腫清堅湯加用芍香附貝母十餘服其核漸消以外境口貴助之月俸而安

一男人仲冬渡江染發氣又值驚恐大日寒熱交作頭面耳項俱腫先以藿香正氣散一服寒熱亦止而腫漸消項間堅腫不退紅腫作痛此毒聚必欲作膿仍用正氣散加甘歸皂刺散服候膿熟針之腫痛頓退又以十全大補湯健氣生元口

一婦人孀居六載子幼未立憂鬱成疾半年又兼經水不調熱熱成疾形體消瘦亦強數此勞傷血虧肝火妄動而作此所謂婦人益之不可用退熱之藥損而復損先用逍遙散加香附牡丹皮貝母和其血脈和其肝氣使寒熱盡退大用益氣養榮湯服至月餘氣血漸復經事漸調元氣漸醒外用火針核上點破四孔用黃連膏插入五六次俟至孔大復用

冰勝散除於核上封之至十三日外其核自落外抹紅玉膏生肌收內換人參養榮湯加香附木香三十餘服其口自完此婦瘡起居延七情散口味盡調理故可得愈否則不能矣

一室女年十七因父擇婿不遂執至一旬懷抱日久項生數核堅硬如石此肝經結毒之病也又兼經水不調寒熱如咳或喉喉數惟不顯紅此陰虛火動已成癆瘵證也非藥能愈其狀瘡瘰無散色子曰欲治此病先其心可瘳又問曰何藥治心平曰非藥也易云天地風氣萬物化醇男女媾精萬物化生此天地男女生成化育之道也斯病獨起於孤陰塞陽不生不化所謂逆理之病此女大配謂當至而不至漸成失度之疾其病不生而自生非己作也由時變也故藥不能挽回必得陰陽和而後澤隨夫婦和而家道成斯病之後用藥方可復又始悟隨即擇款三日後復請視之前證稍定先用逍遙散加香附雷皮山梔丹皮貝母十餘劑開鬱疏肝寒熱漸止大以人參養榮湯加丹皮紅花通其血脈使心血易生容顏潤澤又用益氣養榮湯倍參木芍助脾胃增進飲食開用歸脾湯加參冬五味逐逐沙參收神氣寬性情又製參木地黃黃厚生半生精神頓復經事亦通惟核不能全退用火針點破一核琥珀膏貼之漸腐爲膿又兩日而散餘核三核漸針漸潰漸斂自尾尾用補脾開鬱藥調理一年始得全愈

一男子年近三十項生數核後日神勞火壯實後此元氣受傷之證也先當補氣血而根本壯實後治其瘡用養榮健胃藥十餘劑未效後以爲緩又信

方士所慮以國內消白服發覺已屬危藥連湯十數
行後致小便淋瀝不已虛熱更增飲食減少又復請
觀形色內散不處調理醫而不治後復方悔雖請內
醫強投扶助降火之藥終不應而死

一婦壯年性益夫薄不爲家左項生枝半載漸至經
期大堅硬如石皮外紅絲纏繞左右顛倒狂數訪婦
肝火妄動數乃譚熱之甚先引梔子清肝湯半伐肝
木五服後而腹始平又以清肝解鬱湯數服散其鬱
結大用益氣養榮湯調其氣血間服散腫清瘀湯軟
其堅腫外以琥珀膏貼之調理百日而元氣乃復堅
硬已消八九止存小核未盡彼以爲愈止不服藥後
又一載值夫賭訟未勝暴急驚恐前難復作兩手脈
弦細而多數此陰血虧損腸火乘之非前有餘毒也
又兼胃腸不利飲食無味經水先期過多形容憔悴
不遠此種傷於思慮則肉脫意傷於憂鬱則肢發痠
傷於悲哀則筋攣傷於喜樂則皮枯志傷於暴怒
則膽脊不能俯仰以上俱七情內損理也法當滋養
氣血調和脾胃以養清心開鬱散滯庶保無虞後不
肯信仍前欲服散腫清瘀之藥欲灸臍上以圖內消
余曰此非前比今則不敢治也諸客醫自製前藥亦
多患上併灸臍上此爲其氣虛而金虛邪氣實而益
實後果反加發熱自汗欬嗽咽乾四肢不收食痛無
藥草水不經睡亦燥盛此難治已損之候必不久居
也又月後傷風氣急聲啞痰血文出而致全若見諸
醫不辨虛實思家不信正理偏聽藥業往往多致不
救者十有八九凡醫者思者俱當省而慎戒之

肩背者肺之舍也。有火無則心火自傷。肺實之內。心主之宮城也。背為陽心為陽中之太陽。故臂中膈背肩肘間痛。手少陰心脈出腋下循臑內下肘中。循臂內後廉。是以肩支痛。

六乙之氣。遠不及則所勝之火氣乃行。肺金不及其傷。西其肺病。內含膈。肩背外。在皮毛。膈之內。肺之分也。肩內乃重門。天府之分。肺脈之所出。肩背膈食之分。皮毛膈所出也。

聖經

邪氣藏諸病形篇

小腸病者。小腹痛。腰脊疼。手足痛。肩膊上熱。

小腸名赤。屬受盛之腑。其氣與膀胱相通。是以腰脊疼。而痛手太陽之脈起於小指之端。循臂出肩解。此太陽之經脈病也。

肺病者。肩膊上熱。

肩膊上乃足太陽經脈之所循。

經脈篇

肺手太陽之脈。是主肺所生病者。氣盛有餘。則肩背疼痛。寒汗出。中風。小便數。而欠。氣虛。則肩背痛。寒少氣不足以息。皆受也。

氣之盛虛。謂太陽之氣也。肺金在肩背。因氣而痛於金。所謂氣傷痛也。兩色變者。氣虛不化也。大陽手陽明之脈起於大指次指之端。循外前廉上肩出臑。有之。前廉動則病。肩前痛。

肩痛。兩合間為臑骨。

小腸手太陽之脈起於小指之端。出肩解。繞肩胛。交肩。上動。則病。痛。肩似拔。腕似折。

脊兩旁為脊。脊上兩角為肩。解肩解下。成片骨。為肩胛。

膀胱足太陽之脈。其直者。循肩膊內。挾脊抵腰。中其支者。從臑內左右別下。貫脾。

三焦手少陽之脈起於小指次指之端。上貫肘。循臑外上。而交出。足少陽之脈。循行手少陽之前。至肩。上却交出。手少陽之後。

手太陽之別。上走肘。絡肩髃。

手陽明之別。上循臂。來肩髃。

經別篇

手太陽之正。指地也。列於肩解。

指地者。謂手之太陽下合於足太陽也。

手陽明之正。從手循臑。乳別於肩髃。

經筋篇

足太陽之筋。上挾脊上項。其支者。結於肩髃。其病脊反折。肩不舉。

手太陽之筋。上繞肩髃。其病。繞肩髃。引頸而痛。手陽明之筋。其支者。繞肩髃。挾脊。直者。從肩髃上頸。其病。肩不舉。

手太陽之筋。下出缺盆。結於前臑。

肘度篇

肩至肘長一尺七寸。

五邪篇

邪在臂則病肩背頸項痛。

師傳篇

五臟六腑者。肺為之主。百病肩膊喉見其外。

本經篇

白色。小兒者。肺小。短理者。肺大。巨肩反。肱陷。喉者。肺高。合。肱。宏。有者。肺下。軒肩。背厚者。肺堅。肩背薄者。肺脆。肩背厚者。肺正。背偏。矮者。肺偏。傾也。

肺居肩之內。脊膊之上。故視其肩背。臑腋。即知肺之高下。堅脆。偏傾。

玉版篇

肩項中不便也。

大陽為諸陽主。氣肩項中不便。陽氣傷也。

陰陽二十五人篇

木形之人。大肩背。火形之人。好肩背。肩背肉滿。土形之人。美肩背。金形之人。小肩背。水形之人。小肩。

邪客篇

地有高山人有肩膝。

論疾診尺篇

肘後痛。臂者。肩背熱。

肘後乃手少陽之支。并處。蓋以兩手下垂。上以候下。以下候下。前以候前。後以候後也。

九宮八風篇

風從北方來。名曰大剛風。其傷人也。內含於腎。外在於骨。肩背之骨。皆痛。

淺者。化中藏經。

肩痛

心病則臂中痛。四肢逆冷。肩背骨痛。皆痛。

肺脈虛則不能息。耳重。眩暈。欬上氣。肩背痛。

宋黃漢卿培補金壽

肩疽

病肩者因負重傷動肩井穴故生此疽用內托散加烏藥青皮木香外貼金線膏

肩疽受在臂膀脫氣血凝滯不行結成疽毒也先用流氣飲內托散四圍以藥敷之冬服消毒散內托定痛散

此毒因惡氣上攻於心酒後房事下傷於腎宜服加味托裏散如癰出晝時服內補散三四貼膿未盡時服排膿內托散小便赤澀用五苓散加黃連燈心服之其毒從小便出更服乳香蓮心散日進五服又服黃藥丸日進二服

上肩疽下風疽

此毒因惡氣上攻於心酒後房事下傷於腎宜服加味托裏散胃弱滿悶加陳皮砂仁熱盛加小柴胡黃芩元參咳嗽加麥冬兜兜乾五味杏仁桑皮口乾煩躁加寒冬前胡乾葛烏梅寒多加厚朴防風藜香再服黃藥丸通氣散仍貼元武香金線膏如癰出晝時服內補散三四貼膿未盡時服排膿內托散小便赤澀用五苓散加黃連燈心服之其毒從小便出更服乳香蓮心散日進五服又服黃藥丸日進三服

左右搭

此證少陽經少血有相火亢其於脈陰證於左搭肩骨上生移動之處可治難於右搭肩骨者必難治也此證由於風濕之來以脈斷之邪在表其證大小便如飲食如常口能知熱知其不在裏也不惡風只嫌熱不喜知不在表者表裏既和則邪在經絡

中經於經絡其難斯出身半已上風從受之故云八風之變法當却寒邪調和經絡中氣血則氣血通暢自愈

左右串

此證發於左搭肩骨上生移動之處可治難安申於右搭肩骨必難治矣可用雞黃皮及綿絮乾為末濕則乾擦乾則清油調搽

癰疽發

凡兩肩下兩脅邊成癰疽因血虛而氣亦虛切不可服補陽之藥熱劑則補而愈也倘受熱劑則虛熱愈盛易致傷骨應切慎切慎宜服十六味流氣飲內疏黃連湯治法與發背癰疽同湯劑附子薄桂烏頭之類

元李某十書

肩痛

脈經風寒汗出肩背痛中風小便數而欠者風熱寒其肺使肺氣鬱甚也當散風熱以通氣防風湯主之如肩背痛不可回顧此手太陽氣鬱而不行以風藥散之

明戴思恭證治要訣

作痛

肩背痛未辨何因誤認宜和氣飲每服加烏藥半錢當行背一片冷痛皆發疼痛古方用神保丸愈者此有積氣故也其人素有痰飲流注肩背作痛宜星香散或導痰湯

下五套凡九於喉門門停飲證藥

有腎氣不循故道氣逆於背而上致肩背作痛宜和氣飲每服加炒茴香半錢炒木椒十粒有本體虛及病後心虛弱或乘引引氣或走注肩背此乃元氣上逆當引使歸元不可復下疏利之劑愈劇愈痛故汗太多人患此者兼性溫補拘於氣無補法之說誤矣經云汗者心之液又曰陽受氣於留中汗過多則心液耗竭氣不足故致疼也

樓氏醫學綱目

痛風火別病

肩背痛屬肺分野野經云西風生於秋病在肺象在肩背故秋氣者病在肩背又云秋脈太過為病在外則令人逆氣背痛痛溫然也

肩疽

運氣肩背痛皆屬火攻肺病經云歲火太過民病肩背熱又云少陰司天熱淫所勝肺病肩背腫熱金中痛又云歲金不及其病內含膚肩背外在皮毛治以寒劑是也

肩疽

丁疽發兩肩惡血兩結內外榮衛不通發成疽疽五日腫大令人口噤寒戰十二日可割不治二十日死陳乾疽腫發兩肩及兩大臂脾腎二十日痛不患亦不可動五十日身熱不赤六十日可割割之無血者死

左右搭手

使寒疽腫起發及兩肩肘頭一千日不大死九日可割發赤白相間最多可治全無赤白者不治李挺醫學入門

生在肩下骨上乃因飲食感毒一尺深一寸難潰在危內不肯膿不危急治脾肝之毒內服瀉心散外用敷藥始不奔心大要服藥較之若過骨官腫者不可救

右格肩骨上生者移動之處可治若申左肩難治左格肩骨上生者移動之處可治若申右肩難治二證內服托藥散加升麻栝樓外用去惡散或糯米煨灰為末搽之乾者麻油調搽王肯堂證治準繩

肩背痛

按風寒汗出而肩背痛小便數者脈經既以風濕熱之藥通肺氣之壅則寒熱氣不足以息而肩背痛小便遺失者當以人參黃芪之屬補肺氣之虛不言可知也

肩疽

濕熱相搏肩背沉重而疼者當歸拈痛湯或問肩上生疽何如曰此處手足三陽交會之所名曰肩疽由風熱鬱結所致或因負重損傷而作服局金散勝金丹活命飲加柴胡栝樓壯實者一粒金丹下之老弱者十全大補湯托之

蓮子發

或問肩內痛滿至潰爛成瘡何如曰此名太陰疽即蓮子發屬手太陰脾經熱所致宜活命飲加栝樓黃芪參命丹勝金丹黃芪木香散選用壯實者八陳散一粒金丹下之赤色者可治青黑者不治瘡大渴胃滿脈微者死

左右串

或問左右格申何如曰左肩骨上生疽串於右者可治右肩骨上生疽串於左者難治古有此說既謂不熱攻注左右者氣血不調陰陽交錯也宜勝金丹活命飲加羌活栝樓壯實者八陳散一粒金丹下之七惡湯少何慮難痊元氣虛微治之何補哉

缺盆疽

或問一人年六十肩前陷中生疽寒熱大作飲食少進肩背拘急小水不利胃弱形脈何如是名缺盆疽又名鎖骨疽屬少陽陽明經手少陽三焦經宜隔蒜灸先服紫金丹奪命丹而惡露退惟苦小水不利投以六一散而利後服十全大補湯而安若治之稍緩必致潰爛是經少血多氣滯口不合危篤者多矣

肩後疽

或問肩背後骨上生疽何如曰此名上風疽即上搭也惡氣復鬱所致屬太陽寒少陽經初覺宜隔蒜灸活命飲加羌活栝樓柴胡勝金丹紫金丹奪命丹選用既濟十全大補湯黃芪木香散人參養榮湯

方

治毒散
治疔疽
人參 紫蘇葉 前胡 川芎 黃芩 栝樓 羌活 獨活 枳殼 白茯苓 甘草 防風 小枳殼 木香 煎服
內托定痛散
治瘡同上

人參 黃芪 生地黃 白芷 川芎 赤芍藥 防風 赤茯苓 生甘草 烏藥 桂心 枳殼 木香 右薑三片棗一枚不拘煎服

治肩疽

栝樓 厚朴 人參 白芷 黃芪 當歸身 官桂 川芎 細芥穗 黃芩 烏藥 防風 連翹 香附 枳殼 花粉

右木煎服

胃弱滿悶加陳皮砂仁 熱甚加小柴胡黃芩元參 欬嗽加麥冬兒粉五味杏仁桑皮 口乾煩躁加麥冬前胡葛根 寒多加厚朴防風薑香再服黃芪凡通氣散仍貼元武膏金絲膏

瘰癧

治左右格肩 雞黃皮焙 血竭 花蕊石 冰片 右為細末濕用乾礬乾用清油調搽 加味麻黃桂枝湯

治形實色黑青生紅腫肩背下痛脈浮數而洪紫食則噤 苦薑仁一錢半 生附子 羌活 人參 青皮 白木 山藥各一錢 半夏 生甘草節各六分 黃芪一錢 右水二鍾薑三片煎服多加黃藥

牛膝狀

治諸般瘡毒近惡瘡處服之使毒氣不攻於內不傷惡毒

牛皮膠透明者四兩

右用好酒一椀入膠內重湯煮令膠稀透服或用酒煎水湯調和服之

白芷升麻湯

治諸同上

官桂三分 白芷 紅花 當歸各一錢 升麻 枯梗各五分 甘草 生地各一兩 黃芩酒炒

黃芪 連翹 歸精各二錢 生黃連一錢五分 右十三味水酒各一椀煎至半椀服之須臾并怡

養心神不可妄想以動心火 黃芩九

一名機舉凡治諸般瘡一切惡瘡服此能衛護內服驅解毒

通明第一兩為末 黃蠟七錢

貴人加水香富人加沉香平人加紫蘇葉俱為末

鋪盤下蜜一起少置入黍葉手拌勻丸如梧子大

每服五十九溫湯下日三服未破內消已破易合

蠟性貴大腸善性解諸毒故用之也

十六味流氣散

未成速消已成速退疼痛漸減前十二味名托裏

內補散 人參 當歸身 官桂各五分 川芎 大腹皮 白芍藥 桔梗 黃芪 炙甘草 厚朴 水香

白芷 防風 烏藥 枳殼 蘇葉各一錢

右為末每六錢酒調下不欲酒者水香湯代之米飲亦可輕重量人氣軍用之服藥後飲酒以助藥力

不遇熱加茯苓白地黃

不遇飲食加砂仁香附

疼痛加乳香沒藥

水不乾加知母貝母

瘡不穿加皂角刺

大便閉加大黃枳實

嗽嗽加陳皮枳殼牛夏杏仁薑

小便閉加大黃枳實

小使閉加麥門冬車前子木通滑石燈草

內疏黃連湯

治一切癰疽腫痛心逆發熱血煩眩沉而實腫硬

藥本而皮肉不變色根深深大痛源在內臟則破

結當急疏利

黃連 白芍藥 當歸 山梔仁 檳榔 木香

薄荷 連翹 茯苓 黃芩 桔梗 甘草各一錢

右除木香檳榔為末外餘到每一兩水煎八分入

檀香二末和服之吃二服後加大黃一錢再加之

錢以和為度

烏金散

治疔毒腫痛因貧重損傷而作

硫黃 蟾酥 麝香各五分 血餘炭 蛇蛻殼

蜂房煨各一錢 蟾蛻酒洗 血竭 乳香炙

白礬蜜炒去絲各二錢 辰砂研水飛 雄黃研

穿山甲炙黃各二錢半 全蠍三錢湯泡七次

天龍四錢酒炙去頭足 牙皂四分 沒藥炙

川烏丸

右各為細末稱準分兩和勻每服二分赤砂推調葱頭酒送下取汗為度

奪命丹

治諸般癰毒疔疽惡瘡

硃砂三錢 白礬粉 寒水石 銅綠 滴乳香

明沒藥 麝香各一錢 歸牛二十一粒另研

蟾酥 輕粉各五分

右為細末丸如菉豆大如不就加好酒楊梅服一

丸生瘰三五聖藥極爛紅於手心包藥在內熱酒

和葱送下如重疔行五七里汗出為效重者再服

一二九

勝金丹

治諸同上

麝香 白硫黃各五分 雄黃 辰砂 乳香

沒藥 血竭各一錢半 全蠍泡炙 穿山甲炙

天龍去頭足炙各二錢 白礬蜜炙去絲五錢

蟾酥一錢

右為細末和勻每服三分赤砂推調葱頭酒送下

取汗為度

一粒金丹

治諸同上

沉香 乳香各五分 巴豆霜 錢五分

各為細末和勻用黑肥蠟半去皮搗爛為丸如

芡實大每服一丸重人虛實氣喘水一口服一次

胃氣壯實者只可嚼水三四口不可過後用水

一口送藥下行盡數次以米飲補之

仙方活命飲

又名真人活命飲治一切癰疽未成膿者內消已成膿者即消又止痛消毒之聖藥也

蔞乳香研 防風 香白芷 赤芍藥 當歸尾 貝母 沒藥研 皂角刺炒 天花粉 甘草節 穿山甲炮各一錢 陳皮 金銀花各二錢

右為粗末大者四兩小者二兩作一劑每夜酒十

茶鍾搗小五茶鍾入有嘴瓶內以單紙封口勿令

泄氣蒸至三大鍾去食作二大服投連不斷隨病

上下服能飲酒者服後再飲三五杯此藥並無

酒氣不動臟腑不傷血氣忌酸薄酒銀器服後偶

覺覺癢足間生神功治大不可應度

人參養榮湯

治一切潰瘍疔毒癰疽之病

白芍一錢半 人參 陳皮 黃芪蜜炙 桂心

當歸酒拌 白朮 甘草炙各一錢 熟地酒拌

五錢子炒 茯苓各七分半 遠志去心炒五分

作一劑水一鍾薑二片棗一枚煎八分食前服

十全大補湯

治諸虛百損

人參 肉桂 生地酒洗蒸焙 川芎 白芍炒

茯苓 白朮 黃芪鹽水炒 當歸酒拌各一錢

甘草炙五分

作一劑水一鍾薑棗煎服

單方

得疽吳某黃用鹽醋過炒研碎和塗之口邊

頭口背有大腫赤發即封之令不成膿用外消五

兩香豉生地黃汁各半升三味合搗敷令地黃爛熟

數餅處厚二分日三四易至差止藥治一切腫毒

錢氏

寒問曰邪客於足太陽之經令人頭項痛痛刺足小

指甲上與內交者各一疔立已不已刺外踝下三指

左取右右取左如食肉已

靈龜曰足太陽之筋其病小指支腫眼痛骨聾脊反

折項筋急肩不舉腋支缺盆中紐痛不可左右搖治

在燔鐵切刺以知為數以痛為輸名曰仲春痺也

手陽明之筋起於大指次指之端結於腕上循臂上

結於肘外上屬結於肘其支者繞肩脾掖脊直者從

肩膊上頸其支者上頸結於頰直者上出手太陽之

前上左角絡頭下右領其病當所過者支痛及轉筋

肩不舉頭不可左右視治在燔鐵切刺以知為數以

痛為輸名曰孟夏痺也

肥人廣肩腋項肉薄皮厚而黑色腎陰陽然其血黑

以濁其氣治以逆其為人也食於取與刺此者深而

重之多益其氣也

應發於肘及臂名曰地疽其狀赤黑急治之此令汗

出至足不害五臟毒發四五日逆燒之

甲乙經曰肩痛不可舉夫榮及榮榮主之

肩背脾痛骨不舉熱榮榮主并主之

肩腫不得順氣榮主之

肩背熱不舉血毒汗中不能動搖曰骨主之

肩中熱指痛肩痛主之

肩重不舉指痛肩痛主之

肩重不舉指痛肩痛主之

肩痛不可舉引缺盆痛榮門主之

肩肘中痛難屈伸不可舉腕重急前池主之

肩肘節酸重骨痛不可屈伸肘節主之

肩痛不能自舉汗不出頸痛陽池主之

肩不可舉不能帶衣凍濕主之

肩痛小指痛腋谷主之

肩痛不可自帶衣臂腕外側痛不舉陽谷主之

肩痛欲折屈如拔子不能自上下養老主之

肩背頭疼時感陽泉主之

千金方曰氣舍主肩動不得順

曲池大臂主肩重痛不舉

天井主肩痛連腋不仁不可屈伸肉麻木

肩貞肩痛肩痛主肩中熱頭不可以順

支溝腕痛主肩臂重痛

支溝腕痛主肩臂重痛

天宗主肩重痛

曲垣主肩臂痛

後發主肩痛

腕骨主肩痛

養老主肩痛

前腋主肩痛

天肱主肩痛

巨骨主肩痛

醫學綱目曰

醫學綱目曰

病者喘欬逆氣

外厥陰內血者

其二取臂經

湧泉經

肩痛連脾

一寸半溫

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

肩背脾痛

燔鐵切刻以知為數以痛為輪也

肩不可動臂不可舉肩頤二寸半肩背五分

清冷淵一寸關衝五分

肩痛腫取肩頤二寸半溫九吸腕骨七分先湯後補

兩臂痛取肩背二寸半不宜久停鍼支溝

肩痛腫取肩頤二寸半溫九吸腕骨七分先湯後補

兩臂痛取肩背二寸半不宜久停鍼支溝

肩痛腫取肩頤二寸半溫九吸腕骨七分先湯後補

兩臂痛取肩背二寸半不宜久停鍼支溝

肩痛腫取肩頤二寸半溫九吸腕骨七分先湯後補

兩臂痛取肩背二寸半不宜久停鍼支溝

肩痛腫取肩頤二寸半溫九吸腕骨七分先湯後補

兩臂痛取肩背二寸半不宜久停鍼支溝

肩痛腫取肩頤二寸半溫九吸腕骨七分先湯後補

兩臂痛取肩背二寸半不宜久停鍼支溝

肩痛腫取肩頤二寸半溫九吸腕骨七分先湯後補

兩臂痛取肩背二寸半不宜久停鍼支溝

肩痛腫取肩頤二寸半溫九吸腕骨七分先湯後補

兩臂痛取肩背二寸半不宜久停鍼支溝

肩痛腫取肩頤二寸半溫九吸腕骨七分先湯後補

兩臂痛取肩背二寸半不宜久停鍼支溝

肩痛腫取肩頤二寸半溫九吸腕骨七分先湯後補

兩臂痛取肩背二寸半不宜久停鍼支溝

肩痛腫取肩頤二寸半溫九吸腕骨七分先湯後補

兩臂痛取肩背二寸半不宜久停鍼支溝

肩痛腫取肩頤二寸半溫九吸腕骨七分先湯後補

兩臂痛取肩背二寸半不宜久停鍼支溝

肩痛腫取肩頤二寸半溫九吸腕骨七分先湯後補

兩臂痛取肩背二寸半不宜久停鍼支溝

肩痛腫取肩頤二寸半溫九吸腕骨七分先湯後補

兩臂痛取肩背二寸半不宜久停鍼支溝

肩痛腫取肩頤二寸半溫九吸腕骨七分先湯後補

兩臂痛取肩背二寸半不宜久停鍼支溝

肩痛腫取肩頤二寸半溫九吸腕骨七分先湯後補

醫案

傷門事親曰安撫初病時右臂膊痛無主持不能

舉動多汗出肌肉瘦不能止臥臥則痛其經云汗出

偏沮使人偏枯予患內經云虛與實難決而通之又

云雷瘦不飛節而刺之使經絡通和血氣乃復又言

陷下者灸之為陽氣下陷人陰中肩膊時痛不能運

動此火刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

謂此穴刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上

後用消毒藥後效若治瘡癰之人用此即是不用托

裏藥亦愈蓋止熱毒為患血氣不虧故也若金石毒

藥實者九效蓋毒又能解金石之毒也一方用桑

木五錢碎砂五分熱酒下亦效此藥托裏固內止毒

解毒排膿不動離解不傷血氣有益無損其藥易得

其功甚大偏解之處不可不知此方或疑其毒傷錄

化熱毒患處更以熱酒調服服效

下舍陳履屨之內先從左肩下一點點三日後右肩

下發一白癰如風中和如道盡自用消毒藥一劑

不散次投十宜散四劑加補脂紅大連投投其桂

防止之劑慶演後惡心嘔吐雖連不止服連服數日

牙痛汗重平風清此後解散涼劑一誤急洗去藥藥

投以參芪歸身不地黃黃附大劑一服服從左肩下

寒一點光熱起又連一服連服浮腫腫而連服參

烏金膏數日出血筋筋腫脹大小數片日連開藥一

服參芪投至八錢連兩月始安愈後時以勞風即投

參芪歸身黃附大劑乃愈

一男子肩患毒瘡痛飲冷煩燥便膿數日而潰以清

涼飲二劑少愈以金銀花散四劑愈連更以十宜散

去桂加天花粉散劑漸潰而痊此藥真能治瘡有餘

也

一人肩患疽腫數次以槐花酒一服連服以金銀花

黃芪甘草十餘帖而平槐花酒清熱之功最妙處

若胃寒之人不可過劑

一婦人患瘰癧不消膿清不飲以八珍湯而少

愈愈得瘰癧不能同類此勝此瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

風濕氣滯之蓋勝此之服始於日內醫士頂戴下