

傳科全書

女科上

女科上卷目錄 共三十八條三十九症四十一方

帶下

白帶 完帶湯

青帶 加減逍遙散

黃帶 易黃湯

黑帶 利火湯

赤帶 清肝止淋湯

血崩

昏暗 固本止崩湯

年老血崩 加減當歸補血湯

少婦血崩 固氣散

交感血出 引精止血湯

鬱結血崩 平肝開鬱止血湯

閃跌血崩 逐瘀止血湯

血海太熱血崩 清海丸

鬼胎

婦人鬼胎 蕩鬼湯 紅花霹靂散

室女鬼胎 蕩邪散 調正湯

調經

經水先期 水火太旺清經散 火旺水虧兩地湯

經水後期 溫經攝血湯

經水前後無定期 定經湯

經水數月一行 助仙丹

年老經水復行 安老湯

經水忽來忽斷時疼時止 加味四物湯

經水未來腹先疼 宜鬱通經湯

行經後小腹疼痛 調肝湯

經前腹疼吐血 順經湯

經水將來臍下先疼痛 溫臍化濕湯

經水過多 加減四物湯

經前先洩水 健固湯

經前大便血 順經兩安湯

年未老經水斷 益經湯

種子

身瘦不孕 養精種玉湯

胸滿不思食不孕 并提湯

下部冰冷不受孕

溫飽飲

胸滿少食不受孕

溫土毓麟湯

少腹急迫不受孕

寬帶湯

嫉妬不孕

開鬱種玉湯

肥胖不受孕

加味補中益氣湯

骨蒸夜熱不受孕

清骨滋腎湯

腰酸腹脹不受孕

升帶湯

便澁腹脹足浮腫不受孕

化水種子湯

婦科診病十問要訣

一問年月二問經 及筭詳察婚與親
三問寒熱汗與便 四探胸腹要分明
頭痛腰痠多帶下 味臭辨色更須清
五查孕育胎產門 崩漏注意腫痛症
六淫七情括三因 八綱九候祖先問
本病乘病問清楚 十方証治方得準

女科上卷

陽曲傅青主徵君手著

白帶下一

婦科一門最屬難治。不難於用方。難於辨症也。五帶症辨之極。夫帶下俱是濕症。而以帶名者。因帶脈不能約束。而有此病。故以名之。蓋帶脈通於任督。任督病而帶脈始病。帶脈者。所以約束胞胎之系也。帶脈無力。則難以提繫。必然胎胞不固。故白帶弱。則胎易墜。帶傷則胎不牢。然而帶脈之傷。非獨跌閃挫氣已也。或行房而放縱。或飲酒而顛狂。雖無疼痛之苦。而有暗耗之害。則氣不能化經水。而反變為

明立方極善。倘用之不效者。必其人經水不調。須於調經種子二門參酌治之。無不見效。卽如白帶症。倘服藥不效。其人必經水過期。必腹急迫。宜服寬帶湯。餘宜類參方見三十三

帶病矣。故病帶者。惟尼僧寡婦出嫁之女多有之。而在室女則少也。況加以脾氣之虛。肝氣之鬱。濕氣之侵。熱氣之逼。安得不成帶下之病哉。故婦人有終年累月下流白物。如涕如唾。不能禁止。甚則臭穢者。所謂白帶也。夫白帶乃濕盛而火衰。肝鬱而氣弱。則脾土受傷。濕土之氣下陷。是以脾精不守。不能化滌血。以為經水。反變成白滑之物。由陰門直下。欲自禁而不可得也。治法宜大補脾胃之氣。稍佐以舒肝之品。使風木不閉塞於地中。則地氣自升騰於天上。脾氣健而濕氣消。自無白帶之患矣。方用完帶湯。

白朮一兩
土炒

山藥一兩
炒

人參二錢

白芍五錢
酒炒

車前子

三錢
酒炒

蒼朮

三錢
製

甘草

一錢

陳皮

五分

黑荆穗

五分

柴胡

六分

水煎服。二劑輕。四劑止。六劑則白帶全愈。此方脾胃肝三經同治之法。寓補於散之中。寄消於升之內。開提肝木之氣。則肝血不燥。何至下尅脾土。補益脾土之元。則脾氣不濕。何難分消水氣。至於補脾而兼以補胃者。由裏以及表也。脾非胃氣之強。則脾之弱不能旺。是補胃正所以補脾耳。

青帶下

二

脾主喜燥而惡
濕土病濕則木

婦人有帶下而色青者。甚則綠如菴豆汁。稠粘不斷。其氣腥臭。所謂青帶也。夫青帶乃肝經之濕熱。肝屬木。木色屬青。帶下流如菴豆汁。明明是肝木之病矣。但肝木最喜水。潤濕亦水之積。似濕非肝木之所惡。何以竟成青帶之症。不知水為肝木之所喜。而濕實肝木之所惡。以濕為土之氣故也。以所惡者合之所喜。必有違者矣。肝之性既違。則肝之氣必逆。氣欲上升。而濕欲下降。兩相牽掣。以停住於中焦之間。而走於帶脈。遂從陰器而出。其色青綠者。正以其乘肝木之氣化也。逆輕者。濕必輕。而色青逆重者。熱必

必乘之木又為
濕土之氣所侮
故肝亦病道遙
散減去當歸妙
極

重而色綠。似乎治青易而治綠難。然而均無所難也。解肝
木之火。利膀胱之水。則青綠之帶病均去矣。方用加減逍
遙散。

茯苓

五錢

白芍

酒炒
五錢

甘草

生用
五錢

柴胡

一錢

陳皮

一錢

茵陳

三錢

梔子

炒
三錢

水煎服。二劑而色淡。四劑而青綠之帶絕。不必過劑矣。
夫逍遙散之立法也。乃解肝鬱之藥耳。何以治青帶若
斯。其神與。蓋濕氣留於肝經。因肝氣之鬱也。鬱則必逆。
逍遙散最能解肝之鬱。與逆鬱逆之氣既解。則濕熱難

留而又益之以茵陳之利濕。梔子之清熱。肝氣得清而青綠之帶又何自來。此方之所以奇而效捷也。倘僅以利濕清熱治青帶。而置肝氣於不問。安有止帶之日哉。

黃帶下 三

婦人有帶下而色黃者。宛如黃茶濃汁。其氣腥穢。所謂黃帶是也。夫黃帶乃任脈之濕熱也。任脈本不能容水。濕氣安得而入而化為黃帶乎。不知帶脈橫生。通於任脈。任脈直上走於唇齒。唇齒之間原有不斷之泉。下貫於任脈。以化精。使任脈無熱氣之繞。則口中之津液盡化為精以入。

丹邪元邪四字
未晰擬易以真
水真火為濕熱
之氣所侵統於
任脈云云較無
語病然原書處
不可輕改姑仍
之

於腎矣。惟有熱邪存於下焦之間。則津液不能化精而反
化濕也。夫濕者土之氣。實水之浸。熱者火之氣。實木之生。
水色本黑。火色本紅。今濕與熱合。欲化紅而不能。欲返黑
而不得。煎熬成汁。因變為黃色矣。此乃不欲水火之化。而
從濕化也。所以世之人。有以黃帶為脾之濕熱。單去治脾
而不得痊者。是不知真水真火。合成丹邪元邪。繞於任脈
胞胎之間。而化此黃色也。單治脾何能痊乎。法宜補任脈
之虛。而清腎火之炎。則庶幾乎方用易黃湯。

山藥

一兩
炒

芡實

一兩
炒

黃柏

二錢
鹽炒

車前子

一錢
酒炒

白果

十枚
碎

凡帶症多係脾
濕初病無熱但
補脾土兼理衝
任之氣其病自
愈若濕久生熱
必得清腎火而
濕始有去路方
用黃柏車前子

水煎連服四劑無不全愈。此不特治黃帶方也。凡有帶
病者。均可治之。而治帶之黃者。功更奇也。蓋山藥芡實
專補任脈之虛。又能利水。加白果引入任脈之中。更為
便捷。所以奏功之速也。至於用黃柏清腎中之火也。腎
與任脈相通。以相濟。解腎中之火。即解任脈之熱矣。

黑帶下

四

婦人有帶下而色黑者。甚則如黑豆汁。其氣亦腥。所謂黑
帶也。夫黑帶者。乃火熱之極也。或疑火色本紅。何以成黑。
謂為下寒之極。或有之。殊不知火極似水。乃假象也。其症

錦絲帶

錦絲帶是帶下

的一粒以其下之形狀如絲短至一寸長至尺餘条条如錦絲晶莹雪白而閃々反光有紋性可以拉長而不折斷患者常伴有小腹隱疼腰痠等症日久兼見腹疼婚後往往不能受孕此症多由腎氣虛寒冲任衰弱而引起治以腎氣丸加狗脊菟絲子顯驗

地黃果 山藥 山黃

澤瀉 茯苓 丹皮

肉桂 下淡附片

狗脊 三菟絲子

必腹中疼痛小便時如刀刺陰門必發腫面色必發紅日久必黃瘦飲食必兼人口中必熱渴飲以凉水少覺寬快此胃火太旺與命門膀胱三焦之火合而熬煎所以熬乾而變為炭色斷是火熱之極之變而非少有寒氣也此等之症不至發狂者全賴腎水與肺金無病其生生不息之氣潤心濟胃以救之耳所以但成黑帶之症是火結於下而不炎於上也治法惟以洩火為主火熱退而濕自除矣方用利火湯

太黃 三錢

白朮 五錢

土炒 茯苓 三錢

車前子 三錢

酒炒 王不留行

五

病愈後當節飲食戒辛熱之物調養脾土若恃有此方病發即服必傷元氣矣慎之

三錢 黃連 三錢 梔子 三錢 知母 二錢 石膏 五錢 劉寄奴 三錢

水煎服。一劑小便疼止而通利。二劑黑帶變為白。三劑白亦少減。再三劑全愈矣。或謂此方過於迅利。殊不知火盛之時。用不得依違之法。譬如救火之焚。而少為遷緩。則火勢延燃。不盡不止。今用黃連石膏梔子知母一派寒涼之品。入於太黃之中。則迅速掃除。而又得王不留行與劉寄奴之利濕甚急。則濕與熱俱無停住之機。佐白朮以輔土。茯苓以滲濕。車前以利水。則火退水進。