



小兒科

小兒形色論

論歌狀十五條

夫小兒半週兩歲為嬰兒。三四歲為孩兒。五六歲為小兒。七八歲為龆龀。九歲為童子。十歲為稚子矣。小兒半歲之間有病。當於額前眉端髮際之間。以名中食二指輕手滿額按之。兒頭在左用右手。在右用左手。食指為上中指為中。名指為下。若二指俱熱。主感受風邪。真寒氣粗。發熱咳嗽。若三指俱冷。主外感內傷。發熱吐瀉。若食中指熱。主上熱下冷。名中指熱。主夾驚。食指熱。主胸膈氣滿。乳食不消。又要觀形察色。假如肝之為病。則面青。心之為病。則面赤。脾之為病。則面白。肺之為病。則面黃。腎之為病。則面黑。先要分別五臟形症。次看稟受盈虛。胎氣虛實。明其標本而治之。無不可者。

入門審候歌

觀形察色辨因由。陰弱陽強髮硬柔。若是傷寒雙足大。要知有熱肚皮求。鼻冷便知是瘡陰。耳冷應知風熱症。渾身皆熱是傷寒。上熱下冷傷寒定。

觀形察色面目圖

眼胞絡屬脾。脾屬主風熱。
眼烏珠屬肝。青主肝有驚。
眼瞳人屬腎。不轉睛腎虧。
眼尾角屬心。紅主心有熱。
眼白睛屬肺。白主肺受冷。
額屬頭部。



觀面部

左腮屬肝。其色青者為順。白者為逆。若色赤主肝經風熱。發熱拘急。青黑主驚。風腹痛。喘急。閉。飲水傳於腎。則小便赤濁。或淋閉不通。右腮屬脾。其色白者為順。赤者為逆。若色赤者土咳。喘急。閉。飲水傳於腎。則小便赤濁。或淋閉不通。額上屬心。其色赤者為順。黑者為逆。若青黑主驚。風腹痛。喘急。微黃主溢汗。頭髮乾燥。骨蒸。骨熱。鼻屬肺。其色黃者為順。青者為逆。若色赤主脾經虛熱。飲食少思。深黃主小便閉。而鼻燥血熱。額屬肺。其色黑者為順。黃者為逆。若色赤亦主腎與膀胱有熱。而小便不通。

又

面赤心家熱。面黃脾有積。面黃肺寒。面青肝有風。唇赤心家熱。唇黃脾有積。唇白肺虛寒。唇燥脾有熱。
眼赤心經熱。眼青肝有驚。眼黃脾有積。眼白肺有驚。鼻青主吐瀉。人中青感風。人中赤肺家。人中黑瘦癱。
風池紅多喘。風池黃吐逆。山根紫傷食。承漿青主驚。舌紅面赤風。臉青唇黑風。唇青面白癱。面黃如土食。
病下眉頭皺。驚風面頰紅。渴水唇帶赤。甚其眼瞼瞼。面黃多食積。青色是驚風。面白多成渴。傷寒色紫紅。

手指脈紋式

夫小兒三歲以下有病須看男左女右手。虎口三關紋理。兩手食指本節為風關。中節為氣關。第三節為命關。其紋曲直不同。如紋只在本節病易治。過中節則病重。過第三節則難治。鵝則紋青淡紅。則寒熱在表。深紅必主傷風。痘疹。紋亂則病人。紋細則腹痛。多啼。乳食不消。紋粗直。指甲必主驚風。惡候。紋黑如墨。必因重難醫。此乃神聖工巧之一端也。

虎口三關脉紋圖

虎口入手處是也。三關在第二指。久看三節。



脈指歌

小兒食指辨三關。男左女右一般看。皆知初氣中風候。末是命門易亦難。要知虎口氣紋脈。倒指看紋分五色。紅黃安樂五臟和。紅紫依稀有損益。鑿青傷食氣虛煩。青黑之時症候遠。忽然純黑在其間。好手醫入心胆寒。若逆上到風關。粒米短長分兩端。如槍衝射驚風至。分作枝叉有數般。弓反裏順外為逆。順逆交連順已難。又頭長短猶可救。如此醫人仔細看。初看掌心中有熱。便知身體熱相從。肚熱脚冷傷積定。腳熱頭熱是感風。頭冷腳熱驚所得。瘡疹發來耳後紅。孩子無事忽大叫。不是驚風是天虧。大吐氣促長聲驚。課吃熱毒閑心竅。急須吐下却和脾。若將驚鴻真堪笑。利後努氣眉頭皺。不努不皴腸有風。熱冷不調分赤白。脫肛因熱毒相攻。十二種病何為警。禁口刮腸大不同。孩兒有病不可下。不熱自汗兼自渴。神困頹陷四肢冷。乾嘔氣虛神怯怕。吐衄面白毛焦燥。府氣潮熱食不化。鼻塞咳嗽及虛痰。脉細腸鳴燥煩誅方。將有積與疎。下了之時必生訛。孩兒寶熱下無辜。面赤睛紅氣壯強。脉大弦洪肚上熱。肝脾喉痛屎如湯。屎硬腹脹脇肋備。四肢浮腫夜啼長。遍體生瘡肚隱痛。下之必愈是為良。

小兒脉理

小兒一歲變蒸已足。方有脉。自寸口而生。子見小兒初生未滿月。手掌高骨之際。亦有脉息吸收而動。脈者氣血之波瀾。既生乃成人。必有氣血焉得無脉。但不見有大人察其端的之至意也。

小兒脉歌

小兒有病須憑脈。一指三關定真數。遲令數急熱古今傳。浮風沉積當先識。左手人迎主外症。右手氣口主內疾。外候風寒暑濕侵。內候乳食痰積致。洪緊無汗是傷寒。浮緩傷風有自汗。浮洪多是風熱盛。沉細元因乳食積。沉緊腹中痛不休。弦紫喉間作氣急。緊促之時疹痘生。緊數之際驚。風至虛軟慢驚作夢。緊數驚寒風癇發。搐搦軟而細者為疳蟲。牢而實者因便閉。脈芤大小便中瀉。虛濡有氣者微浮滑。主露溫冷所傷。弦急客忤君須記。大小不勻為愆候。一至為脫。三至平和曰無疾。七至八至病猶輕。九至十至病勢急。十一至死無疑。此訣萬中無一失。

小兒五臟主病脉歌

心脉 心脉浮數驚與熱。 傷暑焦喘明白訣。

吊腸疝氣及盤腸。

壅結口瘡小腑滿。

心脉沉遲臍脇寒。

諸氣有冷痛難當。

小便頻數腸中冷。

下指端詳仔細看。

肝脉 肝脉浮數定主風。

目赤翳膜火主筋。

流淚出血眼生眞。

或痒或痛怕羞明。

脾脉 脾脉沉遲主風吹。

面青唇白眼喜張。

諸病傳入慢風候。

良醫仔細要參詳。

肺脉 肺脉浮數主便血。

能食胃惡脾臍堅。

滯穎口瘡停壅結。

氣虛胃弱不能食。

膀胱沉遲主風寒。

傷寒咳嗽遍身熱。

滯穎嘔惡醒脾丸。

唇紅臉赤胃中熱。

腎脉 腎脉沉遲主風寒。

臟腑滑腸或洞泄。

氣急痰盛或瘡症。

滯穎潮熱大腑滿。

臂脉 臂脉浮數實有熱。

口臭咬牙是臂驚。

仍有咳嗽與痰涎。

下根不定即無根。

督脉 督脉沉遲定有寒。

臟腑停留入督處。

偏墮膀胱痛又赤。

停身齒內出鮮血。

小兒死症真訣

黑色如懸針眼下。虛醫也須怕。忽然腹痛鼻青時。不必更求醫。青色連目橫入耳。此候必知死。黑色繞口及連目。看看定不足。黑色眉間也不良。十日必然亡。人中黑色入口來。孩子入泉埋。水腫之病準頭黑。報君腎氣滅。咳嗽切忌白入眉。肺絕要君知。孩子吐時鼻色白。命斷能再得。中風切忌面如壯。焉能得久長。目焰無光兼直視。必定三朝死。更有瞳人不動時。死候要君知。目似開又不開。也是死之媒。口禁全然不進乳。此病終不起。瀉下之物如渴血。孤兒不得活。長吐不止又吐。休要勞心顧。别人不食更啖食。終與死為鄰。瀉利不歇歇。又來指日下泉台。小便艱難又太渴。畢竟難得活。大使用藥全不通。扁鵲也無功。耳上主瘡黑斑出。醫人無此術。久嗽四肢皆逆冷。無由難得醒。休熱多寐睡不醒。休要費精神。痘疹出後熱不退。此候應為害。下糞青黑不止時。不覺更良醫。久

渴之後加燥渴。命必難得活。腹脹脹時氣又篤。終久命不甦。

小兒死候形征

大衛無脉。滿口枯涎。身出黑汗。舌縮生瘡。五心凸腫。瀉出黑血。丹毒遍身。瀉止又渴。直視看人。面黑。狂燥。驚叫咬人。吐瀉不止。魚口氣。龐鼻乾黑。燥忽作鳴聲。啼哭無淚。兩眼半閉。四肢羸瘦。氣喘無煙。肚大青筋。四肢逆冷。汗珠不流。唇反舌縮。用手指人。搖頭動項。顙門作坑。涎如牽錫。拘腰凸肚。算內氣冷。患者皆死。以上並是死候。難以醫療。不可順情。

看兒眼法

小兒諸病。但見兩眼無睛光。黑睛無運轉。目瞑無蜂芒。如魚眼猫眼之狀。個個不治。或神藏於內外。若昏困者無妨。其有病篤而眼中神氣不脫者。可以活。眼者五臟六腑神氣之所發。神氣已脫。脈雖僅存。亦未能保。

相兒命短長法

兒初生。呼聲連延相屬者。壽。聲絕而復揚息者不壽。○啼聲散不成人。○啼聲深不成人。○臍中無血者好。○臍小者不壽。○通身軟弱者無骨者不壽。○魚口長大者壽。○自閉目者不成人。○目視不正數動者。大非佳兒。○汗血者多死不壽。○汗不流不成人。○小便凝如脂膏不成人。○頭四破不成人。○常搖手足者不成人。○早坐早行早齒早語。皆惡性非佳兒。○頭毛不周匝者不成人。髮稀少者強不聽人。不聰。○額上有旋毛者。早貴妨父母。○兒生枕骨不成者能言而死。○尿骨不成者能倨而死。○掌骨不成者能匍匐而死。○蹠骨不成者能行而死。○臍骨不成者能立而死。○身不收者死。○魚口者死。○股間無生肉者死。○頭下破者死。○陰囊下白者死。○卵脬通達黑者壽。

急驚

脉訣啟蒙曰。小兒脉促急為虛驚。○直指云。浮數洪緊為實驚。○沉遲散緩為慢驚。○虎口脉紋青紫為驚風。○紅者風熱輕。○赤者風熱盛。○青者驚風。○紫者驚熱。○青紫相半。驚積風熱俱有主急驚風。○青而父紫。伸縮來去。主慢驚風。○紫絲青絲或黑絲隨隱相雜。似出而不岀。主慢脾風。○形勢灣入裏者順。○出外者逆。急驚風者。因內有鬱熱。外挾風邪。○家受熱而積滿。肝家主風而發熱。夫木制任金。火盛則金受制。金衰不能平木。木能生火。火得風則煽。煙起。故子母縱橫。血亂無係。痰涎壅塞。闊故不通。風火蓄盛而不得泄。暴烈而成急驚也。其症牙關緊急。壯熱潮紅。覩視反張搐搦。擅動唇口。眉眼貳引。頸併六脉。浮散其脈。治先擗鼻通關。痰涎壅盛。以吐風散吐之。次用敗毒散保命丹。或雄黃解毒丸。下之驚退而神志未定。投安神散。但噴藥不下。通關不噫。眼睛翻轉。口中出血。兩足擺跳。肚腹搐動。或神緩而摸牀尋衣。症罵而晨昏。氣促。心中熱痛。忽大呼聲者不治。

寒驚散 半夏 牙皂 等分為末用少許吹入鼻中。

○一論小兒急慢驚風發熱口噤不省人事。手心伏熱痰涎咳嗽上壅喘急並宜湯法。

吐風散 全蝎炒一瓜蒂細十赤小豆三十右為末每一歲服一字溫米飲調下未吐再服。

○一論小兒急驚風初起發熱手足搐搦眼上視等症并一切感冒風寒頭疼發熱咳嗽鼻塞聲重及痘疹欲搐發瘡并時行瘟疫等症宜。

加味敗毒散 茄活 獨活 前胡 柴胡 白茯苓皮人參 枳殼去梗桔梗 天麻 全蝎 姜絲 白附子 地骨皮 川芎

甘草

右作一劑生姜三片水煎熱服。

一論小兒急驚搐搦眼昏迷口噤搖頭大弔發熱抽搐。

南極奇星湯 膽星 防風 白附子 蟬退 薄荷 甘草 右剝水煎服。

○一小兒潮熱驚啼 木通 車前 赤茯苓 麥門冬 蟬退 防風 白芍 甘草 燈草 水煎服。

○一小兒驚風咳嗽痰喘 天南星細大者炮去皮為末每服或生姜三片水煎溫服。

○一論小兒胎驚內吊 肚腹坚硬目睛上視手足搐搦角弓反張痰收熱一切急慢驚風並皆治之。

至聖保命丹 南星炮去皮用白朮水浸一宿再出酒浸一宿再出酒浸半夏同上青黛 薄荷各一全蝎去尾天麻 白附子炒 姜鑑姜汁防風

鬱金 甘草略五麝射少硃砂五錢右為細末煉蜜為丸朱砂為衣艾實大每服一丸燈心薄荷湯化下。

○一論小兒痰喘急慢驚風至死但能開口灌下無不活者用。

千金散 內閣秘傳 全蝎炒去皮真姜黃各三朱砂分牛黃冰片 天麻 黃連各四膽星 甘草各二右為末每服五七厘薄

荷燈心金銀煎湯不拘時調下。

○一論驚風退後恍惚虛怯安神定志調理之劑。

安神散 人參 侯令去皮遠志去天麻白附子 麥門冬 全蝎 蓼肉 茯神去皮朱砂各等右為細末每服燈心湯下。

○一小兒沉困發熱驚搐不乳視其脉紋如亂魚骨此風熱驚驚之症也先用抱龍丸少許祛風化痰後用六君子湯加柴胡壯脾平肝遂熱退而驚定愈矣。

○一小兒癰癰發叫額間青黑此驚風肝木乘脾腹中作痛也先用六君子湯加木香柴胡鉤藤鈎嘴叫漸暖更加當歸又二劑而安。

○一小兒目內色青脣搐口上下叫哭不已或用牛黃清心丸不愈反咬牙頓悶小便自遺此肝經血氣虛甚故耳余用補中益氣湯及六味地黃丸而痊。

慢驚

夫慢驚風者。因外感風寒。內傷乳食而作吐瀉。或得大病之餘。或誤吐下之過脾胃而虛。脾與肺母子也。母虛亦令子虛而生枯瘦。胃虛則能生風。風能開能動。故其症目偏喜閉。夜滯咽喉。如牽鋸狀。口鼻氣冷。昏緩而青。涎流口角。將復堅癥是也。治宜怯風活痰。健脾生胃。不可妄用腥羶色粉等藥。其有眼閉四肢厥冷者。名曰慢脾風。極危篤。速用回陽之藥。手足漸溫。復以醒脾散理之。其服藥不效。大衝脉尚有者。火百會穴。但面黯神慘。魚口猖狂。脾痛脹動。身冷粘汗。頭搖髮直。睛定口瘡。喘噬尺卧。唇縮氣虧者不治。

加味和中散 治小兒慢驚風。人參 白朮去皮一錢 白茯苓去皮一錢 陳皮分五半夏分 全蝎炒五分 天麻分細辛三分薄荷三分甘草分二 右剉一劑。生姜裹煎服。母乳亦宜服之。

○一論小兒吐瀉不止。作慢驚風。脾困。昏沉默然。不食。宜

醒脾散 人參 白朮去皮一錢 茯苓皮一錢 木香 全蝎 姜黃 白附子 天麻 甘草 一方去天麻姜黃。加泡南星半夏。炒陳倉米二百粒。水煎熱服之。右剉生姜三片裹一枚。水煎服。

○一論慢驚。乃元氣虛損而至。晝憤。夜火百翕。若待下痰不愈而後火之。則元氣脫散而不救矣。此乃臟腑傳變已極。總歸虛處。惟脾受之。無風可逐。無驚可療。此固脾虛不能攝運而作疾也。此方專治慢驚。涎潮於膈。或吐或瀉。不思飲食。神昏氣弱。宜用

紫金絃子 人參 白朮去皮一錢 茯苓皮一錢 白朮 神桂皮一錢 山藥炒七分 乳香 長砂炒七分 二赤石脂炒七分 膏肓香炒七分 右為細末。以糊一兩為丸。如彈子大。金箔為衣。母一粒。薄荷湯研化服。

○一小兒嘔吐不食。手足拘搦。涎潮上壅。手足指冷。額黑唇青。此腎水勝心火也。用五味異功散加木香炮姜。搗安乃去炮姜。再剉而愈。

○一小兒潮熱發搐。涎潮上湧。手足指冷。左腮至申酉時。青中隱白。手足時搐。此肝經虛弱。肺金所勝。而潮搐脾土虛弱而手足冷也。用補中益氣湯。以調補脾肺。用六味地黃丸。以滋補肝腎而愈。蓋病氣有餘。當認為元氣不足。若用瀉金伐肝。清熱伐痰。則誤矣。

母食後。捏去宿乳汁。服之即便。卧寢時。令藥入乳之脉。火令兒吮不可過飽。亦良法也。

五味異功散附圖 補中益氣湯附圖 六味地黃丸附圖

慢脾

慢脾之症。面白頰浮。古短頭低。眼合不開。睡中搖頭吐舌。煩囁腥臭。噤口咬牙。狀手足微搐不收。或或身冷或身溫而四肢冷。其脉沉微。

陰氣極盛。胃氣極虛。十粒一二。益由慢驚之後。吐瀉損脾。病傳已極。總歸虛處。惟脾所受。故曰慢脾風。若逢風則無風可。療。但脾間痰涎壅滯而然耳。世所謂漫驚難治者。慢脾風是也。宜服。

○加味四君子湯。人參。白茯苓。蒼术。炮乾姜。四白术。炒六製附子。一羌活。三火甘草。分右剉生姜三斤。東一枚。水煎服。

○一論慢驚慢脾。危惡之症。藥力不到者。但看兩脚。而中間陷處。有太衝脈。即火百會。八三五壯炷。如小麥大。火後仍與醒脾之劑調之。

○一論小兒慢脾風。內虛昏迷不醒。宜

○加味大醒脾散。人參。白木。去芦。白茯苓。皮橘紅。丁香。南星。炮全蝎。去毒。天麻。煨白附子。煨山藥。炒本香。石蓮肉。炒石菖蒲。

肉豆蔻。

砂仁。甘草。

○一論小兒驚風後。聲啞不能言。及諸病後不能言。天南星一个。炮去皮為末。每半字五歲兒半錢。搗猪胆汁調食。前服。

○一論治慢驚慢脾之聖藥也。一錠即有起死回生之功。頃刻奏效。故名回生錠。真海上仙方也。忌驚亦效。

回生錠。

人參。去芦。白茯苓。懷山藥。桔梗。各一。甘草。膽星。赤石脂。五長砂。乳香。半錢。蒙石。炮金。牛黃。成麝。

香錢。右為末。五月五日午時。取搗勻。印作錠子。金箔為衣。陰乾。每二五分。薄荷湯化下。

諸治

脉訣歌。蒙曰。小兒脉單細為疳勞。虎口紋白色。面白者為疳。

夫疳者。甘肥無節。乳哺不調。或烹賦怯弱。血氣不足。蓋十五歲已前為疳。已後為勞也。書籍五疳病關五臟。要亦脾家有一臟。有積失治。而傳其餘也。脾家病去。餘臟皆已。症雖分乎五臟。治當以補為先。宜用地黃丸。五疳膏。肥兒丸之類。

○一論小兒疳病。面黃肌瘦。肚大青筋。大便色暗白。小便渾濁。或澄之如米泔。此疳病也。

消疳湯。山楂。去核。炒黃連。蜜汁。白茯苓。白木。去芦。澤瀉。各一。青皮。四分。甘草。生三錢。右剉。姜棗煎服。

○一治小兒疳積發熱。肚大青筋。膏瘦如柴。

消疳退熱飲。山楂。去核。蜜炙。燈心。竹茹。枳榔尖。使君子。蕪荑仁。淮木通。黑牽牛。大黃。柴胡。莪术。煨枳殼。去黃芩。

甜葶苈。右剉。水煎服。

○一論肝膽紅熱。毒瘻。或耳內耳下生瘻。發熱潮熱。或肝經溫熱。下注。瘻腫。便毒腫滿。或小腹脇股結核。凡肝膽經部分。一切瘻瘍發熱。并用之。

九味紫胡湯。柴胡。苦参。五洛人參。山梔。半夏。龍膽草。當歸。芍藥。各三。甘草。心水煎服。

○一論小兒肝疳。白膜遮睛。肝經虛熱。血燥。或風客淫氣。而患癰癧癥核。或四肢發搐。眼目抽動。痰涎上壅。凡傷損出血多。抽擗發熱。

又治腎潛髓熱消瘦。手足如冰寒熱往來滑泄肚脹口臭乾渴齒齦黃爛爪黑面黧。遍身兩耳生瘡或耳內出水或發熱自汗盜汗便血諸血失精或小便淋閑咳嗽吐血或咽喉燥痛口舌瘡裂或稟弱不足肢體瘦弱解顧鶴節五遲五軟或畏明下竈或早近女色精血虧耗五臟齊損凡屬肾脏諸虛不足之症皆宜用此以滋化源其功不能盡述

六味地黃丸 懷生地黃
熟地黃 鳴砂 石膏
內服或蒸至極黑
如泥成膏入雪山茱萸
酒蒸去核取肉乾山藥各四
白茯苓去皮福澤鴻毛牡丹皮
去骨各三兩右忌鐵器

一治小兒五疳潮熱面黃肌瘦燭渴肚大青脹手足如柴精神困倦歷來氣有勁無疾預服此藥則諸疾不生元氣虛弱者服半月身健壯

保豐五燭膏 青皮桂枝炒二橘紅五白木炭一兩半白茯苓半錢麥門冬去心使君子肉到炒七錢山楂肉五錢麥芽炒五錢金櫻子肉五錢各炒

火實仁半錢連肉心五錢炒甘草錢右為細末和引重七兩母次用藥末一兩燒鹽兩調成膏母日中早晚各服二茶匙溫水漱口。身熱咳嗽地骨皮百部肚腹飽脹大使稀水復鳴作聲或衄出不知加枳榔三錢木香或稟受氣弱加人參半錢

○一論消疳化積。磨碎清熱。伐肝補脾。進食殺蟲潤肌膚。養元氣。真王道也。

置坑中四面燶。大火爆透用。右為末。黃米糊為餅。白湯化下。或作丸。春米大。每服一三十丸。看兒大小米湯下。

癥瘕夫癥塊者。嬰兒飲食失調。三焦鬪格。以致停滯腸胃。不得宣通。初得為積。久則氣血與痰裡積塞於腹脇。及瘧家縱飲生冷漿水。亦能

成之其症乍病有時而黃膚漸發自無力或生潮熱寒熱是也治先定去寒熱次用消疎散結和脾胃之劑理之更用火法貼藥久之自効。

○一論小兒腹中癖塊發熱增寒。口乾便赤或大便稀滯或腹脹腫滿或痰收啼熱不思飲食面黃肌瘦四肢困倦等症。淨府湯 柴胡一錢黃芩分半夏一錢炒人參三分白朮一錢去芦炒白茯苓二錢去皮炒令五澤瀉三錢炒木香一錢山楂肉一錢胡黃連一錢甘草一錢

○一論小兒脾積。日久不消。元氣虛弱。脾胃虧損。肌肉消削。肚大青筋發熱。日乾。肚腹脹滿。
右剉一劑。生姜三斤裹一枚。水煎溫服。

細肝扶脾散 人參伍白朮六味子、青皮、橘紅、炒龍膽草、白芥子分八錢，柴胡、山楂分三錢，神曲分六錢，陳皮、桔黃連一錢，姜炒胡苗連一錢。

甘草分三
右剉一劑生姜三片紫一株水煎溫服

黃龍丸 扶溝劉小高傳。雄黃半錢 蟠蛇二條 沙子頭足內 蘆薈五分 阿魏三分 牛黃一分 天竺黃三分 右為末化黃蠅一兩為丸如米豆大先服七丸則熱退。次服九丸則塊消。三服十一丸則病根除。每用黃蠅煎水清入藥子黃酒下。

肥兒丸疳門前 治疳疾加神

○一專貼癰積氣塊身體發熱。口內生瘡。此藥用狗皮攤貼患處。每片重七錢。貼三日止熱。七日覺腹微痛。十日大便下腹血為驗。大有神効。忌生冷腥葷。發物百日。

神仙化癰膏 真香油一斤。秦芝祐二錢。黃丹一錢。斷二兩。水黃柏五錢。穿山甲片十四。當歸錢三。莪术錢五。全蝎一个。四。大黃錢。蜈蚣五錢。木鳖子。仙人掌。右將藥入油內。煎黃色為度。瀝去渣。搗爛待用。油冷時下黃丹。用文武火熬。槐柳條不住手搗。黑烟氣滴水成珠。手試軟硬方。可離火。次下五味細藥。並入搗爛粗渣子內。

直阿魏二乳香錢。沒藥錢。五麝香錢。皮硝三錢。風化硫末。攪勻。以磁器內盛之。如用坐水中鎔開。不可火上化。如有馬刀榧子瘡。加琥珀一兩。在內。無不效驗。

○一將軍百戰百勝膏 貼癰如神。 大黃 白芷 酒二三錢 蒜末一錢。木鳖子十一。蜈蚣一隻。穿山甲片十五。山豆一百。五草麻子五十。個。梔子伍。黃連五錢。槐柳條一百。香油二斤。入藥放裏。去渣瀝淨。再加黃丹一斤。熱點水成珠。再加血竭五錢。蘆薈五錢。天竺黃錢。輕粉五錢。阿魏錢。麝香伍錢。胡黃連一錢。硼砂錢。為末。下油為妙。

○一治小兒癬疾發熱之甚。及眼矇方。

明目化癬丹 牛黃一片。腦分熊胆分麝香。壓乳香压。右共為細末。先將乳汁於銅杓內炭火上滾黃色。下前藥。急取出。撒於油單紙上。丸如米粒大。男左女右。卧時點入大眼角內。合眼自化。頭上出汗至胸前。第二丸汗至臍上。第三丸汗至臍下。再點二二丸。腹痛濃血自愈。妙不可言。

化癬金丹 內閣秘傳 蟬酥水黃蠅路二錢。牛角。牛黃絡五錢。麝香三分。豆肉一錢。硼砂一錢。水各三。右為末。丸如米豆大。每用一粒。用扁豆針在患處刺破皮入。用膏藥貼上。一伏時揭起。其癬化膿血出盡。服調理脾胃之藥而愈。

○一論小兒患癬。年深不愈。請醫以攻撃殺伐之劑。屢投不愈。以致元氣耗傷。脾胃損傷。四肢乾涸。肢體羸瘦。面色痿黃。肚大青筋。身熱自汗。喘急氣促。泄瀉腹脹浮腫。不思飲食。遂以補中益氣湯久服而愈。

熱證

小兒之病。惟熱居多。夫熱有虛有實。是則面紅目赤。氣篤口乾。燥渴。小便赤澁。大便堅閉。五心煩熱。日夜焦啼。發壯熱。宜大連翹飲。主之。虛則面白眼青。氣微口中清冷。恍惚神緩。大便稀而小便澀。夜則盪汗發虛。那宜惺惺散主之。其有身體乍熱。沸鬱驚惕。上盛下

虛此冷熱不調候也。如熱在表宜汗。在裡宜下。表裡俱熱則宜解散。其或表裡已解。熱又時來。此表裡俱虛。氣不歸元。而陽浮於外。不可再服涼藥。必使陽斂於內。身體自涼。真參各白朮散主之。又有潮熱則發熱。有熱驚熱。頭叫恍惚。夜熱夕發。旦餘熱。莫邪未盡。食熱壯腹先發。熱瘡熱。益盜汗。壯熱一向不止。煩熱心燥不安。積熱煩赤口瘡。風熱汗出身熱。虛熱困倦少力。客熱來去不定。癬熱涎飲水。寒熱發如瘡狀。血熱已午時發瘡。熱疼耳鼻尖火。十六者大同而小異。諸症得之。各有所歸。其間或有三兩症。互看。宜隨其輕重而處治之。蓋小兒氣稟純陽。臟腑生熱。陰陽氣變。重者於外致令身熱也。若肝熱則兩眼赤痛。流淚羞明。或生翳障。心熱則口內生瘡。小便赤腫。淋瀝不通。肺熱則鼻衄不止。大腑閉結。脾熱則多涎。沫出口內長流。心脾熱則生重舌。木舌胃熱則作口臭。肝熱則目聾。或出濃汁。此五臟所生主熱各不同。是不可以概論也。大抵熱則生風。風則憤矣。

○一論小兒心經邪熱。心與小腸受盛。乃水竇之處。常通相連。則結滑則利。熱則濁。盛則林。平涼心火三焦自順。不待疾作而解證成。而瘡有疎通有之矣。十五味加湯使用。續膏溫熱。客熱寒邪。風邪冒之。肺經心將受之。不受觸傳於小腸。或閉或泄。或赤或白。林憑不通。榮衛不通。壅之作疾。其發多端。以致膈熱。眼目赤腫。唇口白瘡。津液不生。涕唾稠盛。須在表裡俱得其宜。驚風悉能散之。痰熱亦自消除。速翹之功。可謂大矣。

大連翹飲 連翹 稚麥穗 滑石 車前子 牛蒡子 赤芍藥各八山梔子 木通 當歸 防風各四 黃芩一錢 柴胡
甘草各一錢 荆芥穗 蟬退伍 右剉作一劑。竹葉十個。燈草十莖。水煎服。○風痰熱變蒸熱。加麥門冬。○寢熱。再熱。加大黃。芒硝。○
熱瘡。疔毒。加薄荷葉。○癰疽。毒熱。加大黃。芒硝。

○一論小兒蠶積熱毒。唇口腫破生瘡。牙齦出血。口具煩熱。咽喉煩燥。不寧。并痘疹餘毒未解。或頭面身體多生瘡癧。宜
五福化毒丹。犀角。三桔梗。而生地黃。赤芍。紫草。陳皮。粘子。五錢。各粉草。朴硝。各三連翹。玄參。各六青黛。二錢。右為細末。煉蜜
為丸。如龍眼大。母服一丸。薄荷湯研化下。兼有營。加朱砂為衣。

惺惺散 人參 白朮。法白朮。各去甘草。桔梗。白芍。天花粉。細辛。薄荷葉。右剉每服三錢。水煎溫服。

○一論小兒感風冒寒。用老薑三四根。薑極爛。以手抹來。相搭滿掌。烘溫暖向病者遍身擦。通氣處再偏擦幾。暖處出汗立愈。又
不相妨。

感冒

○一治小兒面青身冷。默默不語。用燈火遍身手足按穴爆之。立醒。

出痘疹屢驗絕妙

○一論小兒傷寒頭痛壯熱惡寒咳嗽鼻塞聲重痘疹欲出發搐驚風喘嗽手足搐搦守瘧宜服

人參敗毒散 羌活 獨活 柴胡 前胡 枳殼 桔梗 白茯苓 川芎 薄荷葉 人參 甘草 右剉。姜葱煎服。

○一論小兒風寒外感驚風內積發熱喘促咳嗽痰涎并痘疹初作。

羌活膏 人參 羌活 獨活 前胡 川芎 桔梗 天麻各五分 薄荷 地骨皮各三錢 甘草二錢

右為細末煉蜜為丸如芡是大每

日服一丸可免驚風痰癥等疾宜

○一論小兒四時感冒傷風瘟疫身熱昏睡氣粗喘滿痰是壅敷及驚風潮搐疎毒中暑並瘡疹欲出發搐皆可服之壯寃是小兒二五

抱龍丸 南星為末入腊月黃牛胆中除乾百日取出八錢 天竺黃 雄黃 長砂研各四錢麝香一錢 右為細末者甘草膏為丸如是角子大每服一丸薄荷

湯研化下百時內者作三服或用蠟雪水煮甘草膏汁和藥尤佳。

按右方若風熱痰火或急驚發搐昏睡咬牙形病俱寃宜用此方若初冒風寒咳嗽痰盛氣喘者屬客邪內作也先用十一味參蘇飲若邪既解而腹脹吐瀉或發搐咬牙睡而露睛屬肺脾氣虛也用四君子湯加陳皮名異功散切忌祛痰表散若過服而致前症者尤宜補溫肺脾。

參蘇飲方見喉科

脾胃

○一論小兒諸病因與攻伐元氣虛損脾胃良憊惡寒發熱肢體倦怠飲食少思或兼飲食勞倦頭痛身熱煩躁作渴脉洪大弦虛或微細軟弱右關寸獨甚亦宜用之大凡久病或過服耗伐之際虧損元氣而諸症悉具之最宜此湯調補若無有前症之兒為患者尤宜用之。

補中益氣湯 黃芪燉水棟參各一錢 白朮去皮當歸身一錢 陳皮 柴胡各二錢 甘草五分升麻

右剉

酒

心溫服

○一論小兒脾胃虛弱或因耗伐之過致飲食少思或食而難化或欲作嘔或大便不寃脾胃虛損吐瀉少食宜用

四君子湯 人參 白朮去皮甘草等分右剉姜棗煎服。

六君子湯 治脾胃虛弱飲食少思或大便不調肢體消瘦面色萎黃即四君子湯加陳皮半錢。

○一論小兒脾胃虛弱吐瀉不食或驚搐痰盛或睡而露睛手足拘冷或脾肺虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌流涎若母有疾致兒患此者母亦當服之。

異功散 人參 白朮去皮甘草去節 陳皮各等分右用姜棗煎服。

傷食

經云。脉滑者有酒食也。○虎口脉絃黃色為脾家有積。○小兒脉沉者為乳不消。

夫小兒傷食。皆因乳哺不節。過食生冷堅硬之物。脾胃不能消化。積滯中脘。外為風寒所搏。或因夜卧失蓋。以致頭疼身熱。面赤目胞微腫。腹痛脹脹。足冷肚熱。喜睡神倦。不思飲食。或進食或恶心或嘔或噦或口噉酸氣。或大便敗臭。或氣短唇悶。或胃口作痛。或心下痞滿。按之則痛。此皆為陳積所傷也。宜以萬德丸利之。若內停於食。或外久感寒邪者。則人迎氣口俱緊盛。頭疼惡寒拘急。兼前等症。宜以太和散佐之。萬氏曰。乳者奶也。哺者食也。乳後不可與食。食後不可與乳。緣小兒脾胃怯弱。乳食易傷。難以消化。初得成積久。則成癖成疳。變為百病可不慎乎。

萬億丸通治傷食百病。

○一論內傷乳食。吐腹脹痛。外感風寒。頭疼發熱。宜服

太和丸 紫蘇 陳皮 香附 羌活 蒼朮 川芎 枳殼 山楂

神曲炒麥芽炒甘草

○一治小兒食積。腹痛脹脹。肚硬青筋。黑丑半生半熟。橘核各三。木香五分。右為細末。每服五分。黑砂糖調入滾水服立消。

○一論小兒時常傷食。皮黃肌瘦。肚大腹脹。用此焦餅令常食之。

消食餅 蓮肉去皮山藥炒白茯苓去皮芡實炒研麥芽炒神曲炒扁豆炒山楂各石各等分為末。每四兩入白麵一斤。水同和烙焦餅

○一論此藥消食止泄止吐消疳消黃消脹定肚痛益元氣健脾胃。

啟脾丸 人參 白朮去芦白茯苓 山藥 蓮肉去心山楂肉 陳皮 混湯 山楂五錢

四十丸。空心未湯送下。小兒常患傷食諸疾。服之立愈。

○一論小兒傷食。肚大腹脹。用做酒小曲一枚為末。打入鷄子一个攪勻。入鹽少許蒸熟食之。每早服一次。可數次而愈。

○一論健脾胃。進飲食。消滯積。殺虫。長肌肉。乃保嬰第一方也。

保嬰丸 臨川徐培鴻試驗。人參三錢白朮去芦橘紅五錢白茯苓去皮甘草一錢青皮三錢砂仁二錢木香二錢山藥五錢蓮肉去皮心

史君子去蕊山楂肉三錢神曲炒三錢右共為細末。用生荷葉包糊。煮熟去荷葉。將糲搗爛。以淨布扭出。再者成糊。為丸如

○一小兒食粽後。咬牙欲吐。頃間腹脹。目睛黃赤。此脾土傷而肝氣所積。食積發厥也。先令鷄翎探吐出酸物。頓醒。節其飲食勿

○一小兒好吃棕，成腹脹痛。用白酒麴末同黃連末為丸服之愈。

○一小兒因停食腹痛。服峻利之藥後，患瘡目瞞而作。此元氣下陷，以補中益氣湯治之。

千金肥兒餅

小兒無病，日常食三五餅。可防患於未然，妙不可言。

嬰孩恒調乳

飲食不消停。脾胃一傷損。吐瀉兩相併。

痰嗽加吭喘。熱積致疳驚。面黃肌瘦削。腹脹吐青筋。

赤子焦啼叫。

慈母苦傷情。吾心懷幼切。家達子後答。焚實乾山藥。

扁豆薏苡仁。已上各四兩。神曲麥芽陳。

人參史君子。

山楂國老并。六味每二兩。白糯米二升。藥米均為末。

布裹甑內蒸。白糖二斤半。調和餅印成。

每日二三餅。

諸病即安寧。肥兒王道藥。價可擬千金。

吐瀉

夫小兒吐瀉皆因本氣未完，六淫易侵。兼以調護失常。乳食不節。遂使脾胃虛弱。清濁相干。蘊作而然。大概有冷有熱有食積。二者之不同也。蓋令暑脾胃虛寒。水穀不化。小便白而大便青。或如糖相。手足厥冷。或吐或瀉。宜助胃膏主之。如上之症。或兼有外感風寒。內傷生冷。身熱乍涼乍熱。作吐瀉者。宜藿香正氣散主之。熱者脾胃有瀉。大便黃而小便赤。口乾煩渴。四肢溫暖。或吐或瀉。宜甘露散主之。如上之症。有兼中暑受熱。作吐瀉者。宜葛苓湯主之。或益元散亦可。食積者。因傷食過多。精滯脾胃。則吐張發熱。若吐如酸醸氣。若瀉如敗卵臭。宜萬靈丸。微利即愈。利後不愈。乃脾胃虛弱。仍以助胃膏主之。凡吐瀉初起。卽服燒針丸。鎮固之。即效大抵吐瀉之症。多因乳食以傷脾胃。乳食傷胃。則為嘔吐。乳食傷脾。則為泄瀉。吐瀉不止。漸至日深。道其胃氣之虛。慢驚之候。自此而得。可不慎乎。

吐瀉不治症

小兒瀉不定。精神好者。脾敗也。吐瀉唇深紅者。內熱故也。不退必死。面黑氣喘者。不治。大渴不定。止之又渴。腎敗也。遺瀉不覺。必死。

燒汁丸 治吐瀉如神

黃芩過水飛朱砂

白朮水瓶各

右為末。

棗肉為丸。如黃豆大。每服三四丸。殼針尖上放燈焰上燒過。存性。

至爛涼。米泔水調服。瀉者食前。吐者無時。外用菜豆粉。以雞子清和作糊。以塗脚心。如瀉塗額門上。則去之。

○一治脾胃虛弱。吐瀉不食。凡虛寒症。先服此以正胃氣。

五味異功散 人參 白朮去皮 甘草 右剉散。姜棗煎服。

○一論小兒吐瀉脾胃虛弱。飲食不進。腹脹滿。腸鳴。吐瀉虛寒等症。

助胃膏

人參 白朮炒去皮 木香 砂仁

白豆蔻

肉豆蔻

官桂 藿香 甘草

陳皮五錢 陳皮五錢

右為細

末。煉蜜為丸如彈子大。每服一丸。米湯化下。兼治覘乳便毒。或時夜啼。胎寒腹痛。

○一論四時不正之氣。寢寢度時。氣山風燥氣雨濕蒸氣。或中寒腹痛。冒風吐瀉。中濕身重。泄瀉脾胃不和。或飲食停滯。復感外寒。頭疼增寒。嘔逆。恶心。脇膈悶。或發熱無汗。

藿香正氣散 藿香或紫蘇加陳皮 厚朴姜白朮去皮白朮去皮桔梗 大腹皮 白芷 甘草炙五分 右剉一劑。姜棗煎服。

○一論小兒夏秋之月。霍亂吐瀉。身熱口渴。

加減葛苓湯 猪苓去皮澤瀉白朮去皮赤茯苓去皮黃連五竹茹乾葛分天花粉甘草分右剉生姜煎服。如熱極加石羔知母。○瀉極加升麻。○腹痛加炒白朮一錢。肉桂三分。寒痛亦加。

○一論小兒五種泄瀉。赤白刑疾。宜用

鐵門栓 文蛤黃色兩兩炒白朮生半桔半黃丹二錢右為末。用黃蠅一兩化開為丸如菉豆大。每服大人十五丸。小兒五七丸。用茶一錢。姜

二錢。煎湯下。

○一論小兒水瀉。用蜜三匙。桔梗末三錢。蘿蔔汁調服。○微汗忌諱。

○一論小兒脾胃久虛。嘔吐泄瀉。并不止。津液枯竭。發熱煩渴。多燥。但欲飲乳食。不進。羸困失治。變成慢驚風癇。不問陰陽虛。是並宜服之。

人參白朮散 人參 白朮去皮白朮去皮藿香 木香 乾葛 甘草 右剉。姜棗煎服。○如小兒頻頻瀉利。將成慢驚。加山藥扁豆肉豆蔻各一錢。姜汁錢煎服。若慢驚已作。加細辛天麻各一錢。全蝎仁白附子各一分。若小兒冬月吐瀉。多是 寒。虛。所致。加丁香。桂。○若胃虛不能食。而泄瀉不止者。不可用淡滲之藥。但胃元氣少故也。以白朮散補之。○如不能食而渴者。倍乾葛加天花粉。○如能食而渴者。白虎湯加人參。

○一論小兒嘔吐不止。宜

金匱丸 木香 半夏 南星湯泡透姜汁三錢丁香 陳皮各二錢砂仁 蕙香各五分人參一錢 右為細末。姜汁打糊和成丸。辰砂為衣。淡姜湯送下。

○一論小兒久瀉。久痢不止。及滿口生瘡。白爛如泥。痛哭不已。諸醫罔效。

巴豆去皮瓜子仁炒燒紙錢共一錢。共搗一處。如泥。津調貼在兩眉間。豆巾包。待成泡。揭去即愈。

○一論小兒泄瀉。用巴豆汁末為膏。貼在額門上。燒線香一炷。火盡即去。巴豆立效。

○一小兒泄瀉不止。用山藥炒為末。不拘多少。入粥同粥食之。立止。

○一小兒久瀉兼脫肛。小腹重墜四肢浮腫而色黃黃時或兼青諸藥到口即嘔吐。審乳母憂鬱傷脾。大便不寃。先用補中益氣湯後用五味異功散及四神丸調治其母不兩月而子母俱痊。

○一小兒傷食嘔吐服射伐之約。嘔中見血。用清熱涼血之藥。又大便下血。唇色白而或青間其故於余。余曰此脾土虧損肝木所乘。而然也。令空心用補中益氣湯食。用吳功散以調補中氣。使涎血各歸其原而愈。

○一小兒吐瀉不止。或取轉過多。四肢發厥。虛風不省人事。用此四肢溫暖神識漸省。

益陽散 天南星爲末。每服三錢。入京棗二枚同煎服。

○一治小兒吐不定。五倍子兩個。一生一熟甘草一握。用濕紙裹炮過同爲末。每服半錢。米泔水調下。

痢疾

小兒入利者。乃饑餉勞役。風寒暑濕。因觸冒天地八風之邪而得。故以命名。利也。大抵多由脾胃不和。飲食過度。停積於脾胃。不能轉化。又為風寒暑濕干之。故為此病。傷熱則赤。傷冷則白。傷風則純下青血。傷濕則下如丘汁。人執父井。亦曰苦下。若下過後重。急。窘迫。瘡者。火性急速而能燥物故也。或夏末初秋有暴折於盛熱無所發。故客搏肌膚之中。發於外則為瘡。發於內則為痢。内外俱發則為瘧。利病日久則腫滿下焦偏冷。上焦偏紅則為上寢下虛。若脾胃濕熱之毒。重於清道而上。以致胃口閉塞而噤口之症。又有一方。一家之内。上下傳染。長幼相似。是疫毒痢也。當先推其歲運以平其外。察其體質以調其內。審其所傷。別其虛實。冷熱以治之。條然明白。不可妄試。

痢疾不治症

凡小兒下痢如豆腐渣者死。○下如屋漏水者死。○下痢如竹筒注水者死。○又小兒赤白同下。久而不禁。小便赤澀。腹痛於時。或唇紅舌胎。氣促心煩。坐卧不安。狂渴飲水。糞道傾陷。復面谷似核。飲食全不進者。並不治。

清熱化滯湯 治痢主方

黃連湯藥炒 白芍藥 陳皮 白茯苓皮枳殼炒 黃芩 甘草 右剉生姜一片水煎。空心溫服。

初起積熱正熾。加大黃芒硝。○血痢加酒炒黃芩。當歸地榆。○白痢加厚朴枳殼。○赤白並下。加川芎。歸尾。桃仁。紅花。滑石。陳皮。乾姜。黑附。○白荆久虛。加白朮。黃芩。伏苓。去苓。連枳殼。赤痢久虛。下後未愈。去苓。連加當歸。白芍。白朮。川芎。阿膠珠。○裡急後重。加木香。枳榔。○腹痛加白芍。川芎。玄胡索。枳殼。○小便赤少。加木通。橘梗。澤瀉。○下如豆汁。加白朮。蒼朮。防風。○食積。加山楂。枳壳。厚朴。○參黃芩。當歸。川芎。升麻。肉蔻。○下後二便流利。惟後重不去。者。氣陷於下也。以升麻提之。

○一論小兒利疾。屬熱居多。用黃連。黃芩。大黃。甘草煎服。亦利加桃仁。紅花。白芍。加滑石末同煎。

開板丹 黃丹飛研黃蠅頭乳香 沒藥一錢 杏仁去皮尖 巴豆八個 去油

右將四味為細末。將黃蠅頭。研成塊。

丸如黃豆大。每服一丸。空心服。紅痢冷甘草湯下。白痢冷乾姜湯下。水瀉米湯下。忌生冷油腻。

○一治休憊痢及癟瀉。日久不能安。用雞子一枚打破。用黃蠅一塊如指大。挑肉鎔以鷄子拌和。炒熟空心食之。

○一治小兒痢疾方。用雞子一個。冷水下鍋煮二三沸。取出去。曰用黃研碎。生姜汁半小鍾和勻。與兒服之。不用茶碗盛。

○一治小兒患痢脫肛。色赤或痛。以補中益氣湯送吞。連丸而愈。後傷食作瀉。或脫肛不久。仍以益氣湯服。更以草麻仁研末。隔門。

○一治小兒久痢。裡急後重。欲去不去。手足並冷。皆因氣虛寒下陷也。以補中益氣湯加木香。補骨脂。倍加升麻柴胡。

○一治紅痢及噤口。用白螺殼。搗爛盒臍中。噴刻効。

○一治痢不拘。亦曰白蘿蔔汁蜜各等分。攪匀。服三四匙効。

○一治小兒噤口痢。用田梨一個。挖空入蜜填滿。紙包火燭熱吃。立止。

○一治噤口痢。湯飲米穀不下者。石蓮子去殼。并內紅皮及心為細末。每服量兒大小。或五分或一錢三二錢。用陳倉米湯調下。如

嘔。加生姜汁一二匙。

○一治血痢。用苦參炒為末。每服三分。或五分。米湯調下。

○一治白痢。用肉豆蔻。通包煨乳香一粒。共為末。每服二三分。米湯調服。

○一治久痢不止。用陳倉米湯一服立止。一方用芫荽煎湯服効。

○一治瀉久不止。不肯服藥。用肉豆蔻煨去油為末三錢。麥麴四兩。同和切麴。入葱薑鹽煮。如常食之。

瘧疾

夫瘧者。外因感受風寒暑濕。內因飲食飢飽而作也。其症不一。先寒後熱者名寒瘧。先熱後寒者名溫瘧。寒而不熱者名牝瘧。熱而不寒者名瘧瘧。不寒而熱者節炎。身重腹脹。自汗善嘔者。名濕瘧。嘔氣吞酸。胸膈不利者。名溫瘧。一日一發。受病半年。連發二日。間一日者。氣血俱病也。起於三陽者多熱。而發於日者隨症而治。於夜者。加血藥。并用升提。暫瘧可就。久瘧加補。經久不愈。一見飲水結癖中腹。名曰癰母。此最難治。一二發間。用截太早。必變浮腫。用利之。疾然解。竟之瘧。自飲食得之居多。治須以消導扶胃氣為本。此秘訣也。

○一論食瘧吐嘔痰沫。及時行瘧瘧。不問先寒後熱。諸瘧通用。

清脾引。青皮。厚朴。橘草。果。白朮。甘草。杏仁。紫蘇。黃芩。半夏。生姜。甘草。右剉棗煎服。小便赤。加猪苓津湯。

○一論停食感寒於瘧。及中腕虛寒。嘔逆惡心等症。

養胃湯。薏米。厚朴。姜汁。陳皮。半夏。白朮。杏仁。人參。藿香。草東。甘草。右剉烏梅一個。生姜水煎服。