

全氏痘疹秘錄

未年集

邦字手抄

午未集

邦

字

子柯

全氏家藏痘疹秘錄

全氏家藏痘疹秘錄卷七午集

收靨門

收靨總論

收靨症治

全氏保元四物湯

保元八珍湯

敗草散

保元合四苓湯

全氏解毒涼血湯

實脾解毒湯

收靨太急

收靨太遲

五積散

五苓散

天水散

三黃丸

四順飲

人參白朮散

陳氏十一味木香散

桂枝解毒湯

甘露解毒湯

家傳糖芍散

保元湯

保元合苓湯

不靨

回棹飲

大連禿飲

除濕湯

宣風散

內助丹

當歸鮮毒湯

清金導赤散

陳氏木香散

人參麥冬散

人參白朮散

陳氏二味異攻散

十全大補湯

補中益氣湯

地黃丸

全氏大鮮毒湯

全氏朮苓散

倒靨

二味異攻散

五味異攻散

水泡

四苓散

清瀾

疳蝕瘡

大補湯

減癰湯

綿繭散

雄黃散

大蕪荑湯

小柴胡湯

四味肥兒丸

九味蘆薈丸

臭氣

定金湯

寒水丹

收靨日數難拘

補空痘

人中

頭足

結核

全氏加味甘桔湯

回頭疔

全氏解疔湯

四聖散

千槌膏

懸蹄散

嘔吐

全氏加味二陳湯

策連散

全氏人參二陳湯

全氏竹茹二陳湯

家傳九消丸

烏犀丸

大丰夏湯

泄瀉

十一味木香散

十二味異攻散

七味豆蔻丸

加味五苓散

七味白朮散

壯熱

桂枝葛根湯

木香大安丸

加味四物湯

全氏柴胡四物湯

大連老飲

收騰吉凶

禁忌

毒歸諸臟

收靨總論

萬氏曰痘至成膿之後光明肥潤飽滿堅寔以手拭之而痘頂微微焦硬者是欲靨之候也然大小前後最宜漸次收靨既不失在太急又不失在太緩已靨者痂殼周圍無凸無凹且乾淨黃潤而無滯濕破殘此為正靨其先天之毒已洩於外而先天之元仍歸於腎內是不極泰來之象也

又云收靨圓淨堅厚如螺靨者上也頭穿膿出堆聚如雞蠱者次也皮破膿出痂薄如紙者又其次也皮爛膿潰瘡不成痂膿汁腥臭者是更為下也如已過期熟久則爛此造化之常還作順看若未及期則為癰爛其靨未成痂而潰爛與已成痂只是

嫩薄皮者乃倒靨之症也

費氏曰痘瘡收靨始於人中以及兩頤鼻準漸至地角以至週身終及巔頂足趾次第收結凝厚滋潤是謂珠結毒盡為佳

收靨症治

管氏曰凡痘症本危氣血本虛多服補劑而有膿也將收靨者雖有熱症亦當於補劑中稍加涼藥若謂痘將靨而去補劑竟用涼藥或用下利之藥則毒反內攻必成敗症矣

乘六日痘瘡成膿之後期至九日十日之時膿漿滿足而痘色較前日行漿之時不甚明潤及痘頂微有黃色者乃欲靨也痂為膿之所結膿乃毒之所化膿必由清而稠由稠而漸漸結痂

矣此由裏傳表之道也。至於成痂之時而毒盡發於外其生意
已成八九矣。痘色蒼黃痂如栗者亮上也。不藥而愈。若色沒皮薄
膿漿清稀者。氣血俱虛也。保元四物湯加紅花少許治之。或雖
成痂如麥麤樣。身涼體淨。神色枯沒者。保元八珍湯減山查加
苓蓮肉主之。若浸浸而濕不能結痂。抓破成坑。色沒神清。頭溫
足冷者。以敗草散敷之於外。內以保元湯合四苓湯主之。若稠
密無縫。色赤而艷。煩燥不寧。身熱如烙。此餘熱猶在。急以解毒
涼血湯加減治之。又有火毒太甚。前未清解。烈火燔灼。致痘焦
黑如煤。痂硬如鉄。宜用解毒涼血湯加大黃下之。不得以痘後
無實症而概作虛論也。

又云痘至收靨時稍有熱症便加清涼解毒之藥恐火靨也若虛而有熱者鮮補同施若症屬虛寒純陰無陽者宜溫補之苦寒之味斷不可用不拘虛症實症至收靨時藥中重用土茯苓蓋此藥雖能大解其毒而不苦寒更能健脾胃也

又按靨^收之時除虛寒而外鮮毒之藥便宜加入以免痘後癰毒之患少加菊花以免痘後眼目之災若有眼內本有痘又食發表之物而成翳障者難治又按收靨時身熱如烙煩燥不寧大渴飲水者毒未盡也鮮毒之藥宜重用之不然必為餘毒所敗矣

全氏保元四物湯 黃芪 人參 炙草 當歸 川芎

熟地

有熟用 杭芍

红花

水煎服

保元八珍湯

治氣血兩虛之痘皮薄色淡身凉体靜項平頂陷漿清皺軟者此藥主之

黃芪

人參

天草

當歸

熟地

川芎

枸杞

山查

糯米

生薑三片為引

敗草散

用多年茅草屋久往霜露者取屋上朽爛者碾為細

面撒患處疹濕解毒加白芷乳香末更妙

保元湯合四苓湯

人參

黃芪

天草

白朮

茯苓

猪苓

澤瀉

水煎服

全氏解毒涼血湯

連翹

紫草

生地

丹皮

红花

山查

赤芍

芥穗

石羔

青皮

甘草

寔脾鮮毒湯

全氏家傳痘至九日十日或十一日
收靨時用之最妙

土茯苓用銀花

連壳

土貝母

芥穗

白芷

甘草

加減法

痘皮薄有皺色沒不紅者加黃芪人參炙草當歸川

芎虛中有熱加生地虛寒去連壳銀花加熟地紅花赤芍生

疔加翻白草桃仁地疔丁收靨太遲速加石羔黃芪生地收

靨太遲加白芍白朮茯苓乾嘔或吐加陳皮生姜如形症俱

實乾嘔者加姜炒黃連泄瀉加茯苓猪苓澤瀉大便秘加火

麻仁小便赤澀加木通口乾加知母花粉發渴加紅花粉失

音咽痛加元參射干桔梗失血加棕皮炭髮灰童便白痢加

肉桂血痢加白頭翁當歸椿根白皮肺熱寒戰加沙參氣虛

寒戰加人參黃芪胃惡咬牙加石羔血虛咬牙加當歸

來六曰按痘至收靨傳入脾經宜用脾家藥以固脾氣再加解毒之藥數味氣虛者參芪為主血虛者芎歸為主然除虛寒而外總宜解毒者以防痘後之餘毒為患矣固脾藥莫如土茯苓健脾胃解瘡毒兩得之藥也

收靨太急

萬氏曰收靨之時毒邪已解只要先後有次也可徐急得中也可如收靨太速毒邪未盡煎熬津液以致速枯必有餘毒矣如裏實便秘者宜利之用當歸丸

來六曰收靨太急謂之火靨或一朝或半朝而通體皆靨者是

也乃火盛之症急宜清之用清毒散服之最善此症最多治亦
易愈 曾治一子痘犯火靨其兒身熱如烙煩燥不寧大渴飲
水日夜不寐視其痘痂磊落盤暈顏色焮紅知為烈火燔灼而
津液枯焦用生地津清火湯一劑稍止三劑全愈

當歸丸

黃連酒炒 大黃生

炙草小

當歸五

熬膏為丸如胡椒大

三歲小兒服十丸白水送下

清毒散

生地

赤芍

連翹

銀花

牛子

木通

黃連

當歸

丹皮

甘草

水煎服

全氏生津清火湯

石羔

麥冬

知母

連翹

牛子

生地

銀花

丹皮

黃芩

花粉

枝子

甘草

收靨太遲

萬氏曰痘若收靨太遲者亦有數種宜分別治之。有因天氣寒涼而失蓋覆痘瘡受凍而不收者宜服五積散外用乳香燒烟於被內薰之。或因天熱其痘被蒸而不收者當服四苓散外減衣被令其清涼以天水散撲之。或因大便秘結內外天熱毒氣散漫無陰氣以飲之而痘不收者宜服三黃丸或四順飲外用胆導法敗草散治之。或因渴而飲冷水過多以致水浸脾胃濕淫肌肉而痘不收者宜五苓散或因食少氣虛而痘不收者用人參白朮散去葛根加肉桂主之。或因泄瀉氣虛脾胃肌肉虛弱而不收者內服陳氏木香散外用敗草散撒之。

管氏曰治天氣寒涼而失蓋覆其瘡受凍而痘不收者用桂枝

解毒湯治天熱之痘被蒸而痘不收者用甘露解毒湯

乘六曰丁卯春痘風大行至收靨時多延遲日久而不收歛者

他人俱不能治余用家傳糖芍散服一副通身盡靨所治者無

不應手而愈也

五積散 白芷_三 桔梗_二 川芎_三 白芍 茯苓 炙草_三 當歸

桂枝 半夏_三 陳皮 枳殼 麻黃_半 蒼朮_小 厚朴_半 除桂

枝只壳外十二味俱用慢火炒成黃色生薑為引

五苓散 白朮 茯苓 猪苓 澤瀉 桂枝 不用引

天水散 一名六一散 滑石_六 甘草_一 面研勻

三黃丸 大黃 黃芩 黃連 酒切 共為面糊為丸 珠砂為衣

四順飲 大黃 白芍 當歸 甘草 不用引

人參白朮散 人參 白朮 茯苓 吳草 藿香 廣木香

葛根 生姜引

陳氏十一味木香散 方見己集泄瀉門

桂枝解毒湯 猪苓 澤瀉 麥冬 骨皮 木通 黃芩

連壳 桂枝 甘草

甘露解毒湯 骨皮 麥冬 牛子 連壳 猪苓 澤瀉

石王 黃芩 大黃 酒 生地黃汁 掺入黃酒 紫草 甘草

家傳糖芍散 白芍 水煎湯入白糖 調服 移時即瀉