

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷九十



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

證治準繩

卷九

痢

痢疾

肝

胃

寶

明

王肯堂

撰

瀉水瀉積瀉驚瀉風瀉

腹寒瀉利和醅瀉利和利不同各分於後 冷瀉多是

欽定四庫全書

證治準繩

一

白水瀉密而少腹痛而鳴眉皺目慢面帶白色額有汗

多用冲和飲慢驚當歸散潮熱合和水喂薑煎服并守中湯

本條參苓白朮散不乳食益中膏本條沉香檳榔丸不乳食治之

熱瀉大便黃色如同弔水瀉過即止半日復然心煩

口渴小便黃少食乳必麤先用五苓散驚或大順飲吐

次以錢氏白朮散渴主之香薷散吐瀉亦佳傷食瀉乃

脾胃素弱復為生冷果食所傷故大便不聚而瀉或因

乳母餐生冷肥膩之物自乳而過亦能作瀉面唇俱白

瀉稀而少或如壞雞子腥臭異常身形黃瘦宜先溫正

胃氣次理積而後固脾冲和飲慢驚當歸散潮熱合和水煨

薑棗子煎服理積兒大者烏犀丸吐小者化癖丸癖三

稜散宿食固脾和中散吐瀉醒脾散慢驚水瀉謂之洞泄乃

陰陽不順米穀不分瀉黃水而小便少番次密而無度

是夏秋之際晝則解衣取涼夜則失蓋感冷冷熱相激

清濁渾亂或因母自熱中來乳有熱氣遽以哺之令兒

脾胃不和水穀交雜而下以呔咀五苓散驚加薏苡仁

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

車前子半夏水薑煎服分正陰陽或先用大順飲吐溫

白湯調下香薷散吐調中止補錢氏白木散渴六和湯

吐亦好 積瀉脾氣虛弱乳食入胃不能運化積滯日

久再為冷食所傷傳之大腸遂成泄瀉留連不止諸藥

無効蓋以積在脾胃積既未除何由得愈宜先去積後

止瀉瀉止實脾則病除矣三稜散宿食烏犀丸吐續用沉

香檳榔丸不乳食參苓白朮散慢驚和中散吐瀉香橘餅本調條

理 驚瀉糞青如苔稠若膠粘不可便止但鎮心抑肝

和脾胃消乳食斯為治法先投五苓散驚次用三稜散

宿食水薑倉米煎服或三解散潮熱神麴生薑煎湯調服及

沉香檳榔丸

不乳食

不驚丹

驚

調治

風瀉慢驚大病後

有之其糞稀黃褐色或夾不消乳食同下此因脾虛所

致或夾黑褐色者屬腎蓋脾虛為腎水所乘故也若久

不進飲食再有驚搐宜疎腎水去脾風次補脾則自愈

庶無復作之患疎腎水呔咀五苓散

驚

加黑牽牛半生

半炒并薏苡仁水薑煎服去脾風瀉黃散

脾

調脾氣參

苓白水散

食不乳

臟寒瀉糞如青竹色不稀不稠或下

青水未瀉時腹痛而鳴呌哭方瀉多是生來三五月內

有此周歲則無始因斷臍帶短風冷自外逼內而成此

疾先用冲和飲

慢驚

水葱白煎投溫中解表次以當歸散

潮熱水煨薑煎服及投勻氣散

症

理中湯

吐瀉

疳積釀瀉

其候面色痿黃肚脹脚弱頭大項小髮稀且豎肌肉消
瘦不思飲食晝涼夜熱或腹內有癥瘕氣塊瀉則顏色
不等其臭異常其瀉有時或一月半月旬日一番自瀉

自止名為疳積釀瀉先以當歸散潮熱加以三稜陳皮水

薑煎服次投烏犀丸吐沉香檳榔丸不乳食及化癖丸癖

蘆薈丸疳沒石子丸本條兒最小者難下丸子止投三稜

散宿食快膈湯痞自然全愈若瀉或痢色青甚而淡黃

夾白寒多熱少此陰邪勝陽宜用守中湯胃苓湯俱本條

與服扶表救裏方進當歸散潮熱加陳皮紫蘇水薑糯米

煎服亦宜和解理中湯吐瀉清米飲空心調服溫脾去濕

益氣清神寒盛者理中湯內加熟附子水薑棗煎服次

投南星腹皮飲水薑煎服和脾胃去陰邪 若瀉或泄
色青淡而有沫黃稠熱多寒少亦致面黃肌瘦煩躁不
寧宜以呔咀五苓散加薏苡仁車前子水薑煎服解散
餘邪仍用茵陳蒿梔子仁煎湯調細末五苓散溫服退
黃色消陽毒及當歸散水薑棗煎投或服萬安飲積熱四
神丸

養生治大小老虛之人不拘冷熱泄瀉 黃連去鬚白芍

藥

並剉
如豆

吳茱萸

各十
兩

右三味釜內慢火炒赤色放冷杵羅為細末每服三錢七水一盞半煎至八九分去滓空腹食前溫服日三四服小兒量與或以水浸蒸餅丸如桐子大更丸一等如萊豆黃米大小兒每服十五丸至二十九丸溫米飲下若作散以沸湯或溫米飲調下並可服病泄痢之人若不禁生冷魚肉肥膩與不服藥同 一方有木香無芍藥醋糊丸

茅先生香連丸

治瀉利

木香

黃連

茅莢半兩同於釧內炒令

煙起取出
去茱萸

肉豆蔻

訶子

炮去核
各半兩

阿膠

麩炒

朱砂

各一

錢

右為細末軟飯為丸如桐子大每服十九十四丸用

飯飲吞下兒小碎之

乳香散

治一切瀉痢

乳香

二錢用荷葉於炭火上
炙令半鎔放地上揅蓋

另研肉豆蔻

白薑

甘草

炙草菓子

各一兩

右細剉用醋麩裹於熱灰內煨令赤色取出去麩為

末入乳香末拌勻每服半錢一錢陳米飯飲調下

冷瀉薛湯氏云冷瀉者乃脾胃虛寒水穀不化而泄錢
仲陽云小兒不能食乳瀉褐色身冷無陽也當用益黃
散脾加減治之大便清白口不煩渴冷積瀉也理中湯
吐瀉主之若口鼻吸風寒之氣脾胃受生冷之食而作者
先用理中湯後用異功散命門火衰不能溫蒸中州之
氣故脾胃虛寒者用益黃散及八味丸腎脾胃虛弱者
五味異功散吐瀉脾氣下陷者補中益氣湯虛熱脾氣虛寒
者人參理中湯寒水侮土者益黃散肝木乘脾者四君

柴胡散手足並冷者加木香乾薑治者審之 百問云

冷積瀉沒石子丸極効人參散吐理中湯吐瀉加減服尤

佳更加肉豆蔻則止來復丹大科中暑不換金正氣散吐瀉皆

可觀音散吐瀉銀白散加減調治乃平和之劑也

守中湯 理春夏相交陰濕氣重中傷脾胃致腹痛泄

利經久不止漸傳手足浮腫飲食少思 桔梗去芦對炒

蒼木米泔水浸一宿去麁皮濾乾剉片炒微黃色各二兩白薑四錢炮甘草六錢

炙

右件剉焙為末每服一錢空心沸湯調服吐咀水煎亦可或用薑棗

沒石子丸 治嬰孩先因冷瀉或作赤白痢候久而變

作諸般異色不止一端外證面或青或白唇舌乾焦

手微冷渾身溫壯肚內刺痛啼叫睡卧不安若有是

候當服 沒石子 木香 黃連 當歸 青皮

各二

錢半

右五味為末阿魏一分酒半盞浸化入麪少許令勻

煮糊為丸如粟米大一二歲兒服如椒自大者四五
六歲兒服每服五十九赤痢甘草湯下白痢乾薑湯
下或五倍子湯下

張渙川椒丸 治小兒夏傷濕冷入腸胃泄瀉不止

川椒

一兩去閉目雙者并黑子揀淨慢火炒香熟為度

肉豆蔻

半兩

右件搗羅為細末粳米飯和圓如黍米大每服十粒
米飲下量兒大小加減

粟煎湯 治腸胃受風令泄注不止身體壯熱 白朮

炮當歸洗焙 川芎 人參去芦 肉桂 芍藥各一兩

右件搗羅為細末每服一錢水一小盞入生薑三片粟米一匙頭許煎至五分粟米熟去滓放溫服

溫中丸 治胃寒瀉白腹痛腸鳴方見吐瀉

孔氏治藏府不調大便青色 白朮 人參 茯苓各一

錢甘草炙半錢

右末一錢水一小盞煎七分溫服

丹溪云瀉青亦是寒宜用蘇合香丸平胃散各等分蜜