

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百四十一



南京中医药大学图书馆版权所有

普濟方卷

周王朱楠撰

治傷寒心腹脹痛

治傷寒心腹脹痛

治傷寒心腹脹痛

治傷寒心腹脹痛

治傷寒心腹脹痛

朋久冷因染斯疾未得

水傷於心脾動於風冷

後不解內外有熱亦

小腹痛滿者以手按之硬者實也歌曰腹痛腎兮通脈湯

肺兼表症桂加黃實痰便結虛痢利脹則陳皮梗下良
又論云邪在裏陽邪入裏與正氣搏則為腹痛所以痛
者有異焉脈實腹痛滿大閉者實痛也脈虛腸鳴而大
便泄者虛痛也陰陽異症用藥不同大抵痛為邪氣實法
當疎利陰受病則只宜用養正丹輩溫而利之少陰腹
痛四逆或欬或悸或小便不利或泄利下重四逆散下
利清穀脈微欲絕通脈四逆湯腹痛小便不利用真武
湯誤下太陽因而腹滿時痛是有表復有裏為太陰太

陽俱病用桂枝芍藥湯痛甚桂枝加大黃湯實痛者關
脈實煩燥腹滿大便閉結桂枝加大黃湯小承氣湯胸
中熱胃中邪氣腹痛欲嘔吐則用黃連湯虛痛者寸脈
濡尺脈閉腸鳴泄利先與小建中湯不瘥小柴胡去黃
芩加芍藥投之間用建中湯加遠志腹中冷痛四肢厥逆
用薑附湯腹脹者陰陽不和也桔梗半夏湯最良活人
書云本太陽病醫反下之因而腹滿時痛病有表有裏
仲景所以用桂枝加芍藥湯主之痛甚者加大黃桂枝

加芍藥即是小建中也太陰脈弱自利設當行大黃芍藥者宜減之其人胃虛陽氣易動故也下利者先煎芍藥十餘沸難經云痛為實大抵痛宜下仲景云發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯又曰腹中滿痛此為實當下之屬大柴胡湯腹痛有二症有熱痛有冷痛尺脈弦腸鳴泄利而痛者冷痛也小建中湯主之仲景云陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛先與小建中湯不瘥者與小柴胡湯小柴胡去黃芩加芍藥陰症腹痛即四逆

散通脉四逆加芍藥腹小便不利者真武湯也關脉實
腹滿大便閉澀按而痛者實痛也桂枝加大黃湯黃連
湯大承氣湯主之又有腹脹滿者何也陰陽不和也桔
梗半夏湯最良仲景論太陽症發汗復腹脹滿者厚朴
生薑半夏甘草人參湯下後心煩腹滿卧起不安者梔
子厚朴湯吐後腹脹滿者與調胃承氣湯少陰病六七
日腹脹不大便者急下之宜承氣湯也

方

厚朴散

出聖惠方

治傷寒因有熱服冷藥過度心腹脹痛

厚朴

去粗皮塗生姜汁炙令香熟一兩

當歸

剉微炒

枳殼

麤炒微炙去穢

木

香

大腹皮

剉各半兩

訶梨勒

煨用皮一兩

右粗搗篩每服四錢水一中盞入生薑半分煎六分

去滓不計時候稍熱服

木香散

出聖惠方

治傷寒冷氣積在腹中脹滿疼痛

木香

枳殼

麤炒微炙去穢

柴胡

去苗

當歸

剉微炒各三分

乾薑

炮製

剉半兩

吳茱萸

湯浸七遍焙乾微炒一分

右粗搗篩每服三錢水一中盞入棗三枚煎六分去

滓稍熟不計時候服一方吳茱萸用生薑半分同

煎

桃仁散

出聖惠方

治傷寒心腹脹滿疼痛

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

枳殼

麩炒微黃去穢

神麴

炒令微黃

麥蘖

炒令微黃各三分

桂心

白朮

各一兩

右為粗散每服三錢水一中盞煎六分去滓稍熟不

計時服之

當歸散

出聖惠方

治傷寒脾胃虛心腹脹痛不思飲食

當歸

劉微炒

乾薑

炮製劉各半兩

桂心

芍藥

陳皮

湯浸去白

穠

枳榔

焙兩各一

右為散每服三錢以水一中盞煎六分去滓稍熱不

計時候服

赤芍藥散

出聖惠方

治傷寒脾胃氣滯心腹脹痛不欲飲食

赤芍藥

訶梨勒

煨用皮

當歸

劉微炒

肉苳蔻

去殼

人參

去蘆頭

郁李仁

湯洗去皮尖微炒

桂心

各三分

陳橘皮

湯浸去白穠焙

檳榔 各一兩

右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎六分去

滓不計時候溫服

柴胡散

出聖惠方

治傷寒發汗氣壅不散攻心脹痛

柴胡

去苗

黃芩

赤芍藥

檳榔

各三分

枳殼

麤炒微黃去穢

半夏

湯洗七遍去滑

大腹皮

剉

木香

各半兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎六分

去滓不計時候溫服

赤茯苓散

出聖惠方

治傷寒卒心腹痛脹滿不下飲食

赤茯苓

桔梗

去蘆頭

陳橘皮

湯浸

人參

半兩去蘆頭

檳榔

三分

右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎六分去

滓稍熱不計時候服

大黃丸

出聖惠方

治傷寒大腸氣壅心腹脹滿疼痛四肢骨

節酸疼煩悶不得眠卧

川大黃

一兩剉碎微炒

木香

桂心

甘草

炙微赤剉各一分

枳

殼

麩炒微黃去穢

檳榔

各半兩

郁李仁

三分湯浸去皮尖微炒

右為末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服不

計時候以溫酒服下三十丸以利為度

治傷寒冷氣攻心腹脹滿疼痛不下飲食方

出聖惠方

木香 赤芍藥 厚朴

去粗皮生薑汁炙令香熟各三分

甘草

一分

炒微赤剉

吳茱萸

湯浸七遍焙乾微炒

桂心

乾薑

炮製剉

白朮

青橘皮

湯浸去白穢焙各半兩

右為散每服四錢以水一中盞入棗三枚煎六分去

滓不計時候稍熱服

半夏散

出聖惠方

治傷寒心腹脹滿疼痛胸膈壅滯或嘔噦

不能飲食宜服

半夏

湯洗七遍去滑

前胡

去蘆頭

訶梨勒皮

赤芍藥

人

參

去蘆頭各三分

桂心

木香

枳榔

各半兩

陳橘皮

一兩湯浸

去白

穰

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎六分

去滓稍熱不計時候服

厚朴散

出聖惠方

治傷寒汗後腹脹疼痛

厚朴

二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

川大黃

剉碎微炒

人參

去蘆頭各一兩

芍藥

赤芍藥

陳橘皮

湯浸去白穢各三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎六分

去滓稍熱不計時候服

桃仁湯

出聖濟總錄

治傷寒後心腹脹痛

桃仁

湯浸去皮尖雙仁炒令黃

陳麴

炒

大麥蘖

炒

桑皮

各一兩

白

朮

桂

去粗皮各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎半盞去滓食前溫服

烏藥散 治厥陰病脇脹引小腹而痛者此為疝也

烏藥 茴香 青皮 赤豆

各一兩

乾漆 沒藥

各二

兩 硃砂 滑石 高良薑

各一兩

右除硃砂別入搗篩為散取一盞溫酒或白飲和服

仍以鈴按伏之患釋

柴胡芍藥湯

出聖濟總錄

治傷寒發汗後邪熱不除腹脇脹

痛

柴胡

去苗

芍藥

黃芩

去黑心 各三分

大腹皮

半夏

湯洗 去滑

炒枳殼

去穰 炒 各半兩

檳榔

剉一分

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑半分拍碎同煎
至半盞去滓溫服又治傷寒發汗惡氣心腹脹滿
以薄荷煮汁服大解利之

傷寒厥逆

論

夫傷寒病手足逆冷其名曰厥此因陽氣衰陰氣盛陰
盛則陽脈逆而不通于四肢所以逆冷其症令人惡寒

不飲水下利清穀或清便自調或小便數症默靜是其
候也宜溫之灸之若灸之而手足不溫者為難治然厥
亦有熱厥者先發熱而後厥熱深厥亦深熱微厥亦微
脈雖沈伏按之當滑若或畏熱或飲水揚手擲足煩躁
不得眠大便閉小便赤外症昏憤者雖厥不可溫也宜
下之 陰陽相乘而生寒熱厥者脈症似同而大異寒
厥者初得之四肢冷脈沈微而不數多惡寒引衣自覆
下利清穀外症多惺熱厥者初得之必發熱頭疼脈雖