

痧脹玉衡書卷之下

稿李郭志遠右陶著

霍亂痧

痛而不吐瀉者名乾霍亂。毒入血分宜放痧。新食宜吐久食宜消。食消下結宜攻。痛而吐瀉者毒入氣分宜刮痧不愈視有痧筋則放宜調其陰陽之炁爲主。須知腸胃食積宜驅不宜止。止則益痛。若吐瀉而後痛者此因瀉糞穢氣所觸治宜略用藿香。冷飲正氣。然必須防食積血滯或消或攻或活血。山藥茯苓不

可亂施。燥濕之劑。俱在所禁。溫煖之藥。未可亂投。

治驗

一沈篆玉九月間乾霍亂腹中盤腸大痛放痧三十餘針。又王君先爲之刮痧不愈。余用寶花散加大黃丸。清茶稍冷飲之而痊。

一彭君明晚間腹中大痛吐瀉數十次痛益甚。延余診之。左脈扎而滑。右脈弦細而瀉。此宿食已從吐瀉而盡。乃毒入血分。血瘀作痛也。放痧不愈。用獨活紅花湯。圓紅散。微溫飲之。吐瀉腹痛少愈。次

白服前藥吐瀉腹痛俱已

一童敬橋內室吐瀉腹痛自刮痧服陰陽水痛益甚。余用三香丸微冷飲之而安

絞痛痧

心腹絞絞大痛。或如板硬。伐如繩轉。或如筋弔。或如錐觸。或如刀割。痛極難忍。輕者亦微微絞痛。脹悶非常。放痧可愈。若不愈。必審脉症。何因辨暑穢食積痰血所阻。施治須連進數服。俟其少安。方可漸爲調理。此症世多放痧數次不愈。聽命於天。不肯服藥。遂至

痧毒攻壞臟腑。惟死而已。惜哉。

治驗

一廉齋朱先生夫人夏月痧痛危急。刮痧放痧不愈。更易三醫。莫敢任事。舉家無措。宋臣王兄邀余往視。六脈微伏。治之未愈。其晚絞痛如前。明晨賢郎宗伊兄復邀余。右手脈伏。更放痧三十二針。兼刮痧。訖用寶花散沉香丸。清茶稍冷飲之。併用散痧解毒活血順氣之劑。親友尙恐無救。畱余俟飯後。坦君雲夏王兄曰。睡矣。何如。余曰。睡則神情已

定氣血漸和殆將安。越翼日乃瘳。

一賈公清作瀉腹痛如繩絞。延余脈洪大數實。放痧不愈。用烏藥順氣湯加大黃下積而痊。

一故友麓庵朱兄夫人公範母也。口吐痰涎。腹中絞痛。醫治沉重。六日不愈。延余診之。左脈微伏。余曰：「痧也。」令刮之。少安。用藥不服。次日復昏沉大痛。舉家驚惶。親戚填門。復延余刺左中指一針。出毒血。兼令刮痧。不愈。用降香、桃花散、衝砂仁湯微冷送下。併用防風散痧湯加山荳根、茜草、丹參、金銀

花山查。葡萄子。稍冷服而安。

一何君雅子。正月盤腸絞痛。延余。脈伏冷。刮痧。用沉香。鬱金。散。稜木湯。冷飲之。稍愈。黃昏時復絞痛。非常斗喊不已。復邀余。用細辛。大黃。九。清茶。微冷飲之。又用紫朴湯而痊。

脇痛痧

痧症。不忌食物。痧毒。裹食。結成痧塊。於脇而痛。其痧塊。變症甚多。故爲難治。且治痧。惟在初發。若不識。或飲熱湯。毒血凝結。卽慢痧。不至脹急。傷人。亦成脇痛。

痧之日久勢必難散

治驗

一朱子佩夫人身熱吐痰脇痛飲圓湯益喘嘔不已延余左脈洪數右脈似伏余曰痧也子佩刺其腿灣痧筋二針不愈服童便喘嘔稍減余用阿魏丸六黃丸白湯微冷下身熱吐痰俱已又用必勝湯微冷下三服而痊

一王養初子佩母舅也吐痰脇痛悞吃圓肉放痧數次日久不愈延余診之余辭不治以痧毒裹圓

結成痧塊不可解耳。況日久攻壞臟腑。雖藥無益。後易數醫。變喉旁發腫而歿。

痧痢

夏傷於暑。秋必瘧痢。痢疾初發。必先泄瀉。腸胃泄瀉。必致空虛。內虛則易感觸穢惡之氣。卽成痧痛。或天氣炎熱時。行疫癘。感動腸胃。因積而發。亦致痧痛。夫痢不兼痧。積去之後。便可得痊。卽甚凶極。藥無不效。若一兼痧。勢必絞痛異常。止治其痢。用藥無效。或變痢如豬肝色。或變痢如屋漏水。或變痢惟血紅水。或

變噤口不食。嘔噦凶危。或變休息久痢。歲月綿延。常
苦痢患。余惟先治其痧。兼治其積。則痧消而積易去。
積去而痧可清。凡遇痢疾。如此治之。無不奏功。誠爲
良法。

治驗

一曾奉先七月間發熱。下痢血水。日百餘次。肛門
急迫。腹痛異常。嘔噦不食。延余治之。六脈遲數。不
常。或時歇。指此痧痢也。刮痧放痧。訖痛乃減。半用
沉香阿魏丸。砂仁湯稍冷飲之。用當歸山查紅花

枳實赤芍澤蘭青皮葡萄子枳櫚各一錢熟大黃五分加童便一鍾稍冷飲二服痢下赤白甚多諸症俱愈

一余弟驤武下赤白痢日數十餘次腹中大痛大便窘迫余診之六脈微細放痧二十針又刮痧不愈用寶花散沉香阿魏丸稍冷湯飲之腹痛漸寧用當歸山查陳皮枳櫚紅花烏藥各一錢熟大黃八分加童便飲之赤白俱下痛亦漸安後用當歸一兩山查二錢服之赤白痢全愈

一奚仲嘉內室。腹中絞痛。喘急氣逆。余診六脈無根。此痧脈也。放痧不愈。用沉香阿魏丸。砂仁煎湯。稍冷飲之。痛遂止。次日小腹痛。頻下痢。赤白。用當歸金銀花青皮陳皮烏藥山查。葡萄子。加童便稍冷飲之。漸希。用當歸一兩。服四劑而愈。

一吳瑞雲發熱。脹悶沉重。放痧後。痢下紫血。他醫以痧氣已清。但治其痢。勢在危篤。舉家驚惶。延余六脈洪大不勻。此痧氣未清。痧毒尚盛也。令刮痧。訖用當歸枳殼湯入童便冷飲之。次以蘇木紅花。

五靈脂茜草烏藥香附當歸赤芍以熯其痧乃安
後發餘毒於肛門邊出膿而愈

蛔結痧

痧毒攻胃故蛔死入於大腸與宿糞相結腹中大痛
是爲蛔結

治驗

一朱子佩女痧發痛極頭汗如雨延余診之脈芤
而洪實放痧不出刮痧不起用細辛大黃丸微冷
服又用荊芥銀花湯稍冷服又三日痧筋乃現放

之服藥如前腹痛不止至十九日日用藥加大黃
大便下死蛔三條結糞亦下痛尤不止又現痧筋
放之服前藥乃愈

頭痛痧

痧毒中於臟腑之氣閉塞不通上攻三陽巔頂故痛
人腦髓發暈沉重不省人事名真頭痛朝發夕死夕
發旦死急刺破巔頂出毒血以泄其氣藥性破其毒
氣清其臟腑爲主。痧毒中於臟腑之血壅瘀不流上
衝三陽頭面肌肉故肌肉腫脹目閉耳塞心胸煩悶。

急刺破巔頂及諸青筋出毒血。藥宜清其血分。破其壅阻爲要。

治驗

一。張顯如頭痛。發暈沉重。六脈俱伏。刺巔頂一針。餘痧筋俱刺。少甦。復診其脈沉寔。而上魚際用清氣化痰飲。冷服而安。

一。汪路真內室。頭面紅腫。發熱頭痛。心胸迷悶。診脈芤而疾。刺左腿灣三針。血流如注。冷服紅花膏。子半盃。用蒲黃飲三劑而痊。

心痛痧

痧毒衝心。屬之於氣。則時痛時止。痰涎壅盛。昏迷煩悶。此其候也。治宜刺手臂。服順氣之劑。爲主。痧毒攻心。屬之於血。則大痛不已。昏沉不醒。此其候也。治宜刺腿灣。服活血之劑。爲主。遲則難救。

治驗

一鄭延旦。次子心中暴痛。口吐痰涎。迷悶不能出聲。延余兩寸沉而伏。關尺洪而緊。刺痧筋二十針。用烏藥順氣湯。冷飲四劑而安。

一嚴瑞宇三女。飯時心中暴痛昏沉不醒。日暮延余。六脈已絕。辭之。次日而殂。

腰痛痧

痧毒入腎。則腰痛不能俛仰。若悞飲熱湯熱酒。必然煩躁昏迷。手足塌擗。舌短耳聾。垂斃而已。

治驗

一黃敬宇內室。腰中大痛。強硬如板。悞飲熱酒。發熱煩躁昏沉。痰湧延余。左尺虛微。右尺洪實。脈兼歇指。痧中於腎也。刺腿灣痧筋。僅有紫黑血點不