

葉案疏證

求恆室醫學叢書之一

上

葉案疏證

葉
登

中 華 民 國 二 十 六 年
上 海 求 恆 醫 社 藏 版

自序

葉天士先生。生於康熙。歿於乾隆。身歷三朝。名聞九域。其生平所製方案。爲後人收取。萃錄成編者甚多。至醫案存真一書。非從外間收集。乃其家傳之本。必爲當時臨診實驗。獲效之方。留示後人者。故較臨症指南等書。爲可貴。且其案中。對於悞治。及疑難夾雜之處。均一一點出。其所用之藥。亦無奇異難求之品。隨症立方。不違法。不泥法。神明於規矩之中。而救應不窮。師其意以治人。均能應手奏效。故余於方案中。有心領神會者。逐條採錄。簡鍊揣摩。積成百案。爲之發揮疏證。有奧妙難明者。必反覆討論。務使疑義明晰。開卷了然。而後已。因此不敢自祕。刊以問世。愚人一得之言。或足爲後學啓牖發蒙之一助云爾。

松江求恆室主李林馥啓賢氏誌

凡例

一是本所採方案悉本葉氏醫案存真他書所載者概不收錄

一醫案文字悉照原本不加改革

一所採醫案均係平時閱讀有會意於心者即加疏證或有三四讀後方知其妙處而採取者故對於原本間有先後移易之處

一葉氏醫案向不圈點今將其緊策之處特爲圈點使閱讀時格外注意

一葉氏醫案內方法甚多茲特取其複雜難治者併成百法以爲臨床之一助

一此係鄙人自己採取閱讀之本隨意疏證非敢妄冀傳世謬附作家或有未是之處希閱者原宥

一此後讀葉氏醫案如再有心得尙擬續出

54

葉案疏證上冊目錄

寒熱互用法.....一

一再悞治見症治症法.....一

補火健脾法.....二

氣虛經阻治法.....二

瀉通互用法.....三

精濁固下法.....四

土敗金枯治法.....四

益氣生陰法.....五

閃氣致變治法.....五

中焦虛損治法.....六

溫腎涼肝治法.....七

溫養元海治法.....七

脾陽不運治法.....八

疎腑養臟治法.....九

勞祛治法.....一〇

清熱存陰治法.....一一

勞倦伏邪悞治救逆法.....一二

伏暑失治內侵調治法.....一三

感受穢濁神昏治法.....一五

濕熱阻塞氣分治法.....一五

清潤通絡法·····	一六
春溫下利治法·····	一七
溫熱虛症治法·····	一八
溫病正治法·····	一九
體虛陽明證治法·····	二〇
濕着丹疹治法·····	二一
溫氣遏伏治法·····	二二
甘寒養胃法·····	二三
勞熱內迫調治法·····	二四
和陽存陰法·····	二五
急救胃陰法·····	二五
時疫濕溫治法·····	二六

輕清滲濕法·····	二六
濕溫久病攻補法·····	二七
肝木乘脾虛實互治法·····	二八
通陽潤燥病中調治法·····	二八
上膈宣陽調治法·····	二九
下焦調理法·····	二九
辛甘化風調理法·····	三〇
潤燥通幽調治法·····	三〇
溫填通陽上下兩顧調治法·····	三一
濕熱大病之無上妙治法·····	三一
濕結氣分治法·····	三三
二虛一實偏治法·····	三三

冬溫病治法·····	三五
冬溫病鹹降理逆法·····	三六
養胃供肺法·····	三七
失血勞傷法·····	三八
四日瘧疾調治法·····	三八
消中證治法·····	三九

葉案疏證

笑

李啓賢編次評論
三男應昌校字

寒溫互用法

通下。下通。脘中仍結。上下格拒者。乃上熱下寒。古人用麻沸湯。煮涼藥以解上。濃煎溫補以治下。使陽氣不脫。鬱熱自罷。今倣之。

黃芩

小川連

枳實

右三味入滾水中煮五十沸即濾

人參

淡附子

乾薑

上三味煎濃汁一盃和入前藥服

(疏)案中開手用通下二字。則前醫已用過下藥可知。下通則結熱當去。而脘中仍結者。則非胃家實。爲不當下而下後之痞象。其所以上下格拒者。乃上之結熱。因悞下而未去。而下之虛寒。因悞下而愈甚也。此等底面不和之病。治之實難。得此方案。益人非淺。(證)黃芩、川連均屬苦寒瀉火。枳實下氣消痰而利胸膈。所以入滾水煮。蓋苦寒之品。留

滯居多。破瀉之藥。眞陽有損。滾水能助陽氣。通經絡。使苦寒者不滯。破瀉者無傷耳。至下三味。而用人參者。因通下下通。正氣必虧。入附子。則能引補氣藥。以收散失之元陽。壯命門火。以逐下焦之虛寒。加乾薑者。開五臟六腑。通四肢關節。使上下無隔拒之患。煎濃汁者。恐因附子之走而上浮也。此等方。此等法。今人能用之者鮮矣。

一再悞治見症治症法

今年七月。秋暑未除。初病頭痛身熱。是暑由上竅傷及清陽。醫藥當辛涼。取氣同氣相求。中上之輕邪自散。無如辛溫苦寒清滋之類。雜然並投。水穀內蒸。氤氳不解。見症仍在身半以上。軀殼之間。非關臟腑大病。第能蔬食十日。可解上焦之鬱。

川芎

薄荷

荊芥炭

炒白芷

蔓荊子

菊花蒂

元茶三錢

煎湯代水

（疏）此等方案。學者最宜潛思玩索。蓋暑病理宜辛涼調治。而醫者乃以辛溫解表。苦寒清裏治之。後醫見前方之不愈也。乃又因其脈虛身熱之故。疑爲陰虛。投以清滋之品。一

悞之後。加以再悞。而其病尙在身半以上。軀殼之間者。必其人體質健全。臟腑堅固。否則未有不傳變者也。至蔬食十日。其法甚妙。蓋清滋之類。結滯于胸中者。可以不消而自去矣。此案第一段。揭明病源。第二段。暑病正治之法。第三段。說明悞治之故。第四段。言證之未變。第五段。以飲食消息悞治之弊。節節相因。秩然不亂。豈後之人所能望其項背者耶。
(證) 川芎性雖辛溫。潤而不燥。升清陽而開諸鬱。爲頭痛必用之藥。薄荷辛能散。涼能清。升浮能發汗。爲夏令宣散風寒之佳品。荊芥炭去血中之風邪。熱消結散。炒白芷散陽明之風溼。兼除頭痛。蔓荊子味苦辛平。輕浮升散。能散上部之氣。甘菊花味甘性寒。平肝疏肺。清上焦之熱。以上皆散風化熱。輕解上焦之品。所以用元茶三錢煎湯代水者。蓋茶能蠲除上焦鬱熱垢膩。除痰化食也。

補火健脾法

胃主納。脾主運。能食不化。泄瀉治在太陰脾。臟此臟爲柔臟。陽動則能運。凡陰藥取味皆靜。歸地之屬。反助病矣。

淡附子

淡乾薑

生益智

生砂仁

人參

茯苓

(疏)胃爲陽臟。脾爲陰臟。胃失其養則不納。脾失其運則不化。今能食則胃無病。不化則脾不運也。泄瀉者。非脾虛之濕滯。乃火化之不足耳。所以不用專補脾家之正藥。而以四逆湯之薑附爲君也。補脾之法不一。讀陽動則能運一句。後天之治法。足以盡之矣。

(證)附子辛甘大熱。走而不守。乾薑辛熱。開胃和脾。消食去滯。益智辛熱。燥脾胃。補心氣。命門。砂仁辛溫香竄。悅脾快氣。人參補氣。氣壯而胃自開。氣和而食自化。茯苓甘平益脾。寧心滲濕。此方以薑附益智。補火化土。以砂仁醒脾。以人參補氣。以茯苓滲濕下交。則脾安有不運。食安有不化。而泄瀉安有不止者耶。

氣虛經阻治法

形壯色白。氣虛有痰。痰阻經絡。氣血不通。經事三年不來。古人治此。必以調氣爲先。蓋氣爲血帥也。見病治病。終亦無裨。

生台朮

茯苓塊

香附

砂仁

蒺藜

製半夏 淡水熬膏。臨好。以文火燉收。清晨開水調服。

(疏)形壯者痰必多。氣虛者色必白。氣虛有痰。爲是病之本。于何知之。于形壯色白知之。然痰多者必阻滯。而或阻于上。或阻于下。或阻于裏。或阻于表。謂其阻于經絡。于何知之。于經事不來知之。蓋經事三年不來。苟其人爲血病。則必有癥結肚痛。腹膨身腫等病矣。今則形壯色白。別無他病。其爲氣虛而血不通行。痰多而經絡阻滯可知。案無數語。而審慎周詳如此。豈後之婦科。開手卽去瘀生新者所能夢見者耶。學者于此等方案。當三致意焉。

(證)白朮爲脾家正藥。脾失健運。氣血必虛。故以此補之。化痰益氣。則用痰藜。化痰理氣。則用半夏。化痰利水。則用茯苓。以砂仁之運氣消食醒其脾。以香附之通行經絡去其滯。方雖六味。實開婦科調經之一大法門。所以用淡水煮者。取其味之正。所以用開水沖者。取其補原氣而行經絡也。

濇通互用法