

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷四十七



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩

傷寒

胃

下

疝氣也然曰疝發於臍惡寒者及下之熱入因作結胸

明 王肯堂 撰

證治準繩

欽定四庫全書

一

病發於陰

無熱而惡寒者

反下之因作痞所以成結胸者下之

太早也蓋表當汗反下之裏之正氣為下所損則表之全熱乘虛入裏結於心下為結胸也裏之陰分已受邪熱為病是謂發於陰也或熱微下證未全不任轉瀉而反下之則裏之微熱雖除而表之熱邪又至雖不結胸亦成痞也小結胸輕於大結胸而重於痞也由誤之大小非以痞為寒也經謂但結胸無大發熱證為寒實結胸誠非寒也但熱微甚爾及夫臟結者經為熱結於臟

則為病深故云難治若用涼劑而亦有生又陽結者熱結於府則微而淺也又留飲不散而成頭汗脈沈潛及附骨者積飲成水結胸也又有不因誤下而成結胸與痞者此又失下及夫反汗而成者也經謂熱已入裏久不攻之亦至結實名曰三死一生是失下也汗後熱氣傳入心下而痞者是失汗也結胸固知當下或脈浮大者又不可下下之則死是猶帶表邪未全結實故也又結胸證悉具加之煩躁者亦不治也夫藥所以能逐邪

者必待胃氣施布藥力始能溫汗吐下以逐其邪邪氣勝胃氣絕者安可為之

太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下因鞭則為結胸大陷胸湯主之

成動數皆陽脈也當責邪在表睡而汗出者謂之盜汗為邪氣在半表半裏則不惡寒此頭痛

發熱微盜汗出反惡寒者表未解也當發其汗醫反下之虛其胃氣表邪乘虛則陷邪在表則見陽脈邪在裏

則見陰脈邪氣內陷動數之脈所以變遲而浮脈獨不
變者以邪結胸中上焦陽結脈不得而沈也客氣者外
邪乘胃中空虛入裏結於胸膈膈中拒痛者客氣動膈
也金匱要畧曰短氣不足以息者實也短氣躁煩心中
懊懣皆邪熱為實陽氣內陷氣不得通於膈壅於心下
為鞭滿而痛成結胸也與大陷胸湯以下結熱 丹謹
按太陽病在表未曾解在表而攻裏可謂虛矣而況所
得之脈皆浮而動數乎今得誤下動數變遲矣而又曰
胃中空虛又曰短氣躁煩虛之甚矣借曰陽氣內陷心
下因鞭而可迅攻之乎豈大陷胸之力緩於承氣況已
下者不可再下寧不畏其虛乎上文曰結胸脈浮大者
不可下下者死又曰結胸證悉具煩躁者死今日脈浮
又曰煩躁大陷胸果可用乎彼陽病實下後若胃中空
虛客氣動膈心中懊懣者以梔子豉湯吐胸中之邪况
太陽失下後 傷寒六七日結胸熱實脈沈而緊心下
明有虛證乎

痛按之石鞭者大陷胸湯主之

上文既言病發於陽而反下之熱入因作結胸

則下文不必贅矣上文但言所致結胸之由至此則又發明結胸之脈與證也成註謂此不云下後而云傷寒六七日則是傳裏之實熱誤矣張經言所以成結胸者以下之太早故也此不云下後則云傷寒六七日結胸熱實此亦不因下早而結胸者何也夫下早結胸事之常熱實結胸事之變其熱實傳裏為結胸乃法之關防不盡者故仲景述其証以註方於其下也於此可見古人用心曲盡其妙且如下章以水結胸脇但頭汗出者以大陷胸湯主之亦在常法之外故條列其証以彰其理也亦或其人本虛或曾吐下而裏氣弱外邪因入故曰為結胸者也然所入之傷寒十餘日熱結在裏因不同其證治則一理而已

復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此為水

結在胸脇也但頭微汗出者大陷湯主之

成傷寒十餘日熱結在裏

是可下之證復往來寒熱為正邪分爭未全斂結與大柴胡湯下之但結胸無大熱者非熱結也是水飲結於胸脇謂之水結胸周身汗出者是水飲外散則愈若但頭微汗出餘處無汗是水飲不得外泄滯蓄而不行也與大陷胸湯以逐其水
活人云水結胸中
太陽病
半夏加茯苓湯小柴胡去牡蠣湯亦主之

重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷胸

湯主之

詳潮熱

大陷胸湯方

大黃

六兩去皮

芒硝

升一

甘遂

一錢為末

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓納芒硝煮一兩沸納甘遂末溫服一升得快利止後服

結胸由邪在胸中處身之高分宜若可吐然所謂結者諸陽受氣於胸中邪氣與陽氣相結不能分解氣不通壅於心下為鞭為痛是邪正固結於胸中非虛煩隔實之所同是須攻下可也低者舉之高者陷之以平為正結胸為高邪陷下以平之故曰陷胸湯也陷胸破結非苦寒直達者不能是以甘遂為君內經

曰鹹味湧泄為陰又曰鹹以熯之氣堅者以鹹熯熱
勝者以寒消是以芒硝鹹寒為臣蕩滌邪寇除去不
平將軍之功也陷胸滌熱是以大黃苦寒為使利藥
之中此駛劑也傷寒錯惡結胸為甚非此不能通利
劑大而數少須其迅速分解邪結也

丹此證經曰胃中空虛曰短氣躁煩曰脈浮此湯不
可輕用

小結胸病正在心下按之則痛脈浮滑者小陷胸湯主

之

上文云鞭滿而痛不可近者是不待按而亦痛也此云按之則痛是手按之然後作痛爾上文云至少腹

是通一腹而言之此云正在心下則少腹不鞭痛可知矣熱微於前故云小結胸也

小陷胸湯方

半夏

湯洗半升

黃連

一兩

枳實

大者一枚

右三味以水六升先煮枳實取三升去滓內諸藥煮

取二升去滓分溫三服

一服未和再服微解下黃涎便安也

苦以泄之辛以散之黃連枳實之苦寒以泄熱半夏之辛以散結

病在陽應以汗解之反以冷水噀之若灌之其熱被却

不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文

蛤散若不瘥者與五苓散

寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服

白散方

桔梗

貝母

各三分

巴豆

一分去皮心
熬黑研如脂

右三味為末納巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人半錢羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯假令汗出已腹中痛與芍藥二兩如上法

右熱實結胸及寒實結胸活人不拘寒熱但用陷胸

湯不瘥者用枳實理中丸應手而愈

結胸項亦強如柔莖狀下之則和宜大陷胸丸

大陷胸丸方

大黃

半斤

葶蘆

熬

芒硝

杏仁

去皮尖熬

黑各半斤

右四味搗篩二味內杏仁芒硝合研如脂和散取如

彈丸一枚別搗甘遂末一錢匕白蜜二合水二升煮

取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效

禁如藥法

海藏云

大陷胸湯

太陽入本藥也

大陷

胸

治熱實

胸丸陽明藥也小陷胸湯少陽藥也大陷胸治熱實

大陷胸丸兼喘小陷胸治痞

大黃芒硝之苦鹹所以下熱葶蘆杏仁之苦甘所以泄滿甘遂取其直達白蜜取其潤利皆以下泄滿實物也

心下滿痛如結胸狀若頭下強痛眩冒者刺大椎肝膈若汗下後頭項強痛發熱小便不利者桂枝去桂加茯苓

苓白朮湯

方論並見強項

太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脈微弱者此本有寒也反下之若利止必作結胸未止者四日復下

之此作協熱利也 太陽病下之脈浮者必結胸也

太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞭下利不止水

漿不下其人心煩 結胸證悉具煩躁者亦死 結胸

脈浮大不可下下之則死

張用藥如用兵知可而進知難而退此理勢之必然也夫

寸浮關沈乃結胸可下之脈今脈浮大心下雖結其表邪尚多未全結也若輒下之重虛其裏外邪復聚而必死矣仲景所以言此為戒使無踵其弊也其脈既不可攻當以候其變而待其實假如小結胸證其脈浮滑按之則痛故知邪非深結亦不敢下無過解除心下之熱耳小陷胸湯主之或又曰結胸倘有外證大陷胸還可用否予曰結胸無外證或有微熱或有小潮熱仲景已明言之其餘別無表證若有外證其邪亦未結實不

可以結胸論也經曰傷寒六七日發熱惡寒支節煩痛微嘔心下支結外證未除者柴胡加桂枝湯主之又傷寒六七日已發汗而復下胸脇微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之已上之證雖云心下支結及言胸脇滿微結二條俱有外證所以柴胡加桂及加桂薑以和解之如無外證止有胸腹結實而痛者方為結胸病也

附

活若誤下了初未成結胸者急頻與理中湯自然解了更不作結胸蓋理中湯治中焦故也此古人亦說不到後因人消息得之若大段轉損有厥證者無與四逆湯

便安胃中雖和傷寒未退者宜候日數足可下却以承氣再下之蓋前來下之未是故也

西晉崔行功云傷寒結胸欲絕心膈高起手不得近用大陷胸湯皆不瘥者此是下後虛逆氣已不理而毒復上攻氣毒相搏結於胸者當用枳實理中丸先理其氣次療諸疾古今用之如神

枳實理中丸方

枳實

十六片
麤炒

茯苓

人參

白朮

乾薑

炮

甘草

炙以上
各二兩

研為末煉蜜丸如雞子黃