

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷六十七



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

薛氏醫案

肺經

肺經

明薛已訂

肺經

薛氏醫案

一

症惡風咳嗽鼻塞項強呼吸不利甚則四肢微腫咳唾

膿血若吐臭穢胸中隱痛脉數而實者為肺癰咳唾涎

沫脉數而虛者為肺痿惡寒喘嗽者寒邪內蘊也小青

龍湯咳唾膿穢者肺癰內潰也桔梗湯竊謂前症若喘

咳短氣者脾肺氣虛也五味異功散咳唾膿痰左尺脉

數而無力者腎氣虛也六味地黃丸咳唾膿痰右關脉

數而無力者脾氣虛也七味白朮散若發熱喘嗽唾膿

不食者脾肺虛甚也難治大要補脾肺滋腎水為善

仍審

五臟相勝乳母
七情後症倣此

一小兒感冒停食吐瀉用疏利之劑咳嗽膿血此中氣
復傷而變肺癰也用桔梗湯而愈後咳嗽吐血仍用前
藥佐以異功散而痊

一小兒停食服瀉藥而變肺癰余先用異功散以救脾
肺次用桔梗湯以治肺癰而痊

一小兒停食服尅伐之藥唾痰腥氣面赤氣喘此元氣
復傷而成肺癰也用桔梗湯膿痰頓止翌日喘甚此脾

氣虛而不能生肺也用異功散加杏仁百合而愈後小便澀滯服八正散小便愈澀咳嗽吐痰面赤盜汗余謂肺氣虛熱前藥虧損真陰虛火鑠肺金而然用異功散以補脾土地黃丸以滋腎水遂愈

一小兒肺癰愈後咳嗽面色白或痿黃手足冷小便頻此因脾虛不能生金也服參蘇飲之類自汗盜汗昏憤發搐遺尿下氣手足如水面色青白此陽氣脫而虛寒也用人參一兩乾薑二錢大棗五枚米泔煎沸先灌一

盃將熟又灌二盃連用二劑而蘇更朝用補中益氣湯
夕用異功散而愈

一小兒十五歲因勞傷元氣而咳嗽誤用表散之劑復
傷肺氣成癰咳嗽膿血用桔梗湯為主佐以異功散膿
漸少專用異功散膿止而愈後因書課過勞自汗時嗽
服外感藥咳嗽益甚胸膈痞滿呼吸不利余謂脾肺之
氣虛甚而然用參芪補脾湯而痊

一小兒咳嗽服參蘇飲而益甚右寸關之脉浮散余謂

此風傷皮毛熱傷血脉血氣稽留蘊結於肺而成癰也
不信仍復表散唾咳膿血余曰此因肺虛不能攝氣脾
虛不能攝涎耳當補脾土以生肺金又不信果歿

一小兒感冒咳嗽發散過度喘促不食痰中有血余用
桔梗湯而愈後元氣未復大便似痢或用苓連枳實之
類變漫脾風而卒

小青龍湯治傷風胃寒咳嗽喘急肺脹胸滿鼻塞流涕
或乾嘔熱嗽或作渴或作噎或小便不利或小腹脹

滿

北仲景之法審有是症用之及時殊有良驗

麻黃

去節

赤芍藥

半夏

各七錢

細辛

乾薑

炮

甘草

炙

桂枝

各三錢

五味子

半兩

附子

二錢

浮不用

右每服二錢水煎

桔梗湯治咳嗽膿血腥穢已成癰症

桔梗

炒

貝母

去心

知母

炒

桑白皮

炒

枳殼

各一錢

地骨

皮

瓜蒌仁

薏苡仁

杏仁

五分炒

當歸

黃芪

炒各一錢

五味子

杵

百合

炒各一錢五分

防己

一錢

甜葶藶

炒五分

右每服二三錢水煎

升麻湯治肺癰膿血穢臭胸乳皆痛

升麻 桔梗炒 薏苡仁 地榆 條芩炒 牡丹皮

芍藥炒 甘草各等分

右每服二三錢水煎

排膿散治肺癰此方排膿補肺

黃芪鹽水拌炒 白芷 人參 五味炒研碎各等分

右為末每服一二錢蜜湯調下

射干湯治胃脘癰吐膿血

射干

去毛

梔子仁

赤茯苓

升麻

赤芍藥

一兩二錢

白朮

半兩

右每服三五錢水煎入地黃汁少許再煎服

人參平肺散治心火尅肺金傳為肺癰咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽噎不利

人參

陳皮

甘草

地骨皮

茯苓

各一錢

知母

炒七分

五味子

炒

青皮

天門冬

去心四分

桑白皮

炒一錢

右每服二三錢

參芪補脾湯治肺癰脾氣虧損咳吐膿涎或中關不食

必服此藥補脾土以生肺金否則不治

人參 白朮

錢各二

黃芪

錢炒二

茯苓

陳皮

當歸

錢各一升麻

錢三麥門冬

錢七五味子

錢四枳梗

錢六甘

草灸三

右作三服薑棗水煎

人參補肺湯治肺症咳喘短氣或腎水不足虛火上炎

痰涎壅盛或吐膿血發熱作渴小便不調

人參 黃芪炒 白朮 茯苓 陳皮 牡丹皮

當歸各一錢 山茱萸去 山藥各二錢 五味子 枳 麥門冬

甘草炙各七分 熟地黃自製一錢五分

右薑水煎服

七味白朮散治中氣虧損津液短少口舌乾渴生瘡不喜飲冷或吐瀉後口乾或咳唾膿痰右關脉數無力者脾氣虛也最宜服之

人參 白朮 木香 白茯苓 甘草 藿香

各五

分 乾葛一錢

右水煎服

五味異功散

六味地黃丸

參蘇飲

獨參湯

補中益氣湯

腸癰

孫真人云腸癰為病小腸重強按之則痛小便如淋時出汗惡寒身皮甲錯肚皮急癰甚者肚腹脹大轉側有水聲或遶臍生瘡或膿從臍出或從大便而下蓋因飲食不節所致治法當診脉遲緊者未有膿也用大黃湯下之脉洪數者已有膿也用薏苡仁湯排之小腹疼痛小便不利膿壅滯也牡丹皮散主之若大便或臍間出膿者不治內經云腸癰為病不可驚驚則腸斷而死

故患是者其坐卧轉側理宜徐緩時少飲薄粥及八珍湯固其元氣庶或可生

一小兒患腸癰先用太乙膏後服牡丹皮散下膿而愈後因跌腹內作痛遍身皆赤良久身黯而殁蓋腸斷故也

大黃湯治腸癰小腹堅腫按之則痛肉色如常或煩赤微腫小便頻數汗出憎寒脉遲緊膿未成也急服之

大黃炒 朴硝各二錢 牡丹皮 瓜蒌仁 桃仁去皮
各二錢

錢二

右每服二三錢水煎

薏苡仁湯治腸癰腹中痛煩躁不安或脹滿不食小便
澀滯

薏苡仁 牡丹皮

桃仁各三兩 瓜蒌仁四兩

右每服四錢水煎

桃仁湯治腸癰腹中痛煩燥不安壅痛大便閉澀亦有
繞臍生瘡者但用此藥無妨