

古今醫案按卷第四

吳江李齡壽辛垞重較輯

嘉善俞震東扶纂輯

男念祖永修較字

得璜礪溪

孫男掌明罔若全較

賂南貶賢

虛損

羅謙甫治建康道周卿子年二十三至元戊寅春間病發熱
肌肉消瘦四肢困倦嗜臥盜汗大便溏多腸鳴不思飲食舌
不知味懶言時來時去約半載餘羅診脉浮數按之無力正

應浮脉歌云。臟中積冷。營中熱。欲得生津。要補虛。先灸中脘。乃胃之紀也。使引清氣上行。肥腠理。又灸氣海。使生發元氣。滋榮百脉。長養肌肉。又灸三里。乃胃之合穴。亦助胃氣。撤上熱。使下於陰分。以甘寒之劑。瀉火熱。佐以甘溫。養其中氣。又食粳米羊肉之類。固其胃氣。戒以慎言語。節飲食。懲忿窒慾。病日減。數月後。氣得平復。逮二年。肥甚倍常。或曰。世醫治虛勞病。多用苦寒之劑。君用甘寒。羊肉助發熱。人皆忌之。而君反令食。何也。羅曰。內經云。火位之主。其瀉以甘。藏氣法時論云。心苦緩。急食酸以收之。以甘瀉之。瀉熱補氣。非甘寒不可。若以苦寒瀉其土。使脾土愈虛。火邪愈甚矣。又云。形不足者。

溫之以氣。精不足者。補之以味。勞者溫之。損者益之。補可去弱。人參羊肉之類是也。人參能補氣虛。羊肉能補血虛。食羊肉何疑耶。

震

按羅公治總管史侯男便血及運使崔君長子心脾痛皆灸此三穴所講灸穴之義亦同。想其以此取效多矣。柳公度言予舊多病常苦氣短。因灸氣海氣遂不促。自是每歲須一二次灸之。以氣怯故也。合觀兩家之說。則虛損病用藥難效。莫如用灸。扁鵲新書載紹興間有步卒王超。本太原人。後入重湖爲盜。年至九十。精彩腴潤。能日淫十女。不衰。岳陽民家多受其害。後被擒。臨刑。監官問曰。汝有異

術信乎曰無也惟火力耳每夏秋之交卽灼關元干炷久久不畏寒暑累日不饑至今臍下一塊如火之煖豈不聞土成磚木成炭千年不朽皆火之力也死後刑官令剖其腹之煖處得一塊非肉非骨凝然如石卽艾火之效故云保命之法灼艾第一竊思灼艾而至于炷惟能忍人之所不能忍斯能爲人之所不能爲耳亦殊難矣

丹溪治一老人七十九歲頭目昏眩而重手足無力吐痰相續左脉散大而緩右脉緩大不及左重按皆無力飲食略減而微渴大便四日始一行醫投風藥朱曰若用風藥至春必死此大虛證宜大補之以參芪歸芍白朮陳皮濃煎下連栢

九三十粒。服一年後精力如丁年。連栢丸用薑汁炒薑汁糊丸。

震

按脉緩大重按無力參芪朮是矣連栢丸何耶豈以其微渴大便四日一行耶或以脉緩大爲熱耶

又治一人肥大蒼厚因厚味致消渴投寒涼藥愈後喫黃雌雞滋補約至于隻患膈滿嘔吐醫投丁沉附子之劑百貼而愈值大熱中尚惡風怕地氣乃堆糠鋪簟蔽風而處動止呼吸言語皆不能丹溪診之脉四至浮大而虛此內有濕痰以多服燥熱藥致氣散血耗當夏令法當死賴色蒼厚胃氣尚在以參芪朮熬膏煎淡五味子湯入竹瀝調服三日諸證悉

除令其絕肉。味月餘平復。因多啖雞卵。患胸腹膨脹。自用二陳湯加香附白豆蔻。其滿頓除。乃令絕肉味。勿藥自安。

震

按動止呼吸言語皆不能。其虛象尚易視。熱天畏風怕地氣。脉又四至。人必仍視爲寒矣。丹溪斷爲濕痰者。蓋推前因之食雞千隻。膈滿嘔吐而悟之。至謂虛寒之象。以多服燥熱藥。氣散血耗所致。見識高人。百倍用參芪朮煎膏。與脉浮大而虛恰合。其消痰藥只用一味。妙絕。淡五味子湯送者。五味以收其氣之散。淡則味薄。兼濡其血之耗也。且用於暑月爲更宜。究因選藥巧不可及。令絕肉味善後尤佳。

吳球治一貴宦年七十少患虛損好服補劑一日事不遂意頭目眩暈精神短少遂告醫以居常多服人參其效甚速乃競用人參熟地湯藥及固本丸竝進反加氣急吳診其脉大力薄兼問病情因得之曰先生歸休意切當道苦留抑鬱而致病耳醫者不審同病異名同脉異經之說氣鬱而概行補藥所以病日加也宦者曰斯言深中予病竟用四七湯數劑寬快而愈

震

按此老原係虛證後之加劇者由於鬱耳用補而病轉增自當尋其別因祇緣脉大力薄仍屬虛脉故須問而知之也

虞恒德治一人年三十歲三月間房事後乘馬渡河遇深淵
沉沒幸馬健無事連濕衣行十五里抵家次日憎寒壯熱肢
節煩疼似瘧非瘧之狀醫作虛證治而補氣血月餘不效更
醫作療治用四物加知柏地骨皮之類及大補陰丸倍加紫
河車服至九月反加滿悶不食顧乳嫗日飲乳汁四五盃粒
米不入虞診視六脉皆洪緩重按若牢右手爲甚虞作濕鬱
治用平胃散倍加蒼朮白朮苓半川芎香附木通砂仁羌防
加薑煎服黃昏一貼一更時又一貼至半夜徧身發紅丹如
癰疹片時遂沒而大汗卽食稀粥二碗由是諸病皆減能食
仍與前方服三貼後以茯苓滲濕湯倍加白朮服二十貼而

安

震

按溺水不換濕衣又值遠途次日卽病何至遂以虛損治蓋庸醫着眼在房事後耳延至半年病勢益重而其脉仍非虛損脉故以濕鬱治卽愈合上二案並觀之可見病因亦不得不講

汪石山治一人年逾三十神色清減初以傷寒過汗嗣後兩足時冷身常惡寒能食易饑日見消瘦頻頻夢遺筋骨疼痛久臥枕榻醫用滋陰降火罔效汪視左脉浮虛而緩左脉浮弦而緩乃曰足冷身寒是陽虛之驗又汗多亡陽奈何以陰虛治食則易飢者非陰虛火動也蓋脾胃以氣爲主氣屬陽

脾胃之陽已虛。又瀉以苦寒屬陰之藥。故陽愈虛而內空。竭須假穀氣以扶助之。是以易飢而欲食。雖食亦不生肌肉也。經曰。飲食自倍。腸胃乃傷。又曰。飲食不爲肌膚。其此之謂歟。夢遺亦非特陰虛。經曰。陽氣者。精則養神。柔則養筋。今陽氣虛。不能養神。則夢寐弗寧。而神弗藏于心。不能養筋。則筋骨疼痛而寃。弗藏于肝。神寃失所。安得不遺乎。經曰。氣固形實。陽虛則不能固。而精門失守。此遺之所以頻而不禁也。經曰。腎者。胃之關也。今若助陽以使其固。養胃以守其關。何慮遺之不止。乃以參芪各二錢。白朮一錢。甘草五分。枳實香附山查。葶子各五分。煎服半載。隨時令寒暄升降而易其佐使。遂

全安

震

按以上諸案皆與今之所謂損怯者不同故亦無用滋

陰潤肺藥者下條則全似今之損怯而用藥卻平正可法

又一人年踰三十質弱而色蒼初覺右耳時或冷氣呵呵如
箭出越兩月餘左耳氣出如右早則聲啞胸前有塊攢熱晨
後聲啞稍開攢熱暫息少間攢熱復爾或嗽惡酸水小溲頻
赤大便溏泄雖睡熟亦被嗽而寤噦惡二三聲胸腹作脹頭
腦昏痛不堪時或發熱渾身疼痛天明前證少息惟攢熱勿
休且近來午後背甚覺寒兩腿麻冷用參二錢五分茯苓門
冬白朮各一錢黃連甘草枳實各五分貝母歸身各一錢白

芍八分煎服尋愈

江應宿治祁門人周三年近三十潮熱咳嗽咽啞診之六脉
弦數周故以酒豪先年以醉後嘔血數升遂咳不止百治不
應肌食遞減煩躁喘滿江與四物換生地加貝母丹皮麥冬
五味阿膠煎服加蔗漿一小盃薑汁少許漱漸止食少再加
白朮茯苓人參食漸進夜嚙太平丸晨服六味合生脉加枸
杞爲丸兩月嗽止半年肥白如初

震

按此條純是今人治損怯法兩月嗽止半年全愈亦頗

有之但不能盡如是耳

李士材治福建何金陽令郎患虛損夢遺盜汗羸頓已極檢

其所服以四物知栢爲主。芩連二冬爲加減。診其脉大而數。按之極軟。李曰中氣大寒。反爲藥苦矣。乃以歸脾湯入肉桂一錢。人參五錢。當晚得熟寐。居十日而汗止精藏。更以還少丹兼進。補中益氣間服一月而瘥。

震

按脉大而數。按之極軟。誠宜溫補矣。然用溫補得數脉退。則愈數脉不退。則仍不愈也。亦惟大而數。按之極軟。故可溫補。若細而數。按之極軟。死期已近。溫補何益也。

又治刑部主政唐名必。勞心太過。因食海鮮吐血。有痰。喉間如鯁。日晡煩熱。喜其六脉不數。惟左寸濇而細。右關大而軟。思慮傷心脾也。以歸脾湯大料。加丹皮。麥冬。生地。二十劑而

證減六七兼服六味丸三月遂不復發

吳門張飲光發熱乾咳呼吸喘急服蘇子降氣不應服八味丸喘益急迎士材視之兩頰俱赤六脉數大曰此肺肝蘊熱也以逍遙散用牡丹皮一兩苡仁五錢蘭葉三錢連進二劑而喘頓止以地黃丸料用麥冬五味煎膏及龜膠爲丸至十觔而康

震

按上條於左寸右關得其病因此條以服溫納不應悟其病因上條喜脉之不數此條喜脉之數大蓋二人俱係新病一虛一實尙易辨耳

又曰南都許輪所孫女吐血痰嗽六月診之兩尺如爛綿兩

寸大而數。余謂金以火爲仇。肺不浮。濇反得洪。大賊脉見矣。秋令可憂。八月初五復診之。肺之洪者。變爲細數。腎之軟者。變爲疾勁。余曰。歲在戊午。少陰司天。兩尺不應。今尺當不應而反大。寸當浮大而反沉細。尺寸反者。死。肺至懸絕十二日死。計其期。當死于十六日。然能食者。過期。况十六十七二日。皆金未遽絕也。十八日交寒露。又值火日。經曰。手太陰氣絕。丙日篤。丁日死。言火日也。寅時乃氣血注肺之時。不能注。則絕。必死于十八日寅時矣。輪所以其能食。未深信也。至十八果未曉而終。

震

按此真入理深談。粗心者那得如是通盤打算。

侍御馮五玉令愛發熱咳嗽已及半載十月間吐鮮血甚多每日祇食稀粥一盞大肉消陷大便溏泄沉困着床脉來七至李曰法在不救人所共知若能惟余是聽不爲旁撓可救十中之一每貼用人參五錢桂附各一錢芪朮三錢歸芍二錢陳皮一錢日投三貼約進七十劑及壯水丸三劑而後起于床又三月而飲食如舊矣

震

按昔賢治虛勞每以參朮桂附奏奇功遂詆丹溪滋陰藥不可用深斥苦寒之非此亦矯枉過正余親見吐血能進人參者日服二三錢甚相安不旋踵而血仍吐益加參亦復吐不半年死又見以參湯送八味丸者初若效後則