

欽定四庫全書

子部

赤水元珠卷二十九



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

赤水元珠卷二十九

外科門小引

明 孫一奎 撰

生主子曰外科最重者莫如癰疽最急者莫如喉風疔腫
患之者生死立見其餘瘡瘍不可緩圖非若上三証急
若風火也究其受病之源經絡營氣不從逆於肉理乃

生癰腫又曰膏粱之變足生大疔又曰六腑不從留結

欽定四庫全書

赤水元珠

為癰又曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火大抵皆氣血虛弱蘊鬱熱毒調養失宜之所致也予固非專門外科蓋常咨訪推究頗知治法大體茲採前人所論癰疽証治載列卷首疔瘡腫瘍次之陶節庵癰疽經薛立齋外科精要二書實外科權輿業是者不可不使之隨囊檢視能熟此二書鮮有敗事予固特舉歷試有功者揭出以告同志云

瘡科總論

夫癰疽瘡瘍者皆由氣血不和喜怒不時飲食不節寒

暑不調使五臟六腑之氣怫鬱於內以致陰陽乖錯氣血凝滯而發也亦有久服丹石燥熱之藥熱毒結深而為癰疽也夫癰疽之疾多生於膏粱富貴之人以其平昔所食肥膩炙煇安坐不勞嗜慾無節以致虛邪熱毒內攻煎熬氣血而成也癰者壅也大而高起屬乎陽其脉浮數疽者沮也平而內發屬乎陰其脉沉數瘡者總名也癰者有頭小瘡也經云諸痛痒瘡皆屬心火蓋心主血而行氣若氣血凝滯挾心火之熱而生癰疽之類

也然所感有淺深故所發有輕重大小之不同也六腑積熱騰出於外肌肉之間其發暴甚皮腫光軟侵裏廣大者癰也五臟風毒積熱攻注於肌骨其發猛惡初生一頭如痞癰白色焦枯觸之而痛應心者疽也熱發於皮膚之間浮腫根小不過二三寸者癰也夫癰發於六腑若燎原之火外潰肌肉疽生於五臟沉澀難療若陶室之燧內消骨髓癰則易療惟難將息而遲瘥疽則難療而易瘥夫諸瘡之中惟背疽疔瘡最為急症其次莫如腦疽腸

癰喉癰之類亦其急者也至若瘰癧懸癰痔漏諸瘡之類其症可緩而治也又有疥癬癰瘡風疖之類雖云俱屬瘡類而其輕重緩急自有不同也夫癰疽之疾要須察其是虛是實是冷是熱或重或輕對証用藥無失先後次序凡人年四十以上頭項鬢頤背脊腰脅或筋骨之上所視不見之處稍有瘡癰便不可輕易待之若視之怠慢以為常疾每見至微至著喪命者多矣便宜速急治之庶幾得救譬之救火初起則易救至於燎原之

勢不可撲滅矣其理亦由是也凡瘡未破毒攻臟腑一毫熱藥斷不可用此是先後次第之妙訣也夫瘡有五善七惡不可不辨若動息自寧飲食知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消色鮮不臭三善也神彩精明語聲清亮四善也體氣和平五善也如煩躁時嗽腹痛渴甚泄利無度小便如淋一惡也膿血大泄焮痛尤甚臭惡難近二惡也喘粗短氣恍惚嗜卧三惡也未潰先黑久陷面青唇黯便汚者四惡也肩項不便四肢沉重五

惡也不能下食服藥而嘔食不知味六惡也聲嘶色脫
唇鼻青黑面目四肢浮腫七惡也更有氣噫痞塞欬逆
身冷自汗無時目瞪耳聾恍惚驚悸語言頻錯皆惡証
也五善見三則差七惡見四必危若五善并至則吉而
安七惡全見必危而死矣已上所論大綱其諸証候治
法列論於後

五發癰疽論

夫五發癰疽者謂發背發腦發鬚發眉發頤是也人之

一身氣血周流而無間稍有壅聚莫不隨所至而發焉
又豈特五者哉夫發背者乃五臟風熱六腑邪毒灌於
筋骨之間發於經絡之內榮衛虛損氣血衰殘所致也
其發初如粟米大最不可輕忽後必大發也若初起紅
腫高起者後必不為害故曰外形如粟中可容谷外貌
如錢裏可著拳如惡毒深滿膿血交粘用藥可痊若膿
臭穢無絲此血敗氣衰陽絕陰盛必難療理治初起或
陰塌不起便可用艾多灸或隔蒜灸之如痛灸至痒如

痒灸至痛此最妙法也若疽瘡已成亦可用火針烙開
瘡口則易治也若瘡高起為癰則易治平陷為疽則難
治癰疽形症已具前總論中茲不復論至如發腦發眉
發髻發鬚發頤地位不同然皆由內臟伏陽結滯邪毒
上壅隨其經絡地分而發也其諸發癰初起皆宜宣散
熱毒要須看人元氣虛實而治之庶不悞矣若元氣實
者亦可用大黃之劑泄去毒氣或用漏蘆五香連翹之
類皆可用內托十宣之類補之亦有陰瘡寒塌不起雖

云用灸然亦不可服寒涼之劑亦宜以煖藥溫之全在活法不可執一也其敷貼洗藥具方于下隨症用焉

外科精要曰癰疽既灸即服藥以護腑臟如護心散凡有疽疾早進數服使毒氣外出而無嘔吐之患否則咽喉口舌生瘡或黑爛如菌若瘡發四五日之後宜間用別藥治之

又曰護心散乃解金石發疽之藥若發熱焮腫作渴飲冷而嘔者宜之若發熱焮腫作渴飲湯而嘔者不宜用

之蓋脾虛停痰或寒邪內侵或痛傷脾胃宜用六君子
湯若喉舌生瘡或口乾作渴或小便頻數宜用六味丸
大凡諸瘡作嘔若飲冷便秘是熱毒也黃連消毒散解
之飲冷便和是胃火也竹葉石膏湯清之懶食飲湯是
胃虛也補中益氣湯補之大便不實喜飲熱湯是脾胃
虛寒也六君子加炮薑以溫之常見脾胃虛弱者用護
心散反致胃寒嘔惡其喉舌生瘡乃腎水枯涸虛火炎
上其証甚惡急用加減八味丸多有得生者

又曰癰疽嘔逆是毒氣冲心非脾胃之冷當服內托散
楊氏云鼻衄初愈不曾表汗毒在經絡則背大疽自肩
下連腰脇腫硬如石其色紫黑以涼藥投之終夜大嘔
連進托裏散嘔止瘡潰赤水淋漓四十日而愈又有患
瘰者痛過輒嘔服托裏即止今有疽病不服此藥者故
引楊氏之言以解世人之惑

華佗癰疽瘡腫論

夫癰疽瘡腫之作皆五臟六腑蓄毒不流非獨因榮衛

壅塞而發也其行也有處其止也有歸假令發於喉舌者心之毒發於皮毛者肺之毒發於肌肉者脾之毒發於骨髓者腎之毒發於下者陰中之毒發於上者陽中之毒發於外者六腑之毒發於內者五臟之毒故內曰壞外曰潰上曰從下曰逆發於上者得之速發於下者得之緩感於六腑則易治感於五臟則難瘳又近骨者多冷近膚者多熱近骨者久不愈則化成血蟲近膚者久不愈則傳氣成漏成蟲則多痒少痛或先痒後痛成

漏則多痛少痒或不痛不痒內虛外實者多痛少痒血不止則多死潰膿則多生或嘔逆無度飲食無時皆癰疽使然症候多端要當詳治

薛立齋曰瘡瘍生蟲乃肝經風熱其成漏乃元氣虛弱其出血乃脾虛有火其潰膿乃元氣充實至於嘔逆等症屬脾胃虧損所致當調補元氣庶保無虞

背疽其源有五

一天行二瘦弱氣滯三怒氣四腎氣虛五飲冷酒食炙

燀服丹藥

治癰疽用藥大綱

一初患癰疽便服內托散以免後來口舌生瘡仍用騎竹馬或隔蒜灸

一服五香連翹湯如大便踈快即止仍量人虛實

一癰疽潰後宜服排膿內補散若嘔逆木香湯下

一癰疽初作便宜灼艾及麥飯石膏塗四圍中留口出毒如瘡小通傳之既潰用神異膏貼之