

欽定四庫全書

子部

濟生方卷八
六至



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

濟生才表

五氣

內經云

病皆生於外氣

有所謂七氣有所謂九

諸如憂思慮

起鬱者七氣也

七情之外益之以寒熱

證而九氣

也氣之為病

婦人皆有之惟婦人

血氣名

甚益人身血隨氣行

氣一壅滯則血與氣

傷或人言不謂八月月作非血月事將行預先作痛或月

水 嚴用和 編

事已行淋瀝不斷心腹作痛或連腰脇或引背脊上下
攻刺吐逆不食甚則手足搐搦狀類驚癇或作寒熱或
為癥瘕肌肉消瘦非特不能受孕久而不治轉而為瘵
疾者多矣

延胡索湯 治婦人室女七情傷感遂使血與氣併心
腹作痛或連腰脇或引背脊上下攻刺甚作搐搦經候
不調但是一切血氣疼痛並可服之

當歸

去蘆酒
浸到炒

延胡索

炒去
皮

蒲黃

炒

赤芍藥

官桂

不見火
各半兩

片子薑黃

洗

乳香

沒藥

木

香

不見火
各三錢

甘草

炙二
錢半

右呔咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分去

滓食前溫服吐逆加半夏橘紅各半兩

琥珀散

治婦人室女月水凝滯脇肋脹刺臍腹疔痛

不可忍及惡露不下血上攻心迷悶不省應有血氣腹

痛並皆治之

牡丹皮

去木

赤芍藥

蓬莪朮

剉

荊三稜

剉

劉寄奴

去梗

熟地黄

酒浸

延胡索

炒去皮

當歸

去蘆
酒浸

烏藥

官桂

不見火
各一兩

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同

煮豆爛為度焙乾入後五味同為細末每服二錢空

心食前溫酒調服

三神丸 治婦女血氣相搏腹中刺痛痛引心端經行

澀少或經事不調以致疼痛

橘紅

二兩

延胡索

去皮醋
煮一兩

當歸

去蘆酒浸剉
各炒一兩

右為細末酒煮米糊為丸如桐子大每服七十丸加至一百丸空心艾湯下米飲亦得

抑氣散 治婦人氣盛于血變生諸證頭暈膈滿皆可服之

香附子

炒淨
四兩

茯神

去木
一兩

橘紅

二兩

甘草

炙一兩

右為末每服二錢食前用沸湯調服

帶下

論曰巢氏病源論婦人有三十六疾所論三十六疾者

七癥八瘕九痛十二帶下是也然所謂十二帶下者亦不顯其證狀今人所患惟赤白二帶而已推其所自勞傷過度衝任虛損風冷據於胞絡此病所由生也且婦人平居之時血欲常多氣欲常少方謂主氣有原百疾不生儻或氣倍於血氣倍生寒血不化赤遂成白帶氣平血少血少生熱血不化紅遂成赤帶寒熱交併則赤白俱下有室女或虛損而有此疾者皆令孕育不成以致絕嗣凡有是證速宜治之久而不治令人面色黧黯

肌肉瘦瘠腹脇脹滿攻刺疼痛甚至足脛枯細多苦逆冷尫羸不能食矣診其脉右手尺脉浮浮為陽陽絕者無子苦足冷帶下也

白堊丸 治婦人白帶久而不止面生黧黯遠臍疼痛

腰膝冷痛日漸虛困產後白帶並宜服之

白堊 火煨 禹餘糧 煨醋淬七次 鼈甲 醋炙 烏賊骨 醋炙

當歸 去蘆酒浸 鵲巢灰 乾薑 炮 紫石英 火煨醋淬七次

附子 炮去皮臍 金毛狗脊 煨去毛 芎藭 各一兩 艾葉

灰半兩

鹿茸

燎去毛切片
醋炙一兩

右為細末醋煮米糊為丸如桐子大每服七十丸空

心溫酒米飲任下

白斂圓 治室女衝任虛寒帶下純白

鹿茸

醋蒸焙
二兩

白斂

金毛狗脊

燎去毛
各一兩

右為細末用艾煎醋汁打糯米糊為丸如桐子大每

服五十丸空心溫酒下

當歸煎 治婦人室女赤白不止腹內疼痛四肢煩疼

不欲飲食日漸羸瘦

當歸去蘆酒浸 赤芍藥 牡蠣火煨取分 熟地黃酒蒸焙

阿膠剉蛤粉炒成珠子 白芍藥 續斷酒浸各一兩 地榆

半兩

右為細末醋糊為丸如桐子大每服五十丸空心米

飲下

卷栢丸 治婦人室女腹臍冷熱相攻心腹絞痛腰痛

腿痛赤白帶下面色痿黃四肢羸乏

黃耆

去蘆蜜水炙

熟地黄

洗各一兩半

卷栢

炙醋

赤石

脂

煨醋淬七次

鹿茸

炙醋

白石脂

芎藭

代赭石

煨醋淬七次

艾葉

炒醋

桑寄生

鼈甲

炙醋

當歸

去蘆

酒洗微炒

地榆

各一兩

木香

不見火

龍骨

各半兩

乾

薑

炮三分

右為末醋煮糯米糊為丸如桐子大每服七十九空

心食前米飲下

血瘕

論曰腹中之病經書所載有積有聚有癖有疝有癥有
瘕蓋積者五藏所積其痛不離其部聚者六腑所聚其
痛無有常處癖者病據兩脇之傍疝者弦急而多痛癥
者徵也有塊可驗瘕者假也假物成形其結聚浮假推
移乃動此無他皆由飲食不節寒溫不調氣血勞傷臟
腑虛弱受于風冷與氣血相結而成也惟婦人血瘕為
病異於丈夫其所以異者非獨關於飲食不節而已多
因產後勞動太早喜怒不調臟虛受寒或月水往來取

涼過度惡血不散遇寒搏則凝皆能成血瘕也病作之時令人心脇攻刺少腹痛重或腰背互相引而痛久而不消令人黃瘦羸弱遂致絕產診其脉弦急大者生虛小弱者死不治

三稜煎丸 治婦人室女血瘕月經不通臍下堅結大如杯升而不治必成血蠱

京三稜

蓬朮

各二兩

芫花

半兩

青皮

去穢淨一兩半

右剉如豆大用好醋一升煮乾焙為細末醋糊為丸

如桐子大每服五十丸食前用淡醋湯下

琥珀丸 治婦人血瘀腹中有塊攻刺小腹痛重或腰

背相引而痛久而不治黃瘦羸乏

琥珀

別研

白芍藥

川烏

炮去皮

川牛膝

去蘆酒浸

鼈甲

醋炙

蓬莪茂

炮

當歸

去蘆酒浸

厚朴

薑製炒各一兩

木香

不見火

澤蘭葉

官桂

不見火各半兩

麝香

別研半錢

右為細末酒糊為丸如桐子大每服七十丸空心溫

酒米飲任下

通經丸 治室女月經不通臍下堅結大如杯發則寒

熱往來此名血瘕

當歸 去蘆酒浸一錢半

蓬朮 炮

桂心 不見火

青皮 去白

大黃 炮

乾薑 炮

桃仁 去皮尖炒

乾漆 炒令烟盡

紅

花 川椒

去目及閉口者微炒故地上密蓋出汗各一錢

右十味為末將一半用醋煮熬成膏一半入雞子清

同搗勻丸如桐子大每服二十九丸空心淡醋湯下

六合湯 治婦室經事不行腹中結塊疼痛腰痛腿痛

當歸

去蘆酒浸

白芍藥

官桂

去皮

熟地黄

川芎

蓬朮

炮各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫空心服

崩漏

論曰崩漏之疾本乎一證輕者謂之漏下甚者謂之崩中且婦人平居經脉調適衝任二脉互相滋養陰陽二氣不相偏勝則月事以時下儻若將理失宜喜怒不節疲極過度大傷於肝蓋肝為血之府庫喜怒勞役一或