

徐批叶天士先生方要真本

連史每部
四角
邊紙
三角

徐涸谿手抄集
而士先生所藏

真本

姚觀元署



光緒己丑仲春
刊介石堂藏版

敘曰古之志士隱淪卜祝藏器屠釣非賤鼎鐘輕軒
冕也喪亂旣降匪才不宏故有辱身以濟物降志以
匡時若家無一命之恩朝無許史之戚而希黼黻求
殊異亦足耻也夫利祿有損於賢豪賢豪無求於利
祿故甘巖壑悅棲遁者惡聞足音然閑曠性之所適
衣食身之所資不能棄所資取所擇是以君平握粟
以自怡韓康負囊而不悔小林先生隱君子也以醫
三致千金視夫士大夫之屈志意競名利又與夫無
巖處奇士之行而說仁義長貧賤者不可同年而語

義而能富孔父不等浮雲巧者有餘子長於焉驗道
矣予嘗嘆夫技不足養妻子財不足給祭祀守殘缺
命高蹈何足稱焉此乃小林先生之所羞也惜其術
成不可託後昆懼其藝之將沒乃寄意臨證指南託
其宗旨抒其所得亦可慨矣嘗自謂人頌予爲濟世
如予者乃世濟耳蓋無驕之心見於是語與是書殆
司馬遷所謂富而好行其德者與夫證莫大於寒熱
班固疾醫之以熱益熱以寒增寒然則醫之能辨寒
熱者鮮矣渙于意自云藥方試之多不驗則十全者

難矣況素問九靈文辭質奧通人尙難章句醫乃神
聖所慎今則視爲讀書不成去學劍之事也惡能決
嫌疑定可治哉又嘗論世之學師醫師其權與朝廷
等且爲朝廷之害何以言之人雖聖俗師教之無不
狂也人雖庸醫治之無不夭也是朝廷培之俗師
覆之朝廷生之庸醫殺之揚馬之文章鄭孔之學術
管樂之事功亦云少未遇俗師長未遇庸醫耳世之
父兄孫子方卑辭厚禮於俗師庸醫之前悲夫若小
林先生之綜覽書史強記博聞予竊慕焉宜其逍遙

池館謀度酒食肴艾若童稚健步若壯夫撰述傳於
還裔待收俾於千戶也有味哉張祥齡撰

徐批葉天士先生方案真本

後學張振家筱林甫叅校

雜症

丁

常熟廿四歲

勞嗽寒熱是百脉空隙二炁久虛所致純

勞嗽大忌香燥

用填精益

血

猶慮弗能充養肌肉日見乾癟病人

說醫用沉香聲音遂啞大凡香氣如煙雲先升後降况諸香皆洩氣沉香入少陰腎疎之泄之尤爲勞怯忌用

萸肉 山藥 建蓮 五味 茯神 熟地炭

氣分血分辨
析分明示後
學看病良法

芡實 川斛

顧嘉善四十八歲五六月間氣候溫熱地泛潮濕六蒸之邪

其時濕熱爲盛凡濕傷氣熱亦傷氣邪入氣分未及入血癰疹搔癢其色仍白氣分鬱痺之濕邪也病人說汗出或進食後疹卽旋發邪留陽明陽明主肌肉醫稱曰風愈以散藥不分氣血邪混入血分疹色變赤此邪較初感又深一層矣

飛滑石 石羔 紫花地丁 寒水石 白蘚

皮 三角胡麻 生乾首烏 木防已

因好飲而傷
中致血當興
脾胃之陽而
補中爲急好
飲者每多此
病

王

淮安廿
九歲

平昔好飲脾氣已傷醉後便塘不實夫酒
性濕而動血聚濕必傷脾胃之陽三年失血食大
減少惡酒如仇全是脾胃受困世俗醫者見血見
嗽以滋降清肺治法滋必滯膩理嗽清寒此中陽
久困不甦墮入勞損矣

異功散

中央脾胃爲酒濕所困憊甚至惡酒如仇其中
氣之衰壞莫此爲甚舍異功散之外別無良法
多服人參庶幾有益好飲者比比皆是須鑒諸

有力量

范

湖州廿五歲

形色黃瘦腕痛噎血問納食減平日之七

自初春至霜降不得醒復此內損七情淹淹勞怯若不扶其脾胃但以嗽噎爲治殆不可爲矣

參歸建中湯

先天元陽全賴後天水穀之氣廕庇胃旺納穀中氣既能充護藏府且精生干穀陰分亦藉以充裕納食既減平日之七安得不急扶脾胃耶

高

陸墓二十歲

少壯脉小瀦屬陰臍左起癥年來漸大而

長此係小腸部位小腸失司變化傳導大便旬日

因大便旬日
始通故臍左

起瘕確指其
爲小腸部位
聰明過人

桃仁承氣加
入潤腸之藥

說穿似覺尋
常而他人已
不能道及言
言至理

始通但脾胃約束津液不行古人必用溫通緩攻
但通腸壅莫令礙脾

麻仁 桂心 桃仁 大黃 蜜丸服二錢

從來通腸壅之藥必礙脾胃以湯能盪滌耳今
改作丸藥祇用二錢令每日漸積流入腸中而
通洩法自脾約丸來

馮甯波廿五歲面起瘍瘡瘡愈頭痛牙關不開凡頭面乃

陽氣遊行之所不容濁氣留着外瘍既合邪痺入
骨散風藥僅走膚膜上焦氣多血藥無能爲干

上部之隧

角針

蜂房

淡豆豉

牙皂

甜瓜蒂

大

豆卷

讀天翁方案雖爲病人設法其實處推開精論治病道理警醒當世聾瞶語教人看病下手處後學得此便有主張不至一病到手卽慌忙無措也有功千古

韓海州四

十五歲單單腹大脉得右弦空左漸弱乃積勞陽

斷語清真切
當治病便不
蒙糊

傷之脹久病之變難望其愈

大鍼砂丸三錢

華

南京廿二歲

胃痛已久嘔水大便結燥藥已不可用

桃仁

薑汁

茯苓

延胡

半夏

廣皮白

陸

太倉三十二歲

陰損瘕泄以酸收甘補

人參

茯神

炒白芍

熟地炭

炙甘草

五味子

山藥漿丸

朱

靖江廿五歲

自春季失血血止痰嗽左脉細數是陰虛

勞嗽幸胃納不減可填補真陰肺藥理嗽必傷胃

氣但精血藥不能生長加慎保養冀交春不致血

來屢發則難治矣

熟地 萸肉 雲茯苓 山藥 天冬 五味

麥冬 阿膠 龜版 黃柏

袁黎里廿九歲 肛瘍膿漏將一年氣下垂精血傷補下流

佐堅陰除熱

人參 熟地 湖蓮肉 海參 茯苓 黃柏

沈東山廿九歲 食入吐久不化胃中無陽濁氣逆攻不質

注入腸大便堅痺用半硫丸錢半

熱生清寒生濁中陽衰微陰濁反從下而上干

大便堅痺半硫丸溫劑中之最滑潤者不但泄

濁通陽抑且下行降逆

錢

嘉善三
十六歲

情志不和病起于內由痛吞酸嘔吐卧着

氣衝必是下起議泄木安土

吳萸

泡

人參

茯苓

川棟肉

乾薑

半夏

炒

顧

來安縣四
十六歲

此病起痰飲咳嗽或外寒勞倦即發發

陽氣已薄極

必胸脘氣脹吐出稀涎濁沫病退痰濃氣降乃已

此飲邪皆濁飲久聚兩年漸漸腹中痞悶妨食肛

腎虛氣不歸
元既不能溫
養脾陽以化
食以致飲邪
濁陰久聚此
腎虛而脾益

虛也再經腎
氣不攝逆上
飲泛病苦胸
腕脹悶必得
腎氣收攝則
諸症皆安

四君中以米
仁換白朮加
白朮黃精以
培補中宮此
旺中央以益
四維之法

門尻骨坐則無恙行動站立刻刻氣墜若大便欲
下之象腎虛不收攝顯然或於在前見痰嗽以肺
治苟非辛解卽以寒降以致釀成痼疾

腎炁丸加胡桃肉 角沉香

何三十
二歲 酒客大便不旺奔走勞動失血乃酒色之傷
止血理嗽藥味無非清降滋潤聲音日啞肺痿氣
餒爲難治之症

人參 茯苓 米仁 炙草 白朮 黃精

此方脾肺並補以肺痿氣餒須崇土生金母子