

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷七



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷七

書王仲景全書傳宋論註少陰全篇目錄

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

附子湯

白通湯

白通湯

附子湯

白通加豬膽汁湯

真武湯

通脈四逆湯

吳茱萸湯

四逆散

黃連阿膠湯

豬膚湯

甘草湯

桔梗湯

半夏散及湯

苦酒湯

桃花湯

御纂醫宗金鑑卷七目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷七

訂正仲景全書傷寒論註

辨少陰病脈證并治全篇

少陰腎經水火之藏邪傷其經隨人虛實或從水化以為寒或從火化以為熱水化為陰寒之邪是其本也火化為陽熱之邪是其標也陰邪其脈沉細而微陽邪其脈沉細而數至其見證亦各有別

陰邪但欲寐身無熱陽邪雖欲寐則多心煩陰邪
背惡寒口中和陽邪背惡寒則口中燥陰邪咽痛
不腫陽邪咽痛則腫陰邪腹痛下利清穀陽邪腹
痛下利清水或便膿血也陰邪外熱面色赤裏寒
大便利小便白陽邪外寒手足厥裏熱大便秘小
便赤此少陰標本寒熱之脈證也凡從本之治均
宜溫寒回陽從標之治均宜攻熱救陰回陽救陰
其機甚微總在臨證詳究辨別標本寒熱以急施

其治庶克有濟稍緩則不及矣

少陰之為病脈微細但欲寐也

註

少陰腎經陰盛之藏也少陰受邪則陽氣微故脈微細也衛氣行陽則寤行陰則寐少陰受邪則陰盛而行陰者多故但欲寐也此少陰病之提綱後凡稱少陰病者皆指此脈證而言也

集註

方有執曰少陰腎經也居於極下其脈起於小趾之下靈樞曰是主所生病者嗜卧但欲寐蓋人肖

天地天地之氣行於陽則闢而曉行於陰則闔而
夜故人之氣行於陽則動而寤行於陰則靜而寐
凡病人但欲寐者邪客於陰故也

張璐曰此言少陰之總脈總證也蓋少陰屬水主
靜即使熱邪傳至其經在先之脈雖浮大此時亦
必變為沉細在先之證雖煩熱不寧此時亦必變
為昏沉嗜卧但須辨出脈細沉數口中燥為熱證
脈沉微細口中和為寒證以此明辨萬無差誤矣

程應旄曰凡陰脈皆沉異乎太陽之浮不必言矣
陽明脈大微者大之反少陽脈弦細者弦之反沈
兼微細陰證定矣

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯主之

註少陰病謂但欲寐也脈沉者謂脈不微細而沉也

今始得之當不發熱而反發熱者是為少陰之裏
寒兼有太陽之表熱也故宜麻黃附子細辛湯溫
中發汗顧及其陽則兩感之寒邪均得而解之矣

集註方有執曰發熱邪在表也衾沉少陰位北而居裏

也以其居裏邪在表而發熱故曰反也以邪在表不在裏故用麻黃以發之以其本陰而標寒故用附子以溫之細辛辛溫通於少陰用之以佐主治者以其專經而為向導也

程知曰三陰表法與三陽不同三陰必以溫經之藥為表而少陰尤為緊關故用散邪溫經之劑俾外邪之深入者可出而內陽亦不因之外越也

程應旄曰一起病便發熱兼以陰經無汗世有計
日按證者類能用麻黃而忌在附子不知脈沉者
由其人腎經素寒裏陽不能協應故沈而不能浮
也沉屬少陰不可發汗而始得病時即發熱則兼
太陽又不得不發汗須以附子溫經助陽托住其
裏使陽不至隨汗而越其麻黃始可合細辛用耳
林瀾曰傳邪與陰寒皆有沈脈沉但可為病之在
裏而未可專以沉為寒也夫少陰證中微細而沈

與細數而沉其為寒熱之殊蓋大有別矣

麻黃附子細辛湯方

麻黃

二兩
去節

細辛 二兩

附子

一枚炮去
皮破八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸

藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也

註此詳上條少陰病得之二三日仍脈沉發熱不解者宜麻黃附子甘草湯微發其汗也蓋謂二三日不見吐利裏寒之證知邪已衰然熱仍在外尚當汗之但不可過耳故不用細辛而用甘草蓋於溫散之中有和意也此二證皆未曰無汗非仲景略之也以陰不得有汗不須言也

集註張璐曰少陰無發汗之法汗之必至亡陽惟此一證其外有太陽發熱無汗其內不吐利躁煩嘔渴

乃可溫經散寒取其微似之汗也

程應旂曰既云微發汗矣仍用以字故字推原之足見鄭重之意按此二條與太陽篇發熱頭痛衄沉用四逆者同一證彼以不差則期過三日可知病已入裏雖尚冒太陽頭痛直以少陰法律之此少陰病在初得二三日雖無頭痛證不容竟作少陰治之故仍兼太陽之法以律之一出一入不啻爰書假令前條得之二三日後二條過二三日不

差則四逆之與麻黃易地皆然矣

汪琥曰上條反發熱脈沉此亦反發熱脈沉但上言始得之為急此言得之二三日為緩病勢稍緩

治法亦緩

麻黃附子甘草湯方

麻黃

二兩
去節

附子

一枚炮去
皮破八片

甘草

二兩
炙

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸