

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷八十三



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩

婦科

經水不調

經水不調

明 王肯堂 撰

數之期止七日七日之

風以出七日之後氣歛

而花謝矣故服藥者當於七日之內日夜連服毋或姑
息苦之以七日所以全之於百年人不知此而惟務姑
息七日之外服無益矣余嘗謂痘毒之在血氣譬若糠
粃之在米也惟血氣充足運轉迅急若篩米然運轉不
停則糠粃不混於米而騰起浮聚自作一團血氣充足
周流則毒不滯於榮衛之中而自然收斂以成瘡故痘
瘡及時貫膿未嘗爛肌捐肉只是將皮肉紅色毒氣收
貯窠囊而已其有日久纔發臭爛者此皆變證而非本

然如此也今舉世以食物發痘而不知其本無益也惟服補氣血藥以助其運行推出之勢可也

發熱三日之後熱退身涼大小不等作三次出淡紅色如水珠光澤者不須服藥 凡痘子出現疎則毒輕不

可妄治密則毒甚却要磊落大小分明不相粘連略與托裏解毒之劑快斑湯消毒飲主之使之易發易靨如出太密粘連模糊其毒尤甚托裏解毒之劑宜多飲之以防癢塌黑陷之變更察外症可治則治不可則勿治

凡痘子出形皮肉如常根苗明潤此毒輕也不可妄
治如皮肉昏黑或赤腫根苗乾枯青紫或灰白者此毒
甚也以消毒飲奪命丹合服

快斑湯

人參

五分

當歸

防風

木通

各一錢

甘草

三分

木香

紫草

蟬蛻

各二分

右判細水一盞煎七分去渣溫服不拘時

消毒飲

牛蒡子 連翹 甘草 綠升麻 山豆根

紫草 各等分

右剉細水一盞煎七分去渣溫服不拘時

奪命丹

麻黃 升麻 各半兩 山豆根 紅花子 大力子

連翹 各二錢半 蟬蛻 紫草 各一錢半 人中黃 三錢

右研細末酒蜜和丸辰砂為衣薄荷葉煎湯下

凡痘子之出最要唇紅舌潤紅鮮如常其毒則輕如唇

焦破裂舌燥有芒為毒火太甚表裏鬱遏急宜解之黃
連解毒湯加大力子 黃連解毒 煩躁

發熱一二日便出如纔發一二日間痘便一齊湧出者
須間其曾數日前有熱否如曾數日前乍熱乍涼以過
期論惟原未發熱至今纔熱便斑現此表氣虛毒氣盛
榮熱衛弱腠理不密肌肉不堅不能約束於外使毒氣
衝擊故出太驟也宜用實表之劑可以無癢塌無潰爛
實表解毒湯主之 一方用羌活散調紫草膏或保嬰

丹加紫草牛蒡子蟬蛻與服熱盛不退以羌活散調退
火丹進之另用燈草木通蟬退地骨皮煎湯候冷服此
用發表之劑與表虛衛弱之說背馳蓋亦有初發熱時
見表證失於解散實熱壅遏而怒發者此法猶可施也
然得全者鮮矣

實表解毒湯

黃耆 人參 當歸稍 生地黃 白芍藥

地骨皮 甘草 酒片苓 柴胡 玄參 升麻

右判細加薄荷葉少許淡竹葉十片水煎溫服無時
消毒快癰湯

桔梗 甘草節 荆芥穗 牛蒡子 防風

當歸尾 玄參 赤芍藥 天花粉 黃芪

連翹 前胡 木通 水煎服

清地退火湯 治痘帶熱而出名為火裏苗急用此方
以退其熱則後無青黑變陷之候

地骨皮 地膚子 各一錢 牛蒡子 紫草

葛根

各八分

連翹

六分當歸

五分木通

三分蟬退

二分

右加薑一片水煎服如熱不退再服一劑或為末燈

心湯服

羌活散

本門初熱

保嬰丹

本門預防

退火丹

即六一散加牛黃纏豆藤見初

熱

發熱四五六日始出如發熱四日至五六日後始出者

須審視曾有外感內傷否蓋傷風寒傷食之熱久而不去則所蘊瘡痘之毒亦能乘間不出不可以過期論惟

無內傷外感之因一向熱而不出此裏氣虛不能驅逐其毒使之即出而毒邪得以留連停伏於臟腑腸胃之間宜先用托裏之劑令其快出次以和中之劑多服之可以無伏無陷無倒靨托裏宜托裏快癰湯或十宣散和中宜四君子湯加黃耆或保元湯合勻氣散主之托裏快癰湯

當歸 黃耆 川芎 木香 青皮 牛蒡子

紫草 連翹 木通 防風 桂枝 蟬蛻

右剉細加淡竹葉十片水煎溫服無時

十宣散一名十奇散一名托裏十補散

黃芪 人參 當歸各二錢 厚朴羌 桔梗各一錢

桂心三分 川芎 防風 甘草 白芷各一錢

右為細末每服一錢或二錢木香湯調下

增損八物湯

人參 黃芪 白朮 甘草 當歸 川芎

牛蒡子炒 葛根 赤芍藥 防風 荆芥穗

連翹 桔梗

右用水煎服

勻氣散

木香 青皮

各五錢

山查肉

二錢半

右為細末每服一錢甘草湯調下

應出不出痘疹之出自有常期如過期應出不出有數證不同不可不辨如內素實之人皮厚肉密毒氣難於發越一旦恃其體厚不怯風寒又為外邪所觸或體素

弱者風寒易感以致腠理閉密氣血凝滯故應出不出也其證頭痛四肢拘急偎倚蓋覆常惡風寒此類宜發之氣强者用雙解散氣弱者用參蘓飲或惺惺散俱初熱

或內虛者脾弱食少宜用補脾之劑加行氣發表藥四

君子湯不能食調元湯即參蘇飲並加木香青皮黃芪桂

枝或臟腑自利宜用溫裡之劑黃芪建中湯腹痛益黃

散脾並與奪命丹合進利未止者豆蔻丸泄利合進蓋

裏溫則氣不消削氣不消削則不陷伏矣若依上法分

治猶不出者此毒壅伏於三焦不久而變生焉

加減參蘇飲

人參 紫蘇葉 葛根 陳皮 前胡 白芷

桔梗 枳殼 甘草 羌活 防風

右用竹葉為引熱服

加減調中湯

人參 白朮 黃耆 甘草_炙 木香 桂枝

白茯苓 藿香 陳皮 白芍藥_{酒炒}

右用生薑為引煎服

聞人氏槐云是痘疹證熱數日而不發見者進退皆難
便欲大發之懼其本稀而成疵爛不發之又無以出其
毒氣古人立論始以藥微發之微發不出則加藥加藥
不出則大發之大發之後所出不多氣候和平無他症
者即是瘡本稀不可更發也以此言之發不至太過守
不至不及乃用藥之圓活也愚按古方用發表者升麻
葛根湯輕劑也惺惺散重劑也謂微發謂加藥者或先

用輕劑後用重劑或只用本劑先小作湯少飲之後漸

加大多飲之非謂於本方之外再加辛熱大發之藥也

凡痘疹過期應出不出者或因外感風寒依上發表之

法或因內虛泄瀉依上和中之法如按法調治猶不出

快熱反甚大渴腹脹滿大便鞭結不通煩躁不安者此

毒邪壅伏於內三黃丸七味升麻丸初熱擇而用之甚

則三乙承氣湯主之秘大便聞人氏云且身熱脈數大便

秘而腹脹此熱毒壅遏未見形狀者當微下之非微下