

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百七



南京中医药大学图书馆版权所有

普濟方卷一百七

泄痢門

總論

蓋胃才為榮腸水穀海也

胃行其津液者也故瀉則

古濟方不似色白腸鳴地痛小腸謂赤腸故泄則便膿

周王朱橐撰

然云有脾世有大腸世有

瀉則色黃食不化脾者

腹滿嘔吐大腸謂白腸

血小腹痛瘕者血聚也濁陰之氣結聚於內留滯而不
行則裏結後重數至圜不能便故謂大瘕瀉也胃為水
穀之海其精英則流布以養臟腑其糟粕則傳送以歸
大腸腸胃虛弱或挾風或挾寒或傷暑傷熱停冷蓄熱
冷熱不調泄瀉諸症皆能治之挾風者自汗惡風痛引
腰背挾寒者筋節拘急身體怯寒傷暑者面垢燥渴之
引水漿傷濕者肌肉虛浮肢體重著冷則腸鳴肚冷而
手足清熱則煩燥肚熱而手足溫冷熱不調者乍澀乍

澇由熱積於內不能去其積徒以冷藥水飲之熱氣無
所發泄故冷與熱搏而下注其或冷積於中不能去其
滯徒以熱藥壓之冷積不得宣行故熱與冷甘而成泄
或澇或澇裏急厚重是其候也外此則傷食一証失飢
傷飽胃不能消心腹膨脹所下酸臭治法當究其感受
之源然後為之固實不窒其源吾恐決潰四出莫知其
終矣然脾胃合氣以消水穀水穀既分安有所謂泄人
皆以泄為脾恙而不知腎病有泄焉腎瀉何如曰腹痛

無定似痢非痢骨弱面黑脚下時冷者是也

諸有泄瀉用不換金

散也除濕湯之類以去風濕以安腸胃此土品藥也次則溫脾養胃之劑投之是為正法然用之而不作効抑且腹痛走上走下或臍間隱痛腰脊疼酸骨節軟弱面色黧悴尺脉虛弱病安在哉曰此腎泄也當以炒故紙生薑官桂乾薑木香當歸輩主之仍用安腎丸為佐其或腎水下涸心火上炎燥渴溺多飲無度此陰陽離絕也識者

憂焉

至若泄痢之後腹滿身疼是則為表裏俱病先

當溫裏急與四逆湯然後解表急以桂枝湯與之肝木脾土木能勝土古人慮之固也經肝腎氣虛為病泄瀉亦孰知腎者所以守司於下而肝者又門戶要束之具

束則不瀉也不然泄瀉而面色青慘者古書謂肝經所受致寒時用當歸厚朴湯以主之果何意哉 太素曰

五泄有澹泄鶩泄飧泄濡泄滑泄也此乃是五泄者青

是感肝木之象其色青赤者受心火之氣其色赤白者

得金肺之氣色白黃者脾土之氣土蒼者土氣之下與

水隨之其色蒼也 泄瀉之症經中所謂飧泄澹洞泄

濡泄溢泄水穀注下是也大腸為五穀傳送之官脾胃

虛弱飲食過度或為風寒暑濕之氣所中皆能令人泄

瀉如傷於風其脉必浮下必帶血當以胃風湯驅散之
如寒氣所傷脉必沉細腹肚切痛下必青黑當以附子
理中湯治中湯等溫暖之若傷於暑則脉必沉微煩渴
引飲其下如水當以飲服五苓散來腹丹以分利之或
夾食則又當以胃苓湯下蘇感丸若濕氣所中其脉沉
緩腰脚冷痺小便自利不渴其下黃黑色當以滲濕湯
藿香正氣湯調之因停食而泄者下必臭類抱壞鷄子
或噫氣作酸先服感應丸推其食積而後理脾氣體虛

弱及年高之人脾氣虛敗而自利者又當投以四柱散
寇附丸若脾腎氣虛清晨泄下一二次二神四神丸主
之又有腎氣虛而泄者又須金鎖正元丹以固之凡治
瀉之法先理其中焦分利水穀然後斷下醫之大法如
此若脚氣泄瀉各以類求滑泄一症最忌五虛五虛者
脉細皮寒少氣前後泄痢飲食不入者是也若得糜粥
入謂泄瀉止作可治也 五泄之病胃小腸大瘕三証
皆以清涼飲子主之其泄自止厥陰症加甘草以緩之

少陰證裏急後重故加大黃又有太陰陽明二証當進退大承氣湯主之証不能食也當先補而后泄之乃進藥法也先煎厚朴半兩製水煎二三服後未已謂有宿食不消又加枳實二錢同煎二三服泄又未已如稍進食尚有熱毒又加大黃三錢推過泄止住藥如泄未止為腸胃有久塵垢滑粘加芒硝半合宿垢去盡則愈也陽明証能食是也當先泄而後補謂退藥法也先用大承氣湯伍錢水煎服如利過泄則少減之後稍熱退減

大黃一半再煎兩服如熱氣雖已其人必腹滿又減去
大黃與枳實厚朴湯又煎三兩服如腹滿退泄亦自愈
後服厚朴湯數服則已如大便虛滑久不愈太陰傳少
陰為痢為賊邪宜以厚朴枳實湯主之

儒門事親書云
東門一男子病

瀉痢不止腹鳴如雷不敢令坐坐則下注如傾諸醫例
斷為寒症乾薑官桂丁香荳蔻之屬枯礬龍骨皆服之
矣何鍼不燔何艾不注迂延將二十載矣一日問於戴
人戴人曰兩手寸脉皆滑余不以為寒然其所以寒者
水也以茶調散涌寒水五七升無憂散泄積水數十行
乃通因通用之法也次以五苓散淡劑滲泄通利之又
以甘露散止渴不數日冷食寒飲皆如故此法王啓玄
稔言之柰無人用之何哉又云凡大人小兒暴注水痢

不止內經曰此名曰暴注速瀉久而不愈者為洞瀉注下此乃火運太過之病也火星暴注故也急宜用新汲水調下甘露飲子五苓散天水散或用井華水煎此藥於冷服之病即瘳矣不可用御米穀乾薑豆蔻聖散子之類縱然泄止腸胃胃氣滯不通變腹脹此法宜分陰陽利水道乃為治法之妙也 凡泄瀉水穀

不化日夜無度腹中雷鳴下痢完穀可用導水丸禹功散泄之或病人老弱氣虛可用無憂散泄之再觀病勢強弱候一二日可服胃風湯以治其風如不愈者更服桂枝藤黃湯汗之則愈內經曰夫風之中為腸風飧泄啓玄子云風入胃中上黨於胃故食不化而化泄又云

暮食不化為殭瀉又經云春傷入風夏為殭泄故風宜
出汗腸中鳴者風以動之動而有聲慎不可用瞿粟苳
寇乾薑大燥之藥病漸者燥之去其濕則愈病甚者攻
之不動反能為害經曰其減則漸其加則甚可用五苓
散去猪苓加人參散 凡下痢膿血腹痛不止者何也
諸瘴痒皆屬於心火也可用通解丸加減瀉之量其虛
寔用之次用消濕散加生薑大棗芍藥服之瀉訖又用
新水調五苓散服之又一法煎燈心湯調下益元散伍

柴錢此病大忌油膩暈腥熱物 夫瀉痢兩証因腸胃

先虛虛則六淫得以外入七情得以內傷致於飲食不
節過食生冷多飲寒漿洞擾腸胃則成注下注下不已
餘積不消則成滯下治瀉之法先當分利水穀車前子
煎湯調五苓散是也次則上焦中焦正中湯及治中湯是
也理中不効方可斷下乳豆丸固腸丸是也或尚腹痛
未宜斷下斷下太早必成痢疾惟當調中化積痛輕者
宜服治中湯蘇合香丸腹痛更甚者必然成痢也醫經

所謂腹痛甚者必下痢也宜進靈砂丹以逐其積此丹
用之屢驗瀉者止疼者愈有疾者內化且不動臟腑大
凡痢疾不先去其積雖獲暫安後必為害或陰陽相搏
冷熱不調而成瀉痢者當進香連丸更有脾腎頓虛腹
脇膨脹飲食不化而泄瀉者宜助脾腎棗肉丸是也今
之人久瀉不止多投來復丹誤矣蓋來復內用硝石硫
黃皆有利性青皮陳皮又有遵性豈宜服之如夏月暴
瀉乃可服也

臟腑泄痢其証有多種大抵從風濕熱

也是知寒少熱多故曰暴泄非陰久瀉非陽腴而便膿
血知氣行而血止也宜大黃湯下之是為重劑黃芩芍
藥是為輕劑治法宜補宜泄宜止宜和和則芍藥湯止
則訶子湯有暴下無聲身冷自汗小便清利大便不禁
氣難喘急脉微嘔吐急以重藥溫之漿水散是也後重
則宜下腹痛則宜和身重者除溫脉弘者去風膿血稠
粘以重藥竭之身冷自汗以毒藥溫之風邪內縮宜汗
之驚澹為痢當內之在表者發之在裏者下之在上者

勇之在下者竭之身表熱者內踈之小便澀者分利之
盛者和之去者送之過者止之除濕則白朮茯苓安脾
則芍藥桂枝黃連當歸宣通其氣則枳榔木香如泄痢
而嘔上焦則生薑橘皮中焦則芍藥當歸桂茯苓下焦
則治以輕熱藥下甚以重熱藥若四肢倦小便少或不利
大便走沉困飲食減宜調胃去濕白朮茯苓芍藥三味
水煎服如發汗惡寒腹不痛加黃芩為主如未見膿而
惡寒乃太陰欲傳少陰也加黃連為主桂枝佐之如腹

痛甚者加當歸倍芍藥如見血加黃連為主桂當歸佐之如煩燥或先便血膿後白或發熱或惡寒非黃連不止上部血也如惡寒脉沉或白腰痛或血臍下痛非黃芩不止此中部血也如惡寒脉沉先血後便非地榆不止此下部血也唯脉浮大者不可下至冬赤白痢者是冷熱乘於血血滲腸間與津液相雜而下甚者腸虛不復故赤白連滯久不差也凡痢久不瘥脾胃虛弱則變嘔穢胃熱氣逆故嘔也氣逆外有冷折之不通故噦亦變