

欽定四庫全書

子部

續名醫類案卷十



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

續名醫類案卷中

嘔吐

錢塘魏之琇撰

杜士治安業坊有閨家老婦人患嘔吐請石秀才醫曰

胃冷而嘔下理中丸至石疑其病不愈石疑之召

杜士曰藥病兩相投何必多疑石曰何故藥相投而

病不愈杜曰藥力未及更進五十九丸必愈果如其言

石於是師法於杜

醫學綱目

王普侍郎病嘔飲食皆不得進召孫兆治數日亦不愈

後復召杜杜曰治嘔愈嘔此胃風也遂用川烏一兩

淨洗去皮臍不去尖以漿一碗煮乾每個作兩片復

用漿水一碗煮盡更作四片細嚼一片以少溫水下

少頃嘔遂止痛既少息杜遂問曰尋常好喫何物曰

好喫甘甜之物杜曰是甘甜乃膏粱之物積久成熱

因而生風非一朝一夕之故也王服其說

全上

毛公弼有一女嘗苦嘔吐求龐安常醫與之藥曰嘔吐
疾易愈但此女子能不嫁則此病不作若有娠而嘔
作不可為矣公弼既還家以其女嫁歸沙溪張氏年
餘而孕果以嘔疾死

曾達臣獨
醒襟志

臧中立毘陵人客鄞崇寧中徽宗后病甚中立應詔以
布衣麻履見命之入診出問何症中立對曰脾脉極
虛殆嘔瀉之疾作楚和藥以進且曰服此得睡為効
至夜半果患粥食不一月獲安賜歸詔出官帑予地

築室南湖以居焉

寧波府志

許學士政和中治一宗人病傷寒得汗身涼數日急嘔吐藥食不下用丁香藿香滑石等藥下咽即吐許曰此正汗後餘熱留胃腕正宜竹茹湯用之即愈

薛立齋治府庠沈姬文母患脾虛中滿痰嗽發熱又食濕麵冷茶吞酸嘔吐絕食誤服芩連青皮等藥益加寒熱口乾流涎不收聞食則嘔數日矣迎治曰脾主涎以脾虛不能約制也欲用人參安胃散惑於衆論

以為胃經實火宿食治之病日增劇忽思冬瓜食如
指甲一塊頓發嘔吐酸水不止仍服前藥愈劇復邀
視之則神脫脉絕頻死矣惟目睛尚動曰寒淫於內
治以辛熱然藥不能下矣急用鹽艾附子炒熱熨臍
腹以散寒回陽又以口氣補接母口之氣又以附子
作餅熱貼臍間時許神氣少甦以參朮附子為末仍
以是藥加陳皮煎膏為丸如粟米大入五七粒於口
隨津液嚥下即不嘔二日後加至十粒諸病少退甘

涎不止五日後漸服前劑一二匙胃氣少復乃思粥

飲後投以參朮等藥溫補脾胃五十餘劑而愈

明醫
襍婦

人良
方

一人湯藥入口即吐出六脉洪大有力此因地道不通
故氣厥上行而食物難入耳不更衣已十日餘服承
氣等湯俱不納日秘結日久湧逆勢盛故也止沸莫
若抽薪遂用蜜凖去燥糞數升嘔吐即止調以養血
清火之劑而安

周慎齋治一人飲食如常每遇子時作吐大便秘結其
人必苦慮憂思脾氣鬱結幽門不通宜扶脾開竅為
主遂以參苓白朮以蒼朮拌炒炙甘草各一錢煮附
子烏藥三分水煎服愈

一士鬱熱嘔吐用竹茹山梔各三錢陳皮茯苓各二錢
甘草一錢煎成加薑汁五匙熱服而愈

大還

陸養愚治李廳因飯後勞攘下午飲酒數杯遂覺臍下
小腹作痛升至胃脘即嘔嘔訖痛止少頃又從下痛

上復嘔訖痛緩自後痛嘔益頻自疑中毒以淡鹽湯
蘘汁探吐之一無所出醫投藿香正氣散不効其脉
浮按細數稍重即伏沈按甚堅曰此飲食過飽急遽
所至與潤字九百十顆令淡薑湯服之少頃連瀉數
行而愈

龔子才治梁太守女患頭暈嘔吐聞藥即嘔諸醫束手
令以伏龍肝為末水丸塞兩鼻孔用保中湯以長流
水入膠泥攪漚煎積冷頓服而安

萬病
回春

信陵府桂臺殿下夫人善怒怒即嘔吐胸膈不利煩躁
不寧腹痛便秘食下即吐已八日心慌喘急危甚診
之六脉虛微此血虛胃弱氣鬱痰火也與二陳湯加
薑連酒芩炒梔當歸酒芍香附竹茹白朮入薑汁竹
瀝二服而安

張景岳治吳參軍因食蘑菇致大吐大瀉醫謂速宜解
毒以黃連黑豆桔梗甘草枳實之屬連進而病益甚
胸腹大脹氣喘水飲不入延張診投以人參白朮甘

草乾薑附子茯苓之類彼疑曰腹脹氣急口乾如此
安敢服此耶閱日愈劇再求治與藥如前且疑且畏
含淚吞之一劑而嘔少止二劑而脹少衰隨大加熟
地以兼救其瀉亡之陰前後凡二十餘劑復元如故
蓋蘑菇之為物必產於深坑枯井或沈寒極陰之處
其得陰氣最盛故肥白且嫩也今中其陰寒之毒而
復解以黃連之寒其解毒之何茲用薑附以解其寒
人參熟地以解其毒傷元氣此疾之所以愈也

金氏少婦素任性每多胸脇痛火肝及嘔吐等症隨調隨

愈後於秋盡時前症復作而嘔吐更甚病及兩日甚

至厥脫不省火肝衆謂湯飲不入無策可施一醫云唯

用獨參湯庶幾萬一張診之其脉亂數且煩熱躁擾

意非陽明之火何以急劇若此乃問其欲冷水否彼

即點頭遂與以半鐘惟此不吐且猶有不足之狀乃

復與一鐘稍覺安靜因以太清飲投之有謂此非傷

寒又值秋盡能堪此乎不與辯及藥下咽即酣睡半

日不復嘔矣後以滋陰輕清等劑調理而愈大都嘔

吐多屬胃寒而復有火症若此者

此病火症極多張偏於溫補故有此

說經曰諸逆衝上皆屬於火即此是也

多屬胃寒自又是何說

後凡見嘔吐其有聲勢湧猛脉見洪數症多煩熱者

皆以此法愈之

以多屬胃寒及自後二字觀之張生平於此悞亦不少矣蓋此症良由肝

火上逆故暴急如此而曰陽明之火其孟浪可知

張路玉治曾餘弟婦患嘔逆不食者月餘服寬膈理氣

二十餘劑幾致絕粒而痞脹異常診之脉得虛大而

數按仲景脉法云大則為虛此胃中陽氣大虛而濁
陰填塞於膈上也因取連理湯方用人參三錢服之
四劑而痞止食進後與異攻散調理而康

嵇紹有胸中寒疾每酒後苦唾服萎蕤得愈草似竹取
根花葉陰乾昔華陀入山見仙人所服以告樊阿服

之壽百歲也

草本

陳良甫曰胃熱嘔吐者手足心熱政和中一宗人病傷
寒得汗身涼數日忽嘔吐藥與飲食俱不下醫者皆

進丁香藿香滑石等藥下咽即吐予曰此症汗後餘熱留胃腕孫兆竹茹湯正相當爾亟治藥與之即時愈

有婦人病吐逆大小便不通煩亂四肢冷漸無脉息凡一日半與大承氣湯兩劑至夜半漸得大便通脉漸生翌日乃安此關格之病極難治醫者當詳審也經曰關則吐逆格則小便不通如此亦有不得大便者

衍義醫

說續編

張子和治柏亭王論夫本因喪子憂抑不思飲食醫者
不察以為胃冷血寒之劑盡用病變嘔逆而瘦求治
於張一劑湧泄而愈歸家忘其禁忌病復作大小便
俱秘臍腹撮痛嘔吐不食十日大小便不通十三日
復問張張曰令先食葵羹菠菱菜猪羊血以潤燥開
結次與導飲丸二百餘粒大下結糞又令恣意飲冰
水數升繼搜風丸桂苓白朮散以調之食後服導飲
丸三十餘粒不數日前後皆通痛止嘔定張臨別又

留潤腸丸以防復結又留滌腸散大便秘則用之凡服大黃牽牛四十餘日方瘳論夫自嘆曰向使又服向日熱藥已非今日人矣一僧問張云腸者暢也不暢何以此一句儘多

按子和之醫大抵此法行之耳丹溪云凡病人欲吐者切不可下之逆故也縱使二便復秘可行疎通亦中病而止然後養其氣血潤其腸胃庶乎標本之治乃羸瘠之人服大黃牽牛四十餘日方瘳