

欽定四庫全書

子部

普濟方卷四百

六五



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院八品吏目臣黃發

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷四百五

明

周王朱橚 撰

嬰孩諸瘡腫毒門

癰疽 附論

夫癰疽瘡癰癰瘰癧結核疥癩毒腫赤遊癰疹火瘃等皆由
風邪客搏經絡流滯經曰五臟不和九竅不通六腑不
和流結為癰或積毒熱氣不得宣行入於皮膚或發頭
面或發虛處無故身熱微覺增寒或有痛處按之必熱

乃癰癰欲發也其有火痺立名多端乃古人強為之名
大抵治法同一理 母患血熱兒在胎中受之其血亦
熱母患氣壅兒在胎中受之其氣亦壅初生受母熱血
壅氣聚在經絡臟腑之間積滯不散久則成毒毒氣相
交內不通利即從外消外無能消其血與氣壅在一處
則是生背贅或脊督脉腫大如拳紅赤似血其兒之體
是一塊腐血又加生一塊壅毒卒未能消醫有何法善
術之士俾勞以鍼灸熨炳取次攻之十不得一外傳用

朴硝天南星當歸秋芙蓉葉黃蜀葵花乳香木鱉子無
名異其癰已熟即研白丁香少許津唾調傅菜豆大良
久破潰膿血迸出宜先與服托裏排膿消毒散血藥用
生甘草瓜蒌根苦桔梗枳殼川當歸錦頭漏蘆好大黃
等分為末服一錢匕煎熟為服以利為度克効萬一不
可荒亂意欲速消以惡毒草藥致難保 小兒因五臟
不和寒邪壅滯榮衛閉塞逆於膚肉遂生疽腫其狀腫
結皮強上如牛領然疼熾堅癢深附筋骨既得膿後其

疽可愈更須用排膿換肌之藥若餘毒未去封斂稍疾則源流復至或痒或痛肌汁不斷瘡竅不得合矣 陳氏子四歲忽二月患核內塊五六枚不赤不腫亦不疼痛大小如鷄鴨子皮不實硬從肉內透起召愚視之曰素問云榮衛不從逆於肉裏乃生癰腫此因疳成癰癰惡核也寶鑑云惡核而肉裏頻生癰癰而頂邊暗長萬金丸大黃丸治無辜疳癰癰惡核愚曰此病不可治通真子云核塊結實經久不破破則膿潰經久不合

者肉死不治且謾與藥和肌兼用外醫膏藥貼治月
餘無効覺微軟內有自破者有開破者膿潰不止經兩
月瘡口不合或一日發熱與四順飲大黃丸并涼肌
藥鎮驚藥熱除尚有進退雖飲食如舊日漸黃瘦主
人曰服藥已多日何効遲遲如此愚曰藥非無効也
病有終身不除者也藥非無驗也病有決不可救者
也此病決不治後七月間忽傷食吐數口神昏不省
因驚而卒核塊之有惡者如此後之學者不可不知

也

方

五香丸 治小兒癰疽癰毒未破或膿未潰增寒壯熱

木香

一分沉香剉

蘇合香

研各三合

麝香

研半

犀角

鎊二兩

大黃

生剉一兩半

吳藍葉

二兩

梔子仁

二兩

熟乾地黃

二兩白

芍藥

一兩雞舌香

二人參

一兩去蘆頭

白茯苓

一兩

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎

黃耆湯食前服

木香散 治小兒熱毒疽腫及赤白諸丹毒腫或生瘰

癰瘡癰身中風疹癢痒

木香一分 薰陸香一分 鷄骨香一分 黃芩一分 麻黃一分 根一分 去

連翹半兩 海藻半兩 洗半兩 射干半兩 川升麻半兩 枳實半兩 麩炒

微黃牛蒡子半兩 川大黃二兩 剉二兩 碎二兩 微炒

右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓入竹

瀝半合更煎三兩沸量兒大小不計時分減溫服

五香湯 治小兒一切癰疽腫毒瘡癰瘰癧癰疹火瘡

赤遊等疾

連翹

木香

沉香

薰陸香

即乳香

射干

升麻

獨活

桑寄生

通草

麝香

丁香

各一兩

大黃

半兩

右咬咀三歲用一錢煎汁去滓服

藍葉湯

治小兒疽瘡

方見本門癰瘡類

五香連翹湯

治小兒熱毒腫色白或惡核癰瘰附骨

癰疽節解不舉白丹走徧身中疹癢

方見本門毒腫類

治小兒大腸頭惡癰熱瘡 用蜣螂白擣汁傳其上

即安或燒為末醋和塗數過先以鹽水洗之妙

犀角知母湯 治小兒癰疽

犀角鎔知母焙黃耆剉黃芩去黑心人參 丹參

葛根剉大黃剉甘草炙各一兩元參三分麥門冬去心焙一兩半

右麤搗篩每服一錢匕水半盞入生地黃汁半合同

煎至四分去滓食後臨卧溫服量兒大小加減

漏蘆湯 治小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒瘡癰

漏蘆

連翹

肘後用
白薇

白欬

芒硝

肘後用
芍藥

甘草

各六

銖

大黃

一兩

升麻

兩

枳實

一方

麻黃

不用

黃芩

各九

銖

聖惠方有赤芍藥

分二

右㕮咀以水一升半煎取五合兒生七日内取一合

分三服八日至十五日取一合半分三服十六日至

二十日取二合分三服二十日至三十日取三合分

三服三十日至四十日取五合分三服肘後治大人

各用二兩以水一斗煮取三升分三服其丹毒須針

鏡去血 經心錄無連翹有知母芍藥犀角各等分

黃耆湯 治小兒癰疽瘡癤腫毒

黃耆 連翹 升麻 惡實炒各半兩 元參 丹參

露蜂房 枳殼去穰 甘草炙各一分

右麤搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓食後

臨卧溫服小大加減

木通湯 治小兒痘

木通 升麻 赤芍藥 黃芩去黑心 山梔子仁

麥門冬

去心焙各二兩

大黃

剉炒各一兩

枳殼

去穢炒半兩

右麤搗篩每二錢匕水一盞入生地黃汁半合煎至

七分去滓分溫二服食後臨卧服量兒大小加減

治小兒疽癰

丹砂

大黃

各十銖雄黃

藺茹

漆頭者各二十四枚

礬石

馬齒

者十銖雌黃

二十銖莽草

十八銖

黃連

三十銖

右㕮咀以猪脂一升三合微火煎三上三下膏成去

滓下諸藥末攪凝傳

黃耆湯 治小兒瘡腫癰疽

黃耆剉 葛根剉 麥門冬去心 黃芩去黑心 犀角鎔 升

麻 甘草炙各一兩 木香半兩

右搗篩每服一錢匕水七分煎四分去滓食後服量

兒大小加減服之

黃耆散 治小兒疽腫及瘡癰身體壯熱口乾心躁

黃耆剉 連翹半兩 川升麻半兩 元丹一分 丹參一分 露蜂

房一分 枳實半兩 甘草一分 微赤剉

右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫
量兒大小加減服之

犀角散 治小兒疽毒腫硬壯熱大渴

犀角屑三分 芎根半兩 麥門冬一心焙 川升麻半兩 木

香半兩 黃耆半兩 黃芩半兩 甘草半兩 微赤剉

右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫
量兒大小分減服之

鷄舌散 治小兒疽瘡

鷄舌香一兩 木香一兩 沉香一兩 麻黃 海藻洗去鹹 大黃

炮各
半兩

右搗羅為麝散每服一大錢水一大盞竹瀝三兩點煎至五分去滓溫服兼放令溫熱淋瀝患處

清水膏 治小兒疽腫毒堅硬疼痛攻衝四畔煖赤宜用抽熱毒消腫氣

羊桃根一兩 川大黃一兩 生用 黃芩半兩 赤小豆半合 黃

藥半兩 葶苈粉半兩