

欽定四庫全書

子部

石山醫案卷下



南京中医药大学图书馆版权所有

石山醫案

石山醫案

石山醫案

明 陳桷 撰

負恙祇得問之一事而

本去藥方或效或否故

而兼有熱也經曰一勝

亢理之必然陽亢熱動

宜其血得熱而妄行或嗽或吐不免有血此皆陰虛發熱之病理宜滋陰養血清熱潤肺是其治焉此特論其理之常也其中又有變其常者亦當變其常以治之矣經曰衝任二脉為血之海主滲灌谿谷而陽明為之長陽明者胃也或有勞動損其衝任則血不得滲灌而越上於上竅故陽明胃脉亦失所養或飲食無味或食則難飢或惡心嘔吐或胸膈痞悶或大便不常此又初因陰虛而終致於陽虛也夫因陰虛而致陽虛則滋陰降

火之法又難例用當從東垣陽生陰長而用甘溫之劑
矣經曰陽氣者精則養神柔則養筋蓋心主血而藏神
肝主筋而藏血若胃之陽氣有虧是陽氣之精者亦虛
而心神失養不能以主血陽氣之柔者亦損而肝筋失
養不能以藏血心既不能主血肝又不能藏血欲其血
之不安行也難矣此又陰變為陽之病豈可以其陰虛
例治而損其陽也嘗考褚氏遺書有曰人生十六精始
通未及十六而先損其精則骨髓未滿後必有難名之

疾得聞所患已犯褚氏之戒必須遠色節欲以固其本
然後調之以藥以治其末庶幾內外兼修本末兩盡病
之愈也有日矣苟徒恃乎藥而無敬謹之功是謂舍重
就輕欲求病愈難哉四物湯加黃柏知母乃滋陰降火
妙劑若飲食無味或飲食不思此方又難例用須宜兼
用四君子湯仲景曰血虛氣弱宜用人參人參不惟補
氣亦補血也況藥無定性與熱藥同用則熱寒藥同用
則寒今用人參而以寒藥制之人參雖溫亦莫能逞其

勢矣又曰人參補氣今以耗氣之藥監之雖欲補氣亦莫恣其性矣幸毋以南北見疑東垣北人也常用人參考之東垣書可証矣但加減活法在乎病者消息出入如嗽加麥門冬痰加貝母咯血加藕節氣喘加阿膠痞悶加枳實二方相合名曰八物湯兼補血與氣也請與高明議其可否

一人面色蒼白年四十六歲好酒色犬肉三月間因酒連有二夜房事遂病左腹痛甚後延右腹續延小腹

以及滿腹皆痛日夜叫號足不能升卧不能仰汗出
食阻自用脩急丸利二三行而隨止痛仍不減予診
之脉皆細駛右脉頗大於左獨脾脉弦而且滑扶起
診之右脉亦皆細數恐傷酒肉用二陳湯加黃芩山
查麴蘖進之不效再用小承氣湯仍復不利審煎導
之亦不利乃以大承氣湯利二三行痛減未除令其
住藥只煎山查飲之次日煩燥嘔惡渴飲凉水則覺
惡止爽快次早再診脉皆隱而不見四肢逆冷煩燥

不寧時復汗出舉家驚愕疑是房後陰症擬進附子
理中湯予曰此治內寒逆冷也活人書云四逆無脉
當察症之寒熱今觀所患多屬於熱况昨日脉皆細
數面色近赤又無酒後而病六脉遂絕盖由壯火食
氣也四肢者諸陽之本氣被壯火所食不能營於四
肢故脉絕而逆冷也此類傷暑之症正合仲景所謂
熱厥者多寒厥者少急用大承氣湯下之之類向雖
下以大承氣其熱尚有未盡難以四逆湯症與比今

用附子熱藥寧不助火添病耶如不得已可用通脉
四逆湯尚庶幾焉以其内有童便猪膽汁監制附毒
不得以肆其虐也連進二服脉仍不應逆冷不回渴
飲煩躁小便不通糞澹反頻腹或時痛更進人參白虎
湯二貼躁渴如舊更用參朮各三錢茯苓麥門冬車
前各一錢北五味當歸各五分煎服一貼脉漸隱隱
見如蛛絲予曰有生意也仲景論絕脉服藥微續者
生脉暴出者死是也左手左腳亦畧近和不致冰人

右之手足如舊逆冷但口尚渴大便尚溏一日夜約有十數次小便不通余曰渴而小便不利者當利其小便遂以天水散冷水調服三四劑不應再以四苓散加車前山枝煎服二貼小便頗通但去大便而小便亦去不得獨利予曰小便不利煩渴未除蓋由內熱耗其津液也大便尚溏者亦由內熱損其陽氣陽氣不固而然也遂用參朮各三錢茯苓錢半白芍車前門冬各一錢山枝七分北五味五分連進數服至

第九日逆冷回脉復見諸症稍減而向安矣

一人年逾四十面色蒼白平素內外過勞或為食傷則咯硬痰而帶血絲因服寒涼清肺消痰藥至五六十貼聲漸不清而至於啞夜卧不寐醒来口苦舌乾而常白胎或時喉中閣痛或胸膈痛或噯氣夜食難消或手靠物久則麻常畏寒不怕熱前有癰疽後有內痔遇勞則發初診左脉沉弱而緩右脉浮軟無力續後三五日一診心肺二脉浮虛按不應指或時脾脉

輕按閣指重按不足又時或駛或緩或浮或沉或小
或大變動全無定準夫脉不常血氣虛也譬之虛偽
之人朝更夕改全無定準的實之人朝斯夕斯常久
不移以脉叅証其虛無疑虛屬氣虛為重也蓋勞則
氣耗而肺傷肺傷則聲啞又勞則傷脾脾傷則食易
積前疝後痔遇勞而發者皆因勞耗其氣上虛下陷
不能升舉故也且脾喜溫畏寒而肺亦惡寒故曰形
寒飲冷則傷肺以已傷之脾肺復傷於藥之寒涼則

聲安得不啞舌安得不胎胎者仲景謂胃中有寒丹
田有熱也夜不寐者由子盜母氣心虛而神不安也
痰中血絲者由脾傷不能裹血也脾痛噯氣者氣虛
不能健運故鬱於中而噯氣或滯於上則胸痛也遂
用參芪各四錢麥門歸身貝母各一錢遠志酸棗仁
牡丹皮茯神各八分石菖蒲甘草各五分其他山查
麥芽杜仲隨病出入煎服年餘而復益以寧志丸藥
前病日漸愈矣且此病屬於燥熱故白朮尚不敢用

況他燥劑乎

一人年十五色黃悴十二月間忽嘔瘀血一二碗隨止
當請小兒科丁氏調治肌體尚弱常覺頭暈近於三
月間天熱行路出汗逾日又少費力頗倦日是頓然
昏暈不省人事手足擾亂顛倒錯亂將一時久方定
次日亦然續後每日午時前後如期發一次近來漸
早自辰至午連發二次漸至三四次比前稍輕發時
自下焦熱上至胸壅塞則昏暈良久方甦始疑是瘧

或癰醫云火動又云痰症用牛黃丸以竹瀝姜汁磨服二次共四丸又與煎藥多清熱火之劑服後每日只發一次止則汗多口乾食少身熱時多涼時少予脉之皆浮虛洪數不任尋按坐起則覺略小亦不甚數脉書曰數脉所主為熱其症為虛三日後再診左脉小而滑右脉大而滑獨肺部浮軟按之似蟄蟄有聲與昨脉不同者虛之故也夫陽氣者清純冲和之氣也或勞動過度或酒食過傷則擾動其陽變而為

邪熱矣然脾胃以陽氣為主陽變為熱血必沸騰而越出於上矣昏暈者由熱熏灼故神昏暈倒而類風也風之旋轉運動與火相類每覺下焦熱上乃脾火塞而即發者脾脉從足入腹至胸今下焦熱上乃脾火也然胸膈心肺之分為陽之位清陽居上而邪熱擾之則陽不得暢達而心肺之神魄不免為之而昏亂矣况五臟皆賴胃氣以培養胃受火邪則五臟皆無所禀而所藏之神亦無所依故肺之魄心之神肝

之魂脾之意腎之志安得不隨之潰亂躁擾而昏瞀耶多發於午前後者乃陽氣所主之時陽為邪擾不能用事故每至其時而輒發也且汗多津液泄口乾津液少醫用牛黃硃砂琥珀南星半夏等而復燥之是愈益其燥故暫止而復發不能拔去其病根也因取參芪各二錢半遠志山查川芎黃芩各七分天麻茯苓麥門各一錢甘草陳皮各五分歸身八分白朮一錢半煎服十餘貼而病不復發矣