

内部学习参考资料

中医常用方剂新编

胡友梅 編著

福建省中医研究所



1957

目 录

(一) 發熱型病

(一) 發汗解熱藥..... (3)

- | | | |
|-------------|--------|----------|
| 1. 麻黃湯 | 2. 桂枝湯 | 3. 九味羌活湯 |
| 4. 荊防敗毒散 | 5. 香蘇飲 | 6. 葛根湯 |
| 7. 銀翹散 | 8. 桑菊飲 | 9. 香薷飲 |
| 10. 麻黃附子細辛湯 | | |

(二) 清涼解熱藥..... (4)

- | | | |
|-----------|------------|-----------|
| 11. 白虎湯 | 12. 白虎加人參湯 | |
| 13. 清瘟敗毒飲 | 14. 活血解毒湯 | 15. 黃連解毒湯 |
| 16. 清燥湯 | 17. 竹叶石膏湯 | 18. 小柴胡湯 |
| 19. 達原飲 | 20. 清脾飲 | 21. 秦艽扶羸湯 |

(三) 瀉下解熱藥..... (7)

- | | | |
|-------------|-----------|-----------|
| 22. 大承氣湯 | 23. 小承氣湯 | 24. 調胃承氣湯 |
| 25. 承氣養榮湯 | 26. 脾約麻仁丸 | 27. 增液湯 |
| 28. 增液承氣湯 | 29. 涼膈散 | |
| 30. 減味防風通聖散 | | |

(二) 神經型病

(一) 精神錯亂藥..... (9)

- | | | |
|-----------|-----------|---------|
| 31. 安宮牛黃丸 | 32. 紫雪丹 | 33. 清宮湯 |
| 34. 溫胆湯 | 35. 礞砂安神丸 | 36. 礞砂丸 |
| 37. 龍胆瀉肝湯 | | |

(二) 局部疼痛藥..... (11)

38. 黃芪桂枝五物湯

39. 括蕒薤白半夏湯

40. 烏頭湯

41. 川芎茶調散

42. 獨活寄生湯

43. 五積散

44. 三仁湯

45. 羌活勝濕湯

46. 當歸拈痛湯

47. 丹溪疝氣丸

(三) 神經衰弱藥..... (16)

48. 酸棗仁湯

49. 逍遙散

50. 天王補心丹

51. 歸脾湯

52. 養心湯

53. 六味丸

54. 八味丸

55. 金鎖固精丸

(三) 消化型病

(一) 胃部疾患藥..... (17)

56. 黃連湯

57. 半夏瀉心湯

58. 小半夏加茯苓湯

59. 代赭旋復湯

60. 吳茱萸湯

61. 平胃散

62. 香砂平胃散

63. 六君子湯

64. 香砂六君子湯

65. 藿香正氣散

66. 保和丸

67. 人參養榮湯

(二) 腸部疾患藥..... (19)

68. 大柴胡湯

69. 芍藥湯

70. 黃芩湯

71. 五苓散

72. 胃苓湯

73. 理中湯

74. 溫中補脾湯

75. 參苓白朮散

76. 白朮翁湯

77. 烏梅丸

(四) 循環型病

(一) 心悸亢進藥..... (22)

78. 真武湯

79. 桂枝芍藥知母湯

- 80.炙甘草湯 81.加減復脈湯 82.三甲復脈湯
83.當歸芍藥散 84.越婢湯 85.越婢加半夏湯
86.木防已湯 87.瀉心湯

(二)心臟衰弱藥..... (25)

- 88.四逆湯 89.當歸四逆湯 90.回陽救急湯
91.生脈飲 92.補中益氣湯 93.清暑益氣湯

(五)呼吸型病

(一)呼吸困難藥..... (26)

- 94.桂枝加厚朴杏仁湯 95.蘇子降氣湯
96.黑錫丹 97.定喘湯
98.葶藶加滑石杏仁湯

(二)咯痰咳嗽藥..... (28)

- 99.麻杏甘石湯 100.大青龍湯 101.小青龍湯
102.養陰清肺湯 103.清燥救肺湯 104.瀉白散
105.百合固金湯 106.甘露飲 107.麥冬湯
108.五味子湯 109.二陳湯 110.杏蘇飲

(六)泌尿型病

(一)身體腫脹藥..... (31)

- 111.黃芪防已湯 112.防已茯苓湯 113.五皮飲
114.實脾飲 115.資生腎氣湯

(二)其他尿量減少藥..... (32)

- 116.五淋散 117.萆薢分清飲 118.導赤散
119.白茯苓丸

(七)血液變動等病

(一)紅、白血球調整藥..... (33)

120.黃芪建中湯 121.當歸補血湯

(二)各種出血藥..... (34)

122.黃土湯 123.犀角地黃湯 124.四生飲

(八)皮膚及粘膜異常等病

(一)斑疹藥..... (35)

125.升麻葛根湯 126.三黃石膏湯 127.化斑湯

128.消斑青黛湯

(二)黃疸藥..... (36)

129.茵陳蒿湯 130.茵陳五苓散 131.黑疸湯

132.薏米竹葉湯

(九)脾臟腫大等病..... (37)

133.莪朮湯 134.蟹甲飲

135.大柴胡加芒硝湯 136.淨府散

(附)婦科病..... (38)

137.四物湯 138.八珍丸 139.安衝湯

140.保生無憂散 141.安胎飲 142.芎歸散

143.生化湯 144.失笑散 145.涌泉散

中医常用方剂新解

(一) 发热型病

因病毒影响，体温中枢失其调节，乃呈发热现象，以热型差异，与发热程度不同，及病者体质之强弱，而用药各有区别。

(一) 发汗解热药 刺激汗腺神经，使皮肤之水分排出，而体温因以放散（凡发汗较强之药，稽留性热病当忌用）。

(1) 麻黄汤 发汗重剂兼能止喘（伤寒论方）

麻黄三钱 桂枝二钱 杏仁廿三枚 炙草一钱

（解释）此方为治感冒，发热，恶寒，无汗，头痛及身痛而喘。麻黄发汗力甚强，又可止喘，为本方主药，方内有桂枝以发汗，又有杏仁以止喘，但系强汗之药，凡稽留性热病当忌用。西医有麻黄素，为专供止喘之用，惟其有发汗的副作用，视病者状况，不可过用重量。

(2) 桂枝汤 发汗药，兼能止呕（伤寒方）

桂枝 白芍各三钱 炙草二钱 生薑三片 红枣三枚

（解释）此方为感冒，发热，自汗，恶风，兼有干呕之良药。桂枝有解热发汗镇痛健胃强心诸作用，白芍为镇痛解热药，本方药性较为和缓，故温病条辨亦采用之。

(3) 九味羌活汤 感冒通用之发汗药

羌活 防风 苍朮各一钱五分 白芷 川芎 黄芩 生地 甘草各一钱 细辛九分 加生薑 葱白煎服

（解释）此方治头痛，项强，恶寒，发热，无汗，全身疼

痛。方內羌活、防風、川芎、白芷、均為發汗止痛藥，黃芩消炎，蒼朮健胃，惟生地乃清涼解熱劑，舊時用之，以代麻黃湯（治無汗之熱病），但稽留性熱病，亦不相宜。

（4）荊防敗毒散 感冒發汗之輕劑

荊芥 防風 茯苓 枳殼 桔梗 柴胡 前胡 羌活 獨活 川芎各一錢 甘草五分 加生薑煎 煩熱口渴加黃芩 治疫痢（即噤口痢）加蒼朮。

（解釋）此方治感冒，頭痛及氣管支發炎等。舊用以代桂枝湯，（治有汗之熱病）于流行性感冒最宜。方內荊、防、羌、獨、系發汗止痛藥，柴、前亦可退熱，川芎鎮痛，桔梗除痰，枳殼、茯苓稍能健胃。因其排泄汗液之力輕微，心臟衰弱者亦不為害。

（5）香蘇飲 治感冒輕症，兼能調經。

紫蘇葉二錢 香附 陳皮各一錢五分 甘草一錢 加薑蔥煎服。

（解釋）此方以紫蘇為主藥，解熱力甚微，香附、陳皮、皆有健胃作用，昔人亦用以代替麻黃桂枝諸湯，其實蘇葉、香附、均為調經之妙品，于婦人行經期內感冒，用之頗合，或加藜蘆、荊芥、川芎、蔓荊各一錢、稱為加味香蘇飲、治發熱頭痛、有效。

（6）葛根湯 為胃腸型感冒發汗藥（傷寒方）

葛根四錢 麻黃三錢 桂枝 白芍 甘草各二錢 薑棗同煎服。

（解釋）治發熱，無汗，下利，小便短少等症。方內葛根、麻黃、均能發汗。桂枝、白芍、亦可退熱。又各有其有利的副作用（如葛根兼止瀉，麻黃兼利尿，桂枝兼健胃，白芍兼鎮痛），在腸炎初病多取之。

(7) 銀翹散 為溫病初起主藥(溫病方)

連翹 銀花各一兩 桔梗 薄荷 牛蒡各六錢 荊芥穗 淡竹叶各四錢 甘草 淡豆豉各五錢 研為散 每服六錢 鮮葦莖湯煎服

(解釋)治溫病發熱。方內銀花、豆豉、荊芥、均能解熱，薄荷鎮痛，桔梗除咳，竹叶利尿，連翹，牛蒡消炎，吳鞠通制此以代麻黃湯(治無汗之熱病)，比之九味羌活湯，更為穩當。于稽留性熱病可以適用。

(8) 桑菊飲 輕症溫病藥(溫病方)

菊花 杏仁各一錢 連翹一錢五分 桑葉二錢五分 桔梗 葦莖各二錢 薄荷 甘草各八分

(解釋)治輕症熱病，于氣管支及喉頭發炎更宜，方內桑葉、菊花、連翹、均能解熱，惟效力甚微，桔梗、杏仁治咳，葦莖止喘，薄荷鎮痛，昔人以代桂枝湯(治有汗之熱病)，于呼吸型熱病，最為適合。

(9) 香薷飲 為中暑良藥(局方)

香薷 厚朴 扁豆 加黃連即黃連香薷飲

(解釋)為暑期感冒發汗藥兼治胃腸發炎，方內香薷為發汗利尿解熱祛暑藥，厚朴，扁豆，皆能健胃。且朴兼利尿，扁兼止瀉，在夏天消化力衰弱時，用之最宜。

(10) 麻黃附子細辛湯 為心臟衰弱人發熱不退之良藥(傷寒方)

麻黃，細辛各二錢，附子一錢(細辛用量宜減少至一錢以下)

(解釋)治顏面及坐骨神經痛，凡局部冷感顏色蒼白脈沉者用之。方內用麻黃發汗，又用附子強心。(以防虛脫)佐以鎮痙之細辛，凡體弱之人，因發熱不退而痙攣或疼痛者，每著

奇效。

(二) 清涼解熱藥鎮靜血液循環，減退體溫亢進。

(11) 白虎湯 為自汗口渴之熱性病要藥（傷寒方）

(12) 白虎加人參湯 為衰弱性熱病藥（傷寒方）

石膏八錢 知母三錢 粳米四錢 炙草一錢 即白虎湯
加人參即人參白虎湯 亦稱白虎加人參湯

（解釋）白虎湯于口大渴，汗大出，發高熱時用之，方中石膏、知母、為退熱良藥，而石膏不但退熱，并能鎮靜循環與神經，此外粳米滋養，甘草矯味，凡心悸，詭妄，口渴，疼痛，痙攣之由于高熱者，無不見效。于胃炎，肺炎，及斑疹傷寒尤宜。人參白虎湯，因加有人參能生津液，糖尿病多用之。于結核性熱病亦有效。

(13) 清瘟敗毒散

生石膏八錢——八兩 生地二錢——一兩 犀角二錢——六錢 川黃連一錢——四錢 以上為主藥。尚有桔梗，梔子，黃芩，赤芍，知母，元參，連翹，甘草，丹參，竹葉等十味，視病情酌量增加。

（解釋）此方由余師愚創造，經很多名醫採用收效，于高熱不退時，最為適合，其主藥為石膏，石膏解熱作用未詳，但含有鈣質，能減輕骨骼肌之興奮與減少血管之通透能，故具有消炎作用，生用與煨用功效相同，其次生地，據近人試驗用中量有強心作用，用小量使血管收縮，用大量反使血管擴張，但它也有利尿作用，其他如犀角之鎮靜，黃連之殺菌，亦用大量，惟連翹、黃芩、赤芍、知母均有抗生力量，而與元參（涼血）丹參（去瘀）梔子，竹葉（皆能利尿）各品，視症狀輕重，隨意配合，亦有輔助之力。

(14) 活血解毒湯

連翹三錢 紅花 生地各五錢 桃仁八錢 赤芍 柴胡
葛根 甘草各二錢 當歸一錢五分 厚朴一錢

(解釋)此方為治療鼠疫而設，但近人利用之治出血性各病(如腸出血，出血性胃潰瘍等)，每著奇效，蓋連翹、赤芍、當歸、厚朴、近經劉國聲氏試驗，具有抗生作用，桃仁、紅花、生地舊稱為去瘀生新要品，柴胡，葛根雖能發汗退熱，但性屬偏涼，甘草用量比他劑為多，亦借以清熱解毒，並非專供矯味之用。

(15) 黃連解毒湯

黃芩 黃連 黃柏 梔子各一錢 水煎冷服

(解釋)此方治嘔吐不眠，吐衄，斑黃、躁狂大熱等症，除梔子外，其他各品，均經劉國聲氏試驗：認為抗生力量較強之藥，且亦均有消炎和健胃作用，而梔子，黃連，黃柏兼有鎮靜之力，故于熱性病之頭腦昏亂，非由胃腸障礙者(大便秘結)用之有效，崔尚書有大便秘而錯語者用承氣湯，大便通而錯語者用本湯，確系經驗之談。

(16) 清燥湯

元參三錢 麥冬五錢 生地 知母各二錢 人中黃一錢五分

(解釋)元參、麥冬、生地，本為增液湯組成品，本方加知母以退熱殺菌，還兼有消炎利尿潤腸諸作用，人中黃為甘草粉侵入人糞中的制劑，舊以治痘疹余毒，及濕熱瘡瘍等，此方于熱性病神經錯亂，每著奇效。徐靈胎以人中黃入丸劑為妙，“國醫砥柱”曾介紹云：人中黃雖穢，不可廢棄。但余曾以光蠶、蟬退、全蝎代人中黃。

(17) 竹葉石膏湯 為熱病后期要藥(傷寒方)

竹葉二錢 石膏八錢 麥冬一兩 半夏一錢五分 甘草一

錢 人參一錢五分

（解釋）此方治胃腸性熱病。凡糖尿病及肺結核等亦用之。方內石膏有鎮痙退熱之力。麥冬為祛痰藥。竹葉利尿，半夏止嘔，再加以健胃之人參，故在熱病末期，最著成效。

（18）小柴胡湯 治消化性感冒及瘧疾（傷寒方）

柴胡四錢 人參 黃芩 炙草 生薑各一錢五分 半夏二錢 棗三枚

（解釋）小柴胡湯為寒熱往來專藥，柴胡、黃芩，均能退熱，半夏、生薑，均能止嘔，而半夏兼可治咳，棗、草有矯味作用，凡肺炎，氣管支炎，干濕性肋膜炎，腸傷寒，糖尿病，胃痛，胸脅苦悶等症，均能收效，初病多去人參。

（19）達原飲 為胃腸型熱病藥，并治惡性瘧疾

檳榔 黃芩各二錢 厚朴 知母 芍藥各一錢 草果 甘草各五分

（解釋）白芍、檳榔、知母、黃芩、均可退熱。而白芍堪止疼痛，知母兼止痰嗽，黃芩促進胃酸，檳榔能除蟻蟲，此外如厚朴，草果，又能利尿健胃。吳又可制此，謂可通治溫疫各病，近人瘧疾亦有用之。

（20）清脾飲 為瘧疾要藥（嚴用和方）

青皮 厚朴 柴胡 黃芩 半夏 茯苓 白朮 草果 甘草 加薑煎服，瘧不止加常山 烏梅 大渴加麥冬 知母

（解釋）此方就小柴胡湯藥料（柴胡、黃芩、半夏等）去人參加健胃之青皮、草果、與利尿之厚朴、白朮、茯苓、既可增加營養，又能使病毒由新陳代謝以解，故效用甚佳。

（21）養元扶羸湯 治久咳及各種虛性熱（直指方）

秦艽 鱉甲 地骨皮 當歸 人參各一錢五分 柴胡 紫苑 半夏 炙草各一錢 加薑、棗煎服。

(解釋) 藜蘆、地骨皮、柴胡、鱉甲、皆能退熱，又有人參健胃，當歸行血，紫苑、半夏、除痰止咳，故于肺結核之消耗熱，用之有效。腸傷寒稽留日久，亦可照服。

(三) 瀉下解熱藥 刺激腸粘膜，促進大腸蠕動，逐去腸內容物，而體溫因以下降。(凡稽留性熱病用之須慎重)

(22) 大承氣湯 治便秘之峻下劑

(23) 小承氣湯 治同大承氣，藥力較微

(24) 調胃承氣湯 治同大小承氣，藥力稍緩。

大黃四錢 厚朴 枳實各三錢 為小承氣湯

大黃二錢 厚朴四錢 枳實 芒硝各二錢 為大承氣湯

大黃四錢 芒硝三錢 炙甘草二錢 為調胃承氣湯

(解釋) 大黃瀉下力弱，芒硝較強，厚朴、枳實皆健胃藥，故無芒硝者為小承氣。有芒硝者為大承氣。去厚朴、枳實、而仍用大黃、芒硝、并以甘草緩和之，即成為調胃承氣矣。應用之際，小承氣最輕，大承氣最重，調胃承氣介在兩者之間，視病勢輕重、病程久暫，體格強弱，分別主之。

若加桃仁(行血)，桂枝(健胃)，于調胃承氣湯之中，即桃仁承氣湯。在熱結膀胱，(小腹脹，小便自利，發狂，旧稱膀胱蓄血症)亦可用之。

(25) 承氣養榮湯 體弱人瀉下退熱藥

(26) 脾約麻仁丸 慢性便秘藥

枳實 厚朴 當歸 大黃 白芍 知母 生地 各等分煎服，即承氣養榮湯。

白芍 大麻仁 杏仁 枳實 厚朴各五錢 大黃十兩 煉蜜為丸，如桐子大，白湯送下二十九，即脾約麻仁丸。

(解釋) 承氣養榮湯，乃就小承氣原方藥料，加潤腸之歸、芍，解熱之知母，生地而成，吳又可創此，有寓瀉于補之意。

脾約麻仁丸，亦就小承氣藥料，加滋潤之白芍、麻仁、杏仁，以免腸部多受刺激，故為丸常服，可不為害。

(27) 增液湯 滋潤輕瀉藥

(28) 增液承氣湯 應用同上瀉下力較強

元參一兩 麥冬(連心)六錢 生地八錢 煎服，為增液湯。

上方加大黃三錢 芒硝一錢五分 即增液承氣湯。

(解釋)生地、元參、系強壯退熱藥，麥冬亦緩和滋養品，而皆有潤腸之力，各種熱病中末期體液缺乏症，用增液湯最宜。但恐瀉下力太弱，仍加硝黃，因稱之為增液承氣湯云。

(29) 涼膈散 為身體上部解熱消炎藥(局方)

(30) 減味防風通聖散 為發汗消炎解熱良藥。

連翹一錢五分 大黃 芒硝 甘草各一錢 梔子 黃芩 薄荷各五分 竹葉七片 蜂蜜一匙，為涼膈散。

大黃 芒硝 防風 荊芥 麻黃 連翹 白芍 黃梔 當歸各五分 黃芩 桔梗 石羔各一錢 甘草二錢 滑石三錢 為減味防風通聖散

(解釋)涼膈散就大黃、芒硝瀉藥中，加止痛之薄荷、利尿之竹葉、解熱之連翹、黃芩、梔子、于熱在上部，可由瀉下以解。

減味防風通聖散，系就涼膈散各藥中，去竹葉、薄荷、蜂蜜、加荊芥、防風、當歸、白芍、石羔、滑石、桔梗、麻黃、甘草、而成。劉河間制為防風通聖散，以解利四時正令傷寒，陳修園最賞用之。原方有薄荷、白朮、川芎、生薑、葱白、近人主張減去，以免復雜之害，凡感冒初中期之發熱，(連翹、黃芩石羔可以退之)，頭痛，(荊芥、防風、可以止之)，尿短(滑石、梔子可以利之)，便澀(芒硝、大黃、芍藥、當歸

可以通之)，呼吸困難（桔梗、麻黃可以平之）各症，可以統治。

發熱型病方劑應用說明

以上各方，皆退熱要藥，惟因熱型不同，用藥各須注意。如為稽留性熱病（如腸傷寒，副傷寒，斑疹傷寒，大葉肺炎，乙型腦炎，猩紅熱、麻疹、痘瘡等），均不可用發汗劑。只可就清涼解熱藥酌量採取。（但熱在攝氏四十度以上，持續時間過久不退者，不得已亦可用少量發汗劑，此是例外）又在稽留熱期內，通下解熱藥，亦在所必禁。若便秘過久，以增液湯等輕瀉之品少服，尚不為害。

（二）神經型病

輕者現頭痛眩暈失眠，重者昏迷詭妄。

（一）精神錯亂藥 主要作用，是使藥力進入神經中樞，平抑大腦的精神亢進，及其他運動的機能，以收鎮靜之效。

（31）安宮牛黃丸 為鎮痙退熱藥（溫病方）

牛黃 郁金 犀角 黃連 硃沙 山梔 黃芩 金箔（為衣）各一兩 梅片 射香各二錢五分 真珠五分 研末，煉蜜為丸，每丸重一錢。脈虛者人參湯送下，脈實者銀花薄荷湯送下。

（解釋）牛黃、梅片、硃沙、真珠、為鎮痙貴品，梔、芩解熱，犀、射強心，黃連消炎，郁金助血液氧化，此方退熱安腦之力，中藥無出其右，治熱病神昏詭語，素著奇效。

（32）紫雪丹 鎮痙退熱藥（溫病方）

磁石 朴硝 硝石各二斤 滑石 石膏 寒水石 升麻 元參各一斤 羚羊角 犀角 木香 沉香各五兩 丁香 麝香

各一兩 炙草八兩 辰沙三兩 制丹 冷水調服三錢

(解釋)此方石羔、元參、犀角，為解熱藥，丁香、升麻、沉香、辰沙、磁石、寒水石、羚羊角，為鎮痙藥，此外如木香健胃，麝香興奮，滑石利尿，朴硝瀉下，硝石止痛，各有其相當作用。治神昏語之熱病，于腦膜炎，腦充血均宜，其涼性在安宮牛黃丸之次。

(33) 清宮湯 鎮痙退熱輕劑(溫病方)

元參 麥冬各三錢 竹叶心 連翹心 犀角各二錢 蓮子心五分 熱痰多加竹瀝 梨汁 熱盛加入中黃 神昏加銀花 薄荷叶 石菖蒲

(解釋)元參、麥冬均系涼血和血之品，佐以利尿之竹叶、健胃之蓮子、變質之連翹、鎮痙之竹瀝、犀角、既能安靜大腦，又可使體溫下降。故急性發熱，神昏等用之。

(34) 溫胆湯 為鎮痙輕劑

半夏 陈皮 茯苓 甘草 竹茹 枳實

(解釋)此方由二陳湯加味而成，二陳湯既為健胃除痰止咳常用之藥，加枳實效果更著，可以助消化，又加治驚癇吐衄之竹茹，于安腦退熱甚宜，故神經性胃病，用之最合。

(35) 硃砂安神丸 鎮靜退熱輕劑(東垣方)

硃砂五錢(另研) 黃連五錢 生地三錢 當歸 甘草各二錢 為末，酒泡，蒸餅，如麻子大，硃砂為衣，每服三十丸，臨臥時口津下。

(解釋)硃砂為鎮痙藥，具有變質作用，舊稱為治癲癇上品，本方輔以清血之生地，行瘀之當歸，而黃連用量與硃砂同。考黃連阿膠湯治神昏語妄，傷寒論早已用之，今以配合此方，于神昏驚悸怔忡等神經性疾患採取者，本古人意也。

(36) 磁硃丸 治神經衰弱之眼花(即內障)癲癇等。

磁石二兩 硃砂一兩 神耑三兩 以神耑一兩和水作餅煑沸入前藥，煉蜜為丸，如梧子大，每服五至十九，開水送下。

（解釋）磁石為補養鐵劑，硃砂性同水銀、可以變質，且有鎮靜之力，輔之以消化最有力之神耑，故可為衰弱性神經病良藥，于眼內障，癲癇，均有奇效。

（37）龍胆瀉肝湯 消炎安腦藥（東垣方）

黃芩 梔子 柴胡 澤瀉各一錢 車前 木通各五分 當歸 生地 龍胆 甘草各三分

（解釋）梔子、黃芩、柴胡為退熱藥，澤瀉、車前、木通均能利尿，龍胆、當歸、生地又能健胃強心，今人以治神昏等腦症狀者，蓋亦利用其消炎之力耳。凡腦膜炎，結膜炎，膀胱炎，均主之。

（二）局部疼痛藥 疼痛是人體表皮或深部的痛衝動，鎮痛藥對於疼痛感覺中樞有選擇性的抑制作用，若用大量，對於其他中樞，也有抑制效能，此等方劑，是指部分的鎮靜藥，具有止痛作用者而言。

（38）黃耆桂枝五物湯 治運動神經麻痺（傷寒方）

黃耆，芍藥各三錢，桂枝二錢，生姜四錢，加棗煎。

（解釋）此方照桂枝湯藥味，只加黃耆，黃耆為補養利尿藥，有增加體力，振奮精神之作用。用以治運動神經麻痺（即身體不仁）有效。

（39）括蕒薤白半夏湯 治肋間神經痛（傷寒方）

薤白（去白） 半夏各三錢 白酒一杯 括蕒實二錢 同煎。

（解釋）括蕒、半夏、為祛痰鎮靜要藥，薤白則有止痛健胃之功，肋間神經痛舊稱胸痹，此方最為適用，胃痛亦主之。

(40) 烏頭湯 治各种神經痛劇藥(伤寒方)

麻黃 芍藥 黃耆各三錢 川烏二錢 煎服。

(解釋)此方治關節痛，肌肉痛，顏面及坐骨神經痛，運動神經麻痺，以烏頭鎮痛最力之藥，配芍藥效果甚佳，兼益氣之黃耆，發汗之麻黃，近人腹痛脚氣亦多用之，(烏頭功用与附子同，頗有毒性，惟治風之力較大)。

(41) 川芎茶調散 治頭痛良藥(局方)

川芎 荊芥各四錢 薄荷三錢 羌活 白芷 炙草各二錢 防風一錢五分 細辛一錢 研末，每服三錢，茶調下，加菊花 蠶蛭 称菊花茶調散。

(解釋)此方集許多止痛之品，如荊、防輕微發汗，芎、芷兼驅頭風，此外細辛治眼，薄荷理胃，羌活達遍周身，旧用以治目昏，鼻塞，偏正頭風，凡感冒頭痛及神經性頭痛皆主之。

(42) 獨活寄生湯 治風湿骨痛及肢體麻痺(千金方)

獨活 桑寄生 秦艽 防風 細辛 川芎 當歸 白芍 熟地黃 桂心 茯苓 杜仲 牛膝 人參 甘草等分 每服四錢

(解釋)此方略仿十全大補丸藥料(缺黃耆、白朮)加杜仲、牛膝、防風、秦艽、細辛、獨活、寄生、各种鎮痛之品。于麻痺中，寓有補養意，旧称可治風寒湿三痹，即急慢性風湿藥也。但脚氣亦用之。

(43) 五積散 为感冒头身疼痛通用之藥(局方)

當歸 麻黃 蒼朮 陳皮各一錢，厚朴 干薑 芍藥 枳壳各八分 半夏 白芷各七分 桔梗 茯苓 肉桂 人參 炙草各五分 川芎四分

(解釋)此方用麻黃退熱，當歸補血，半夏、桔梗祛痰，