

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百十一



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷二百一

周王朱橐撰

痢門

冷熱痢

附論

痢者由脾胃虛弱宿食不化而為客熱所傷冷熱
成其痢生黃赤白五也若熱得于血血滲腸間則變
血痢也冷氣入腸內搏津液則津液變化隨氣滯下

變成白痢也其法屢試不另有正方補養宣導今附于

後養生方導引法云泄下有寒者微噓作引氣以息內腹徐吹息以鼻引氣氣足腹間即愈其有熱者微呼以去之也

黃連散

出聖惠方

專治冷熱痢心腹疔痛不止

黃連

一兩

龍骨

二兩

木香

五錢

當歸

一兩

赤芍藥

一兩

訶梨勒

一兩五錢

赤石脂

五錢

乾薑

一兩

甘草

五錢

右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

阿膠丸

出聖惠方

專治冷熱不調痢下膿血不止腹痛不可

忍

阿膠

一兩
搗碎 乾薑 一兩
炮

木香

一兩 龍骨 二兩 赤石脂 二兩

黃連

一兩
去皮 當歸 一兩 黃芩 一兩 厚朴 一兩
去粗皮

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候

以粥飲下三十丸

木香散

出聖惠方 專治冷熱痢虛損腹痛不能飲者日漸進

之

木香

半兩
兩 甘草 半兩
炙

乾薑

半兩
炮

白朮

三分
兩 黃芩 半兩

白朮分三當歸分三黃連分三乾熟地黃分三

右為散每服三錢以水一盞煎至五分去滓不計時候溫服

二黃丸 治無問冷熱新舊痢

黃連 黃蘗 乾薑 甘草 艾三月三日者
熟各八分

附子三枚
蠟子大烏梅肉
熬八分

右搗篩為末以蜜和蠟於鐺中熬再入黃蜜須候蠟鎔盡如乾益蜜丸空腹以飲服四十九日二漸加至

五六十丸忌海藻松菜猪肉冷水

歸連丸

治痢無問冷熱及五色痢入口即定

黃連

四分

黃蘗

當歸

黃芩

各二兩

阿膠

二兩炙

熟艾

一兩

右搗羅為散以醇醋二升煮膠烱下藥煮令可丸如

大豆飲服七八分日二夜一服若產婦痢加蒲黃一

兩蜜和為丸

犀角散

出聖惠方

主治冷熱痢不止腹肚疼痛心神煩悶

犀角屑一兩白朮一兩黃連去鬚一兩當歸判一兩地榆判一兩

木香半兩

右搗麤羅為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓

不計時候服

訶梨勒散出聖方主治冷熱痢煩悶不欲飲食

訶梨勒煨用皮當歸判微炒黃連各一兩甘草半兩炙

木香半兩乾薑半兩炮

右為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓不計時

候溫服

附子散

出聖惠方

主治冷熱痢腹痛不能飲食

附子

炮裂去皮

黃連

去鬚微炒

龍骨

地榆

各一兩剉

當歸

三分剉

木香

兩半

右細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

黃連丸

出聖惠方

專治冷熱痢心神煩悶腹中疴痛

黃連

去鬚

黃蘗

剉微炒

艾葉

微炒

赤芍藥

各二兩

當歸

二兩剉

羚羊角

屑一兩

右搗羅為末煉蜜和搗三二萬杵丸如梧桐子大每

服不計時候以粥飲下三十丸

厚朴丸出聖惠方主治冷熱不調下痢不止

厚朴一兩半黃連一兩半乾薑半兩甘草半兩
去粗皮
去鬚
炮
炙

龍骨半兩赤石脂半兩

右搗羅為末煉蜜和搗百餘杵丸如梧桐子每服不

計時候以粥飲下三十丸

香豉湯出聖惠方治療下焦冷熱不調暴下赤白痢

香豉

一升

白朮

六兩

薤白

切一升

蜀升麻

二兩

右以水七升煮取二升半為二服忌桃李雀肉等

生犀散

治無問生冷熱及膿血痢

生犀角屑

黃蘗

黃連

苦參

各二兩

右為散以糯米煮作飲莫令生每日空腹服一方寸

日再服便瘥勿輕之肘後方有當歸產後有當

膠連丸

治痢無問冷熱赤白久新疳溫

阿膠

三兩一兩炙一兩入藥一兩銷清作膠

胡黃連

一兩乾薑二兩

入黃無食子

一枚久痢腸滑甚者加至三四枚

右為末以醋鎔膠清丸如梧桐子大飲服二十五丸

日再漸加三十丸老小者以意斟酌禁加常法若冷

痢以酒下熱痢以粥飲下

內補丸

一名黃連丸

主治冷熱氣不和腹痛下痢不止及通

血氣五百七十九

黃連

一兩去鬚炒

當歸

三分剉炒

乾薑

半兩炮

阿膠

三分碎炒

搗

右為末煉蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大每服不計

時候以粥飲下三十丸日再服一方以醋煮膠令消

衆手撚圓又療產婦下痢不止者服之甚驗忌生冷

粘膩出十便良方

甘草湯一名三神湯治冷熱痢心神煩渴腹痛胃膈滯悶出

便良方

甘草二寸炙烏梅肉五枚微炒訶梨勒五枚煨用皮

右剉以水一大盞煎至六分去滓食前溫二服

當歸湯出聖惠方治冷熱氣不和腹痛下痢不止

當歸一兩判 黃連一兩去
微炒

右細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

加減當歸地榆散 治冷熱不調氣毒惡毒溫熱傷候

毒痢休息宿痢腥穢乾嘔不食肌熱小便澀

御米殼二兩 當歸一兩 地榆 黃連揀淨 芍藥

甘草炒各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服食

前進二服氣毒痢加黃連當歸一倍

治冷熱痢疾出本
事方

罌粟殼二十個 白薑三錢 甘草五錢 艾葉半兩

右呔咀分作三服每服入蜜用水一盞煎至七分空心溫服

和中散 治冷熱痢腹痛裏急

附子炮七度水浸去皮為末 黃連去鬚各一兩為末 乳香研一分

右如患冷熱痢取黃連附子各半錢乳香一字以陳米飲調下未止再服以青橘皮湯調下如患赤痢附

子末半錢黃連末一錢乳香一錢如患白痢黃連末半錢附子末一錢乳香一字米飲調下未止加黑豆七粒煎湯止之

治冷熱不調或水或膿或五色血者

出千金方

用酸石榴五枚合殼子搗絞取二升汁服五合差又一方糞前有血令人面黃色用皮搗為末加梔子湯下小兒以意服之治冷熱痢用甜菜搗絞汁服之

堅腸丸

出十便良方

治一切痢疾不問赤白膿血並治

方見本門

楊子建萬金護命方

通建一方十四方

今有人患痢其脉微小再

再尋之又沉而瀋此之一候若下白痢其勢雖重庶幾

可治若是下血切忌發熱通身發熱者死熱見七日死

已上所陳雖未足以達痢之淵源亦足以明其粗迹議

者謂如子所言以明自甲子至于癸亥每六十年中未

嘗有一年不生痢疾今世人所患痢疾于數年中間忽

止有一年其故何也答曰六十年中未嘗有一年無木

土相攻未嘗無土火相鬱未嘗無水火相犯但五運之

政譬如權衡一年間五行氣數更相承制得其平等則其疾自然不作忽一氣太過一臟有餘痢疾之生應不旋踵予故脩陳粗畧以開後學之未悟庶幾診療之間無差悞之過者矣但毒痢傷人不一惟水邪犯心為重世人初患痢時先發寒熱投藥治之其熱不退發熱甚大食則嘔逆下痢不止心熱如火只要入涼處只思吃冷水忽思狂走渾走肌肉疼痛着手不得此候十難治其三四也治疫毒痢方須是仔細首尾讀此方論分明