

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷七十五



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩

卷之五

婦科

經水不調

經水不調

明 王肯堂 撰

二經皆主於血血虧則

補云先聲而生諸情也經曰東方青色入通於肝其病

發驚駭又曰二陽一陰發病主驚駭驚者心卒動而恐怖也悸者心跳動而怔忡也二者因心虛血少故健忘之證隨之用四物安神之類丹溪謂亦有屬痰者宜用溫膽湯加辰砂遠志之類若思慮便動虛也用養心湯時作時止痰也用茯苓丸觸事易驚心膽虛怯也用溫膽湯卧驚多魘血不歸源也用真珠母丸夢寐不寧肝魂失守也用定志丸恐懼不能獨處膽氣虛冷也用茯苓湯睡卧煩躁膽氣實熱也用酸棗仁丸眩運驚悸風

痰內作也用本事辰砂遠志丸思慮鬱結脾虛氣滯用
歸脾湯前證雖曰屬心與肝而血之所統實主於脾脾
之志曰思思慮多則血耗損而不能滋養於肝心者脾
使之也思慮內動未嘗有不役其心者夫心為君火之
藏十二宮之主也夫君之德不怒而威無為而治故宜
鎮之以靜謐戒之以妄動動則相火翕合煽爍陰精精
血既虧則火空獨發是以驚悸怔忡之所由生五志之
火心所不能制者矣故治脾者不可不知養心養心者

不可不知鎮靜而寡欲然人孰無思也思之正則無妄動之欲矣朱子曰必使道心常為一身之主而人心每聽命焉此善養於心者也

溫膽湯 治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣悸乏或復自汗膽虛不能制脾則脾之水飲作矣

半夏

湯洗

竹茹

枳實

麩炒

橘皮

去白各二兩

甘草

炙一兩

白

茯苓

一兩半

右每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分食前服

寧志丸 治心虛多驚若有痰宜吐之

人參 白茯苓 茯神 栢子仁 琥珀 當歸

酸棗仁

溫酒浸半日去殼

遠志

炒各半兩

乳香

硃砂

石

菖蒲

各三錢

右為末蜜丸桐子大每服三十九丸食後棗湯下

茯神散

治五藏氣血虛弱驚悸怔忡宜用此安神定

志

扶神去木人參

龍齒另研遠志去心桂心

防風 獨

活 酸棗仁

細辛

白朮

炒各三錢乾薑炮三兩

右為末每服四五錢水煎服蜜丸亦可

治要扶苓補心湯

治心氣不足喜悲愁怒衄血面黃

五心煩熱或咽喉間痛舌本作強

扶苓

四錢桂心

甘草

炒各三分

紫石英

煨

人參

麥門

冬

去心各一錢

大棗

二枚

右水煎服

茯神湯 治膽氣虛冷頭痛目眩心神恐懼不能獨處

胸中煩悶

茯神去木 酸棗仁炒 黃耆炒 梔子仁炒 白芍藥炒 五

味子杵炒 桂心 熟地黄自製 人參各一兩 甘草五錢炒

右每服五錢薑水煎

酸棗仁丸 治膽氣實熱不得睡卧神志不安驚悸怔

忡

茯神去木酸棗仁

炒遠志

去心

栢子仁

炒

防風

各一兩

枳

殼

麩炒

生地黄

杆膏各半兩

青竹茹

二錢五分

右為末蜜丸梧子大每服七八十丸滾湯下

定志丸

治心神虛怯所患同前或語言鬼怪喜笑驚悸

悸

人參

茯苓

各一兩五錢

菖蒲

遠志

去心各一兩

右為末蜜丸如梧子大每服七八十丸滾湯下

治要扶苓散

治心經實熱口乾煩渴眠卧不得心神

恍惚

茯神

麥門冬

各一兩半

通草

升麻

各一兩二錢半

紫苑

桂心

各七錢五分

知母

一兩

大棗

十二枚

淡竹茹

五錢

赤石脂

一兩七錢五分

右每服一兩水煎

朱雀丸

治心病怔忡不止

白茯苓

二兩半

沈香

兩

右為末蜜丸小豆大每服三十丸人參煎湯下

世傳蜜陀僧散 治驚氣入心絡不能語者昔有人為

狼及犬蛇所驚皆以此而安

蜜陀僧

研極細末如粉

右茶清調一錢匕

丹溪硃砂丸 治勞役心跳

硃砂

當歸身

白芍藥

側柏葉

各三錢

川芎

陳皮

甘草

黃連

炒各一錢半

右用豬心血為丸粟米大每服百丸龍眼湯下

本事辰砂遠志丸 消風化痰鎮心安神

人參

石菖蒲

去毛

遠志

去心

茯神

各一兩

川芎

山藥

白附子

麥門冬

細辛

鐵粉

辰砂

各五錢

右為末用生薑汁入水糊丸菜豆大以硃砂為衣每服一二十九臨睡生薑湯下

加味歸脾湯去丹皮山梔即歸脾湯 治脾虛弱損健

忘驚悸等證

人參

黃耆

茯神

去木各一錢

甘草

五分

白朮

炒一錢

木

香分五遠志

去心

酸棗仁

炒研

龍眼肉

當歸

牡丹皮

山梔

炒各一錢

右水煎服

愚按前方若乳母憂思傷脾血虛發熱

食少體倦或脾虛不能統攝以致陰血妄行或健忘

怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛

大便不調或婦人經候不調晡熱內熱或蠱唇流注

等證致兒為患者令子母俱服之

辰砂膽星膏

治小兒痰熱氣熱氣急喘嗽驚悸不安

辰砂錢一牛膽南星一琥珀兩青礞石末錢各一天竺

黃錢二甘草分五麝香許少

右為細末煉蜜丸如芡實大每服半丸不拘時服薑湯化下

木通散 治小兒肝心有熱驚悸用此藥瀉肝風降心火利驚熱

羌活 山梔子錢各二大黃煨木通 赤茯苓 甘

草錢各一

右剉每服二錢入紫蘇葉些少水一盞煎至五分不拘時服

癇

婁驚癇即急慢之證但驚癇發時仆地作聲醒時吐沫急慢驚則不作聲不吐沫也 仁齋曰癇小兒之惡候也蓋小兒血脈不斂氣骨不聚為風邪所觸為乳哺失節停結癖積而得之其候神氣拂鬱瞪眼直視面目牽引口噤涎流腹肚脹膨手足搐掣似死似生或聲或啞

或項背反張或腰脊強直但四體柔弱發而時醒者為
癰若一身強硬終日不醒則為瘖證矣

陰陽二癰陽癰初作時病先身熱瘕瘕驚啼叫嗽而後
發脈浮者為陽癰乃急驚也內在六腑外在皮膚為易
治 若病先身冷不驚瘕不啼呼而作脈沈者為陰癰
乃慢驚也此病內在五臟外在骨髓劇者難治 曾陽
癰者因感驚風三次發搐不與去風下痰則再發然三
次者非一日三次也或一月或一季一發驚搐必經三

度故曰三次所謂驚風三發便為癇即此義也其病主
身熱自汗兩目上視嚼沫咬牙手足掣搦面色紅紫六
脈浮數以百解散加五和湯水煎疎解次下痰用水晶
丹或半夏丸 陰癇者因慢驚後去痰不盡痰入心包
而得四肢逆冷吐舌搖頭口嚼白沫牙關緊閉但不甚
驚搐作啼面色或白或青脈息沈微故嬰孩寶書云睡
中吐舌更搖頭正此之謂治以固真湯加曰生湯同煎
調寬氣飲和解