

卷廿九之廿一

癩癬

流注

瘍醫大全卷二十九

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

癩癬部

自蛇虱烏癩癬起至濕痰流注止皆彙於此部中以便檢閱參治

蛇虱門主論

王肯堂曰蛇虱遍身起如風癩疥丹之狀其色白不痛但癢搔抓之起白疔相葉一味煎水洗內服蠟礬丸金銀皂角丸

心法曰白疔俗名蛇虱生於皮膚形如疹疥色白而癢搔起白皮由風邪客於皮膚血燥不能榮養所致用猪油苦杏仁等分搗勻絹包擦

烏白癩門主論

王肯堂曰夫癩疾皆是惡風及犯觸忌害所得初覺皮毛變黑或淫淫苦癢如蟲行或眼前見物如垂絲言語無定

心常驚恐皮肉之中或如桃李癩癬亦黑手足頑麻針刺不覺痛脚下頑麻不得踏地凡食之時開口出氣而鳴語

亦如是身體生瘡痛癢而時如蟲行或兩肘如繩縛此名烏癩又有黑癩凡二癩之證大同小異故不別錄也詳

又曰白癩者其語聲嘶喎目視不明四肢頑痛身體大熱心中懊惱手足緩縱背脊拘急內如針刺或生癩癬而起

往往正白在皮肉鼻有瘰肉目生白珠擋於瞳子視無所見名曰白癩也

陳實功曰癩風乃陽明濕熱沸騰於肌表或受風寒侵襲而成其患初起水泡作癢成瘡破流脂水癢至徹骨久則

成片延及遍身好浴熱湯形如風癩上體者汗解外毒下體者疏瀉內毒為主正宗

陳速公曰人一身發癩皮厚生瘡血出如疥或痛或癢或濕或乾似蟲非蟲人以為濕熱留於皮膚誰知乃氣血不

能週到滋潤乎世多以苦參煎湯或稀蒼白芷外治不能奏效正成於氣血虛也夫氣血足則經絡無閉塞之虞氣

血旺則毛髮無枯乾之患且氣足血旺則熱散濕消何至瘀滯不通結於皮膚之外哉治法以補氣血為主佐以消

濕散熱雖十載沉疴尚可奏功矧目前近癩乎用掃癩丹黃耆三兩當歸金銀花各二兩白木冬白芍熟地玄參

茯苓各一兩山萸川芎各五錢生甘草荆芥花粉各三錢防風三錢水煎服皮色即潤二劑乾燥解十劑全愈水瀉

癩癬之種來陽
極常用和同校

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

方大補氣血無異枯涸之田逢甘露之滂沛生機勃發水滿平時而蝗蝻之類自消於無形矣沈紫亮十四種癩證歌訣

心經火癩蟋蟀連

肝經木癩風厲偏

脾經上狗癩併屬

肺經金癩麩白兼

腎經水癩兩鳥共

胃經酒麻癩總言

夫癩之為害較之風證稍輕然其致害之患一也但癩愈而形可復瘋愈則元氣難復癩死者少瘋死者多然皆非善證耳

辨六經癩形

心經 火癩如灼之瘡大小不一或形如癬裂斷皮膚愈而復發乃心臟受毒病深七年方感其蟋蟀癩亦乃心經毒也

肝經 木癩初起似蝕癬狀大小不同形色不一或遍身高紙不定俗呼為綿花癩

脾經 土癩或先發熱嘔吐身發黃腫即現癩塊大如雞卵小如彈丸或麻木不仁穿即成瘡膿氣臭穢難聞

肺經 金癩初發如楊梅瘡上無殼肉凸起紫赤潰爛真如楊梅毒入肺經眉睫毛落二年鼻塌崩倒眼塌唇翻乃金癩之驗若蠶魚生肺腑致生麩白細蟲舉體艾白斑駁週身如癬儼然泥壁風之狀外用薰洗則能取效白癩乃風寒暑濕之氣邪毒聚聚彌滿肺竅久則蟲蠹食肺管所致

腎經 水癩必先得水病而停蓄又為風濕觸激又生在陰莖蝕於陰囊兩傍發腫塊橫痃寒熱交作腫痛難忍漸大而潰變成爛瘡一年病劇眉髮墮落水癩之毒在腎濕久生蟲流注遍身則生青黑赤紫斑駁以致陰莖痿癩

皮穿肉爛膿血臭穢烏癩乃邪毒入腎蟲食精髓下虛不救若在胸肋脇腿臂肋之間生核如桃李之狀穿爛臭惡或似漏瘡或如癩疥手足頑痺針刺不知此種之症宜大補氣血

胃經 酒癩因醉卧汗出迎風邪入於胃所致似赤非赤似白非白大者如錢小者如荳此證最為難治麻癩由酒毒留滯胃腑通發瘡毒狀如疥癬痛癢難忍或手足發黑白頑痺形如雁來鵝掌風之狀或發內痔頭硬而碎形如鱧頭通體皆然觸之則大痛冷汗一時即愈

如鱧頭通體皆然觸之則大痛冷汗一時即愈

瘋與癩大同小異但癩輕而瘋重治癩之法可於瘋證門中諸方酌用

痞癩門主論

王肯堂曰夫人腸氣外虛則多汗汗出當風風氣搏於肌肉與熱氣併則生痞癩狀如麻苴甚者漸大搔之則成瘡也準經

心法曰痞癩俗名鬼飯疙瘡由汗出受風或露臥來涼風邪多中表虛之人初起皮膚作癢次發扁疙瘡形如荳瓣堆壘成片日間癢甚者宜秦艽牛蒡湯夜間癢甚者宜當歸飲子外用燒酒浸百部以藍布蘸酒搓之謹避風涼

癬門主論

陳寶功曰癬乃風熱濕蟲四者而成風宜散熱宜清濕宜滲蟲宜殺總由血燥風毒尅於脾肺二經耳証又曰風

癬如雲朶皮膚嬌嫩抓之則起白屑不知痛癢又曰濕癬如蟲形搔之則有汁出又曰頑癬抓之全不知痛

又曰牛皮癬頑硬且堅抓之如朽木又曰馬皮癬微癢白點相連又曰狗皮癬白斑相簇時作微癢

周文采曰乾癬搔之則出白屑索然彫枯謀又曰刀癬則輪廓全無縱橫不定

申斗垣曰白殼瘡即癬也故玄

王肯堂曰面上風癬初起痞癩或漸成細瘡時作痛癢發於春月名曰花癬女人多生之此皆肺經蘊積風熱陽氣

上升發於面部或生眉目之間久而不愈恐成風疾準經

蔣示吉曰上半身為頑癬治之易多屬風熱約說又曰陰癬生在下半身治之最難多屬寒濕總之血分受病以致

皮膚不和也

癬門主方

浮萍散 治風癬疥癩 當歸 川芎 荆芥 赤白芍 甘草 浮萍七月十五日採取 麻黃七分五厘夏

加葱白二根豆豉五六十粒水煎熱服取汗 手背加桂枝 背加羌活 膝加牛膝薄桂

遍身風癬 防風 金銀花 片苓 山梔仁 生地黃 木通 川黃連 當歸 苦參銛一飛滑石 升麻銛

荆芥穗 香白芷銛七 桔梗 生甘草銛五 蟬蛻 皂針 牛蒡子銛八 生薑 一片穿山甲銛四 水二鍾煎八

分食遠服 未服藥先一日用茄子藤連根葉煎水薰洗將癬擦透次日服藥三劑除根

濕熱生癬 乾浮萍兩蒼耳子 蒼木 苦參各一兩 黃芩五錢 附米五分 酒糊丸上身多食後服下身多食前

服白湯送下三錢

搓癬 土槿皮兩斑貓仁雞心檳榔仁番木鱉四 火酒半斤浸一伏時蘸搽癬上忌大蒜火酒 又方 硫黃

輕粉各等 研勻蜜調搽 又方 大棗一枚去核入白硫三分泥裏煨透冷定去泥研細香油調搽 又方 蜜

陀僧五梧子各等分研細蜜調搽 又方 土槿皮研細醋調敷以紙蓋之 又方 商陸根蘸蜜搽之 又方

土槿皮研細粗夏布包紮浸火酒一伏時搽之 又方 壳菜根蘸入乳搽之 又方 白降丹三 輕粉六 醋調

搽之 又方 土大黃 鳳仙花梗 枯白礬飛水 共搗麻布包紮蘸醋搽之 又方 白硫 硫黃 罐口各

分 入杓內化開將地下挖一孔將藥傾入冷定取出米醋磨敷 又方 硫黃三 枯礬一分 芷三 斑貓三 足去

研勻抓破搽之 又方 樹上經露水的蜂房 一个以生礬填滿房孔置罐底以細火煨令礬化為度取出研細

抓破搽之 又方 牛舌草脚土 白薇 棟樹皮各一 冰片 甘草各一 輕粉 蝸牛活 殼亦可 用無 共研

細用荔枝核將癬抓破真麻油調搽 又方 皂礬炒研猪胆汁調搽 又方 鮮土大黃搗爛加川椒白糖鹽

各少許用布包入醋內浸半日取起搽癬 又方 生天南星生草烏各等分研細用土大黃汁調搽 又方

猪蹄殼內填生白礬瓦上煨存性搽之 又方 蛇床子 棠本 尖榴榔 硫黃 枯礬 白膠香 五梧子

各等 研細乾癬香油調搽濕癬乾擦頑癬醋調搽 又方 土槿皮三 明雄黃 水銀各二 潮腦各 檳榔各 麝

香一分 大楓子 斑貓 木鱉子各七 研細入火酒勛半封一七蘸搽

百部膏 治牛皮癬 百部 白蘚皮 鶴虱 草麻仁 生地黃 黃柏 全當歸各一 蘇油半斤入藥熬枯

去渣復熬至滴水成珠再下黃蠟二兩試水不散為度拿起鍋入雄黃末和勻稍令傾入磁鉢中收貯退火氣用聽

三十五年頑癬 鐵線粉燒 海金沙 冰片 麝香末各等 生薑蘸擦 又方 枯白礬七分血丹三分研

勻土大黃根同搗搽 又方 土槿皮三 公檳榔一 不見火曬乾磨細用好酒醋調如薄糊隔水蒸一炷香取

出敷患處棉紙蓋上三次即愈 又方 生白木三 土槿皮五 不見火曬乾為末酒醋調搽三次必愈

又方 先用生薑汁搓再用柏油搓

頑癬陰癬 土槿皮二斑猫廿四明雄黃 硼砂各六 火酒二斤浸三日搓之

項上耳傍濕癬 蘆薈二甘草二斑猫廿四研極細先將癬以溫水洗淨拭乾搓之

厚牛皮癬 全蝎二芭荳二十斑猫廿四油一黃蠟錢先將芭蝎斑猫入油熬黃焦色去藥取油如油少可加麻

油煉滾投蠟鎔化收貯擦之 又方 土地黃根搗爛和蜜擦癬

頑癬 大公蝦一个取蝦大爪破癬見血路為度以蝦腦塗之二次即消

陰癬 生明礬 熟明礬各一輕粉二銀硝二研細用土地黃根搗爛布包蘸藥末擦之

頭項以上癬 用傾過銀子的銀罐子大小二個盛硫黃一兩於大罐內以小罐復住文武火煨俟火焰高罐上一

寸約一鐘茶時取出冷定取上覆罐研為細末用柏油猪骨髓調勻將癬用刀刺破搓上一伏時愈 又方 早

浮萍草生擦癬覺疼起泡挑破再擦三日不見水結疤永不再發 又方 硫黃細末拌生猪油熬熟將癬抓破

搓擦自愈

治癬碧玉散 銅綠 硼砂 白礬 各等分 研勻 香油調搓

岐天師秘方 秘錄 棟樹皮 大楓子 潮腦各三水銀 硫黃 花椒炒木鱉子 明雄黃 蟬蛻 木通各二

全蝎仁土槿皮二斑猫 公檳榔各七皮硝錢用火酒三四斤浸十日擦之 又方 蘆薈 輕粉 雄黃各

錢大黃 蛇床子 土槿皮錢三檳榔錢研末先將癬刮破以米醋調搓

頭面荷葉癬 川槿皮研細醋調湯頭如膠將癬抓破搓之

白礬散 遍身生癬日久不愈延至頭面 獨莖羊蹄根搗細白礬研細以極酸米醋調抓破搓癬隔日再搓不過

兩次即愈 又方 紫蘇 潮腦 蒼耳草 浮萍 煎湯洗癬

牛皮血癬 舊銀罐一个露蜂房錢枯礬錢研細香油調搓

年久陰癬數日除根 土槿皮錢磁露水 鏡面燒酒各四同浸七日抓破癬皮用新羊毛筆塗之每日數次

千金方 孫真人 以日午時立日光下人影有癬處著艾炙之點艾時念咒 咒曰癬中蟲毛戎戎若欲治待日中

一氣噫三遍俟艾火過添火再噫再灸如此三遍三炷即愈

癬瘡延蔓 東坡家藏 决明子 研細水銀 輕粉 略少 再和研不見水銀星為度刮破上藥立瘥

雄黃 斑猫 研勻無根水調敷起泡刺破柏燭油搽潔淨不發 又方 杜黃連 泔水 梅根一握 白梅枝

楸 同汁搗爛用穿山甲刮破搽數次即愈

荷葉癬 古方 田螺一個開壓入信石二分待肉化水搽上即愈

牛皮癬及多年頑癬 紅粉霜 五分 明礬 杏仁 炷油 川槿皮 略一密陀僧 共研細津調搽一日三次三日

全愈 又方 牛皮燒灰油調搽

牛皮血癬 古仙方 硫黃 九白 硫黃 九白 巴豆 三粒 研細茶油調搽

頑癬 秘方 白砒 分 硫黃 九白 硝 分 明礬 分 冰片 五 研末津調搽之

楊梅癬 枯白礬 硫黃 各一兩 雄黃 膽礬 輕粉 略一 川椒 鐵 研細用生豬板油去皮入藥擦破數次其效

如神

楊梅癬 硃砂 雄黃 沒藥 油 乳香 油 兔茶 略一 杏仁 四 大楓肉 二十 搗爛絹包擦之

鵝掌瘋癬 秘方 川烏 草烏 何首烏 花粉 赤芍藥 防風 荊芥 蒼木 地丁 略一 艾葉 四 煎湯先

薰後洗層層起皮痛癢自愈

圍子癬 集驗 穀樹皮剪如癬樣大小以毛背一面用唾貼癬上以手不時撲之即愈

癬方 硫黃 木炭灰 略等 共為極細末將癬用穿山甲刮破搽上數次愈 又方 馬蹄决明子一兩為末入

水銀輕粉少許研不見水銀星為度將癬刮破搽上立愈 又方 馬蜂窩一个仰放瓦上以枯礬填滿孔內炭

火炙焦研末用蠟醋脚調塗即愈

陰癬 鮮草連草揉成團用穿山甲將癬刮破搽癬上奇驗

渾身癬 羊蹄根搗汁入墨盆內將白芨磨濃汁搽之 又方 鉛一斤煎水日洗數次即愈

川槿皮 銳 治一切癬如神 烏梅肉 炷 煎用 蒸 根汁浸 一夜 取出 搗 如泥 加番打麻 研細 海螵蛸 研細

五錢

入烏梅肉又搗勻稱過每一兩加白降丹似白砒此再搗勻入白芨細末一錢又搗勻做成二三錢重的錠子陰乾收貯凡用以羊蹄根同醋磨濃搗之

癬方胡錦給 土荆皮三尖檳榔 斑猫法頭足大楓子 木鱉子俗七巴荳仁伍雄黃 潮腦 川烏 白蘚皮

草烏銘二麝香三 火酒二斤半同入小口瓶內封口浸七日將癬刮破搗之

頑癬 黑鉛一錢鎔化離火入水銀一錢研為極細末加真輕粉潮腦各一錢和勻再研細取牛舌草根去土淨搗自然汁和勻再用穿山甲將癬刮破敷上出盡血水為度癢時則頻搗之搗時微痛勿懼

頑癬 膿瘡及湯火傷咸惟章 真川鉛粉 銀珠銘五麝香三 右為末用鴉油搗和如泥用油紙一長條將半段

用針刺孔攤膏合轉來將光面貼癬絹帕縛二緊三日一換夏月早晚換

牛皮癬 穿舊牛皮靴鞋底上皮陰陽瓦煨存性研細將癬刮破擦之

雞蛋一個開一小孔去白存黃入硫黃川椒末各三錢將濕紙封固灰火內煨熟為末先以麻線將癬刮破用穀樹漿或羊蹄根汁調搗 又方 多年竹燈掛一個火上烤出汁如膠者另將五倍子法為末和勻用陳醋在火上溫熱調搗

頑癬 硫黃火硝 白砒銘一 先將硫黃入銀罐內化開再入硝砒末攪勻傾入土內埋七日搗三五次

癬 雷公藤五大楓肉 防風銘一錢 土槿皮 蚯蚓糞 牛舌草根

牛皮癬 桃樹根同膽礬搗爛敷

癬生臉上如錢大抓之有白屑者 菘豆捶碎以紙糊碗口上針戳多孔以碎豆鋪紙上放紅炭一塊架豆上俟豆灼盡紙將焦去豆揭紙碗中有水取搗三五次

老癬 輕粉 雄黃 黃丹 銀珠銘等 研細用米醋浸大黃夏布包蘸藥擦之

陰癬 鹽內皂角擦之

燥癬 水銀 胡粉 研蛋清調搗 又方 雄雞冠血塗 又方 胡粉炒黃醋調塗 又方 搗桃樹白和醋

濕癬 石硫黃研用三年陳醋調敷 又方 蛇床子 黃柏 黃連 胡粉粉一 研細入水銀一棗子大和猪

燥癬 水銀 胡粉 研蛋清調搗 又方 雄雞冠血塗 又方 胡粉炒黃醋調塗 又方 搗桃樹白和醋

濕癬 石硫黃研用三年陳醋調敷 又方 蛇床子 黃柏 黃連 胡粉粉一 研細入水銀一棗子大和猪

油研勻塗之 又方 用粗碗一隻以皮紙用針戮眼糊碗口上以水潮紙上令濕將杉木屑堆潮紙碗上用火
點著俟杉木屑燒盡輕輕掃去屑灰揭開紙看碗中杉木油取搽癬上必效

癩癬門主論

孫真人論曰素問云風邪客於肌中則肌虛真氣發散又被寒搏皮膚外發腠理開毫毛淫氣妄行之則為癢也所
以有風疹瘙癢皆由於此又有赤疹者忽然起如蚊蟲咬煩癢極者重抓疹起癢之逐手起又有白疹者發冷亦有
赤疹蓋赤疹者發熱

王肯堂曰夫風癩疹者由邪氣客於皮膚復遇風寒相搏則為癩疹若赤疹者由冷濕搏於肌中風熱結成赤疹也
遇熱則極若冷則癢也白疹者由於風氣搏於肌中風冷結為白疹也遇冷則極或風中亦極得晴明則癢者厚燥
衣亦癢也其脈浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏則為癩疹致身體為癢也準繩

朱丹溪曰疹屬熱與痰在肺宜清肺火降痰或解散出汗亦有可下也心法

方論皆謂緣肌中有濕若涼熱之氣所折熱結不散則成赤疹若因風邪所折風熱相搏則成白疹赤疹得熱則劇
得冷則減蓋熱氣鬱於內故惡熱宜冷白疹得陰雨則甚得晴則消蓋熱氣散釋於外故惡冷宜熱熱搏於血分其
邪因併發於表則赤若風濕搏於氣分則氣脈不行因邪併發於表則白夫如是然後於治法相應邪熱者故惡熱
而喜涼邪濕者故惡雨而喜晴矣方論中又有風痞癩者即內經所謂汗出見濕乃生痲痺又曰勞汗當風寒薄為
鬱乃痲痺即癩疹屬也故痞癩類也此皆為外邪鬱肌肉玄府之熱者矣然則與內經言少陽少陰而君相二火客
熱之勝為丹疹外發者方論中則無有也故人氣君相二火鬱發而變者宜乎未之及耳若此條是人氣所變之一
者也故二火鬱發出血氣之表與外邪所鬱無異更有小兒發痘瘡之外必有出疹二次亦是君相二火發出未盡
之胎毒也 又曰癩疹入腹亦能殺人宜用蟲砂煎 又曰癩疹熱多則色赤風多則色白甚者癢痛搔之則成瘡也
林氏曰或問斑疹因何而生屬陰屬陽屬虛屬實屬表屬裏可得聞其詳乎答曰斑疹之發有外感風熱者有胃腑
實熱為病者有傷寒失下者有傷寒陽明經證失汗發衄不衄則發頭不生頤則發斑疹者總屬陽明胃與大腸之
風熱充盛已極內不得疎泄外不得透達怫鬱於皮毛腠理之間輕則為疹重則為斑一如火乘金位金受火剋之

故此乃陽毒屬表屬實之斑疹也。有陰虛血熱者，有陽虛血熱者，有氣血兩虛而虛熱鬱感者。此三焦無根之火，乘氣血之虛而空發於上，佛鬱於皮毛血脈之中，內不得清，外不得散，遂發斑疹。乃陰虛屬裏之證也。婦人又曰：或問何以為斑，何以為疹。陰陽既別，何者為重，何者為輕。答曰：斑者成片不分顆粒，一如雲朵拱起，淡紅者輕，紫紅者重，黑者凶，輕者癢而重者痛。疹者如痱瘡，或類蚊跡，蚤虱痕而不感。一日之中，起伏隱現，不常隱隱，見於皮膚之間，不大起發者，是大約陽證。斑疹易着而易治，陰證斑疹挾虛而發，難着而難治。苟不細審，則陰證誤以為陽，立至危殆，可不慎歟。又曰：身熱無汗，煩渴躁悶，或痛或癢，如雲若錦，腹痛胸滿，二便秘結，六脈浮洪有力，或浮數有力者，係手陽明大腸足陽明胃二經風熱為病，所謂陽斑也。若內熱自汗，渴不欲飲，心煩身燥，胃弱脾泄，喜濕熱色白而不紅，但癢而不痛，六脈遲緩微弱，或虛數無力者，手太陰肺足太陰脾手少陰心足少陰腎經之陰火內充為病，所謂陰斑也。疹形與斑雖異，而致病之因受病之臟腑及所現之脈與形證無不同。蓋斑有陰陽，則疹亦有陰陽。自在醫者審其證之陰陽虛實，脈之有力無力可也。又曰：兩陽合明，其火自感，兼有食積，致生積熱。故斑疹之因必歸過於胃與大腸也。火盛則血熱，而金燥，蓋心為火臟，主血脈，肺為金臟，主皮毛。聚胸中肺受薰蒸，心火愈熾，或熱極反兼風化，或客風鼓動，內火其病發於心肺二經。所謂陽斑陽疹，必先清散風熱於表，疎導積熱於內。表裏和解，以救炎熾之勢。如二便秘結，急宜利之。若脾胃之陰虛火感，不能歸經固藏，發越於上，而心肺受其薰灼，而病亦。有因風致火，或因熱極生風，而發所謂陰斑陰疹，初則亦宜清解，使其透發，寬其胸膈，解其煩燥，次則察脈之大小虛實，脾胃之實與不實，大便之結與不結，或清補或溫補。又曰：雖陰陽俱有斑疹，而陽證發斑者多，且多發於熱病之末。陰證則發疹者多，發於病之始。蓋斑由積熱發之，稍緩疹兼風火發之，尤速發之。速者禍輕發之緩者其禍反深。則又天下事理必然之勢也。至於時氣發疹，由風熱之邪乘於肺經，必兼鼻塞氣粗痰嗽餘熱不清，遺於陽明大腸，并其糟粕蘊積而為濕熱，更成積滯，自利甚至熱鬱化火，火性急迫，隨氣滯下而後重，不舒者宜用辛涼升散之劑，清其邪熱，使鬱陷之氣透達外解，不惟斑疹自消，而濕熱亦散矣。若痰嗽不清，加以清火消痰之藥，積滯有餘，濕熱下迫，加以分清利濁健運化導之劑，如木香黃連山查神曲車前澤瀉之類，更用枳殼寬胸開鬱，升提鬱陷之邪。風濕鬱於腸胃，風熱逆於肌表，傷於血分，則憎寒壯熱，胸中嘈雜，肚腹疼痛，發為赤疹，傷於氣分，發為白疹，俱

令瘡癢無度一日三現三隱俗名風絡疹即此是也第一宜忌香油蝦鮮麵食並戒酸鹹倘不知禁戒輕則成瘡甚則不時舉發致成終身之累治當疏風散熱托疹為主

癩瘡門主方

通治陽證斑疹主方 活人錄 生地 錢防風 荆芥 各一分 錢川黃連 犀角屑 牡丹皮 各五分 黃芩 桔梗 各一錢

草注 水煎不拘時服 血中伏火必先涼血故以生地為君而丹皮佐之連心脾之火佐桔梗以開鬱結

芩薄荷各五分暫去芩連清心家之熱毒燥乾渴無汗以解散內外之風邪者速外感重者加羌活一錢

五錢玄參一錢犀角五分連去風防風皮枯梗寒邪熱入胃古胎熱半表半裏大便不通語狂熱者加大黃五錢

無下錢枳實二錢法生地防風皮枯梗寒邪熱入胃古胎熱半表半裏大便不通語狂熱者加大黃五錢

通治陰證斑疹主方 白木 白茯苓 五分 人參 炮薑 各一錢 陳皮 炙甘草 防風 各五分 肉桂 三分 水煎早晚空心

服右方乃治陽虛血熱及氣熱此氣虛不能寒喜熱血便清利口不乾而反欲熱飲六脈沉

腎水不足龍火無制陡發越於上心肺受其薰逼而成斑疹者八味地黃湯導火歸原兼服濟陰丸

治陰虛血熱熱鬱血中而生斑疹時發時止或痛久遠不愈者以此涼血清熱滋肝息風兼服濟陰丸 生地錢製

首烏錢當歸 乾葛 五分 秦艽 丹皮 甘菊 荆芥 各一錢 薄荷 甘草 各五分 水煎午後臨睡服

遍身風疹作癢 生芝蔴碎擦之 又方 過年貼過掛絡擦之 又方 監蒲包煎湯洗之

風疹不時舉發 真蘇油 燒酒 各半 和勻燉熱發時服之再不發矣

葡萄疫門主論

陳寶功曰葡萄疫乃小兒感受四時不正之氣鬱於皮膚不散結成大小青紫斑點色若葡萄發在遍體頭面乃為

胎證自無表裏如邪毒傳胃牙根出血久則虛人斑方漸退初起宜服羚羊角湯清熱涼血久當滋益其內又有牙

根腐爛者人中白散主之 正宗

心法曰此證惟腿脛諸多

葡萄疫門主方

羚羊角散 正宗 羚羊角 防風 麥門冬 玄參 知母 牛蒡子 黃芩 各八分 生甘草 淡竹葉 十片 水二鍾煎

六分食遠服

胃脾湯正宗 北五味 磁石 白朮 遠志肉 陳皮 沙參 麥門冬 茯神 生甘草 磁石水二鍾煎六分食遠服

如虛弱自汗者去沙參加人參 黃耆各五分

非疔散 治葡萄疫攻牙腐爛 五倍子炒茶 人中白瓶各一兩 冰片四 研細用米泔水漱淨吹

濕痰流注門主論

陳寶功曰流者行也注者住也由其瘀壅其形漫腫無頭皮色不變所發毋論穴道隨處可生皆緣榮氣不從逆於肉裏如風寒相中表證發散未盡者散之房慾之後陰虛外寒所浸者溫之惱怒傷肝鬱結傷脾者歸脾湯加青皮香附散之跌撲損傷瘀血凝滯者和血湯逐之產後惡露未盡流注經絡而成者木香流氣飲導之如不得內消者法當大養氣血培助脾胃溫煖經絡通行關節十全大補湯加熟附子香附主之如膿已成宜急開之正宗

王肯堂曰不串流者俗曰馬瘕 串流者名曰走散流注俗曰瓜藤馬瘕 遍身骨節內疼痛不能起坐無堆作熱不退者名曰啣骨馬瘕 若脊骨及髀骨上起堆或一二個或三五個名曰過脊馬瘕 若尾骶骨上起堆作熱者

名曰殺臂馬瘕 若髀骨下痛甚無堆但腫者名曰鎖腳馬瘕 若骨相交接之處疼痛無堆微腫名曰接骨馬瘕

此證因風熱走散四肢治當疎風散熱初起不可用火針烙之腫勢感者只宜刺以稜針久熱者可火針烙之流

注入股者死辨 又曰禁用寒涼剋伐內消等劑

汪省之曰夫流者行也乃氣血之壯自無停息之機注者住也因氣血之衰有凝滯之患故行者由其自然往者由

於瘀壅凡得此者多生於體虛之人勤勞之輩不慎調燮夏秋露臥縱意取涼熱體當風或中風邪發散未盡或終

後陰虛外寒所侵又或惱怒傷神鬱結傷脾榮氣不從逆於肉裏又或跌打損傷瘀血凝滯或產後惡露未盡流縮

經絡皆成斯疾也初起外以琥珀膏敷貼內服行氣活血之劑其中十可消其五六如不得內消者法當大養氣血

培助脾胃溫煖經絡通行關節如木香流氣飲十全大補湯俱加熟附子香附培助根本庶未成自消已成自潰已

潰自斂不致殘敗破漏不斂之證且如有膿宜急開之忌用寒涼剋伐內消等藥犯此終致不救者多矣理例

朱丹溪曰凡人身上中下有塊者是痰然痰在皮裏膜外則遍體遊行腫而色白帶而不痛宜導達疎利如痰因火

...

...

動而走則體多小塊色紅痛甚流走無定宜解毒清火為主 又曰痰在皮裏膜外非薑汁竹瀝不能通痰在脇下非白芥子不能達白芥子亦能散皮裏膜外之痰氣竹瀝滑痰非薑汁不能行經絡痰在四肢非竹瀝不開

申斗垣曰三陽經傷寒發汗不透則必痛痛久則腫腫久則必為熱熱久則破壞此名陽濕痰破瘡如三陰經失汗汗鬱成痰則痛痛久則皮色不變而腫至夜痛反甚其痛處冰冷脈亦沉細日久氣血凝注則肌死肌死則破壞腐臭名曰陰濕痰破瘡均宜艾炷灸 又曰冷流注多附骨硬不消骨寒而痛筋縮不能伸屈庸俗誤用刀針又無膿

血止有如屋漏汁或瘀黑血宜用回陽玉龍膏如稍緩再加軍薑肉桂白芷草烏等分熱酒調敷則骨寒除而痛自止氣溫和而筋自伸肉亦軟而腫自消亦不可無石菖蒲以其性能破堅散腫最妙亦不可多多則解羣藥性也

又曰流注首尾敷冲和膏最穩如乳香沒藥治流注筋不能伸數之極效 又曰走散流注發因受寒凍凝滯血脈而成一名流注傷寒又名水藤發背患生於背遍身皆有之經云傷寒流注尚猶可流注傷寒急如火醫者當察其寒熱虛實治之

胡公弼曰流注又曰走注狀似蟹形毒因風盛而生熱氣因熱甚而走散午前宜四君子湯加芎歸午後宜四物湯加參芪麥冬北五味斷不可用滲利流氣等藥 又曰治流注大法鬱者開之怒者平之閃撲及產後瘀血者散之傷寒餘邪者調解之大要以固元氣為主佐以現證之藥 又曰流注一個要表汗一次如流注三個要表汗三次毒自消矣設治之不早深為大害 又曰如破潰成膿者先用降藥降去敗肉腐盡生肌可也

醫林集要云白虎飛尸留連過期或展轉數歲冷毒朽骨出盡自愈若附骨腐者可全正骨腐者則為終身廢疾矣 又曰又有結核在項腋或兩乳傍或兩胯軟肉處名為瘰癧癰屬冷症也又有小兒宿痰失導致結核於頸項臂膊

胸背之處亦冷症也並宜熱藥敷貼 王西圃曰流痰胸膈流於四肢者可治四肢流入胸膈者難治 心法曰流注新發漫腫無頭皮色不變凝結日久微熱漸痛透紅一點方是膿熟即宜用針開破若濕痰化成者膿

色黏白若瘀血化成者膿色金黃黏水若風濕化成者膿色白稀如荳汁若汗後餘邪化成者膿色或黃或黑稀膿臭穢以上四證發於肉厚處可愈發在骨節及骨空處難痊若淫慾受寒化成者膿色稀白而腥其水中有猪脂水

油之狀此為敗漿膿也諸書雖有治法終成敗證

馮魯瞻曰按臟腑津液受病為痰隨氣升降理之常也若在皮裏膜外及四肢關節曲折之地而臟腑之痰何能流注其所此即本處津液遇冷遇熱即凝結成痰而為病斷非別部之津液受病成痰舍其本位而移於他部者况氣本無形故能無微不達而液隨氣運亦可藉氣周流若至津液受病成痰則變為有形而凝滯焉能隨氣流通於至微至密之所耶

試痰法 用海蜇皮貼上外以膏貼之如痰次日膏藥揭得下海蜇皮揭不下即是害痰

流注門主方

香附餅証 治風寒流注襲於經絡結成腫痛 香附為末酒和量瘡大小做餅覆患處熱熨斗熨藥餅上未成者

自消已成者自潰風寒濕毒宜薑汁作餅熨之

醒脾湯証 治懷抱鬱結思慮傷脾以致脾氣不行逆於肉裏乃生壅腫疼痛不眠心煩不安神氣不清 人參

白茯苓 白朮 嫩黃芪 炙酸棗仁 研透志肉 鎔一地骨皮 杜枯梗 柴胡 川黃連 廣木香 炙甘草 香

附治五圓眼肉杜 薑三片 棗二枚水二鍾煎八分不拘時服

琥珀膏証 治一切皮色不變漫腫無頭氣血凝滯結成流毒毋論身體上下年月新久但未成膿者並效 生大

黃二鬱金 白芷 天南星治 共為細末用大蒜去殼搗爛入上藥再搗畧入酒一二匙調勻適敷腫上紙

蓋隨有熱痛又有不痛俱待藥乾便效次日又有起泡又有不起泡者如有泡起挑去泡中黃水以膏貼之自效

調中大成湯 治流注潰後膿水清稀飲食減少不能生肌收斂 人參 白朮 嫩黃耆 炙陳皮 當歸 山藥

白茯苓 白芍藥 炒酒 牡丹皮 鎔一 透志肉 砂仁 藿香 炙甘草 鎔五 熟附子 上肉桂 鎔八 煨薑三片 黑

棗二枚煎食透服

黃耆六一湯 治流注潰後膿水出多口乾作渴煩躁不寤 嫩黃耆六錢生用粉甘草去錢五分 人參錢一 水煎

食透服

木香餅 治一切氣滯結腫成核或痛或酸閉挫風寒所致 生地黃搗 廣木香減半 和勻量患處大小作餅置

腫上以熱熨斗熨之堅硬木痛者間日熨之自效

流痰渾身作痛 當歸 瓜蒌仁 獨活 大川芎 白茯苓 白芷 白芍藥 連翹 防己 穿山甲炒防風

生地黃 金銀花 牛膝 天花粉 黃芩 陳皮 川貝母 甘草 各五分作六劑酒水同煎若上半身痛食

後服下半身痛食前服如通身痛只用酒煎神效

火龍膏 治風寒暑濕毒襲經絡筋攣骨痛或肢節煩痛濕痰流注作痛不能行步鶴膝風骨節風疼痛其效尤速

生薑半斤取汁牛皮膠二兩入鍋內化開入乳香沒藥末各五錢麝香一錢調勻待溫攤貼患處

濕痰流注奇方 趙若干 木瓜 個當歸 鉅甘草 錢 細酒一觔同煎減半再加研細乳香沒藥各一錢露一宿空心

熱服未清自消已清自斂

濕痰內消方 宣木瓜五錢紫花地丁五錢 臘酒二觔煎好露一宿看證上下分食前後服

內消濕痰流注神方 吉祥草根洗淨搗汁半酒杯和酒沖服取汗即消且不生瘡毒

錦囊秘授神效觀音救苦丹 馬魯 神治一切風寒濕氣流注作痛手足蹠攣小兒偏搗口眼歪斜婦人心腹痞塊

攻疼不問年深月久將藥置患處以燈火點着候至火滅連灰罈於肉上立見痊愈重者用藥米粒大輕者用藥

糶粒大只須一壯不必復灸若患處濶大連排數壯一起灸之且灸時不甚熱痛灸後並不潰膿一茶之頃痼疾

如失屢試屢驗真神方也固思濟之一方不若利之天下惠之一時不若澤之後世特附於錦囊之中以廣傳

願後賢以為半積半養之珍幸勿專為嗜利之具 麝香錢珠砂鐵硫黃 各研細末先將硫黃化開次入珠

麝同化傾入磁器內候乾再研末隔火化開切作如糶米大貯磁瓶內慎勿出氣珍藏聽用

一切腫塊濕痰流注 鮮山藥 天麻 各五 酒水各一鍾煎服三次全消

敷痰 賈頌周 大蒜頭十數枚去皮入皂礬三錢搗爛聽用用香一炷點起將藥敷患上以一炷香盡為度如是痰

即現青紅色如只紅色則非痰也如其是痰隔日敷之三次自消 又方 天南星 大黃 白芨 各等 研細

薑汁和醋調敷 又方 白蘿蔔葉 扁柏葉 各北 乾麵 各等 研細醋調敷日易一次自消 共研細同滴醋熬數沸加葱薑汁調敷

敷濕痰腫痛癰疽發背無名腫毒 五倍子 靛色 生半夏 生南星 各等 共研細同滴醋熬數沸加葱薑汁調敷

痛處留頭如藥乾用醋不時潤之至重毒證不過三四次即消

敷痰法 生山藥一段洋糖飛麵共搗爛塗敷自消

摩腰紫金丹 生山藥一段洋糖飛麵共搗爛塗敷自消 風寒濕三氣而兼痰飲留滯於經絡血脈之中閉塞不通而痛並治腰痛 附子尖 烏頭尖

夫南星 砒石錢雄黃樟腦丁香各五分 錢吳茱萸 肉桂 硃砂 乾薑 一麝香 蜜熬蔥汁和丸如雞

頭子大每丸以薑汁化開敷塗患處上貼萬靈膏或蠲痛膏

蠲痛五汁膏 寒濕氣襲於經絡血脈之中為痛痛於兩臂兩股腰背環跳之間 鳳仙梗 搗老薑汁 蒜汁 葱

汁 薑汁 各等 熬至滴水成珠用草麻子油同黃臘收起每以此膏烘熱貼上追出濕氣水液自愈

消痰方 羌花研末一錢棗肉搗勻為丸在上食後服在下食前服白湯送下即便出穢痰其腫自消但此法宜施

於壯實初起之人須忌甘草 又方 乳香 沒藥 去油各川貝母 去心 研連翹 幾萬年青 煎服自消

雷火針 風寒濕氣痰滯於經絡血脈之中閉塞不通而痛 斬艾 兩硃砂 穿山甲 桃皮 草烏 川烏 乳

香 雄黃 沒藥 硫黃 麝香 共為細末以斬艾鋪粗紙上入藥末三錢捲成筒如爆竹式擇吉日將

藥筒入瓶內以著葉油紙封口埋屋下地中四十九日取出任用此針能除百病可於患處用青布或紅布摺二

十四層將針燈上點着吹息隔布針之患內煖極即止不過三次即愈

治因風鬱痰生於頸項皮膚腫硬白色不甚疼痛 說約 天南星 半夏 研末薑汁調敷或南星半夏末薑汁和餅隔

蒜汁更妙

消痰神方 新鮮針線包 即薑洲上蘆柴上纏擾之物形如鳥首綠色內有不拘多少搗爛敷上自消

痰注腎痛 湯仁齋 天仙藤 白木 羌活 白芷 鎔 薑黃 製半夏 每服五錢薑五片水煎服

濕痰腫痛經年不能行者 單方 水紅花 花椒 蘿蔔莢 甘草 槐花 金銀花 蒼木 白鳳仙花 水龍

骨絡等 稀莖草 煎黃患處水稍溫即洗之

神仙外應膏 秘方 川烏一筋為末用陳醋入砂鍋內慢火熬如醬色敷患處如病一年敷後一日發癢二年二日

發癢時令人將手拍癢處拍至不癢為度先用升麻皮硝生薑煎水洗然後敷藥不可見風

濕痰流注初起腫痛無頭皮色不變久而不治則發熱作膿知覺早者於未破時急服此方十餘劑即能內消最稱靈驗

搗紅 防風 秦艽 木通 絡一真胆星 川貝母 僵蠶 炒桃花 炒五倍子 金銀花 各三防已

白甘遂 樹法 放皂角子 碎九個 肥皂子 碎十個 土茯苓 打碎 兩兩 虛弱人加 石斛 苡仁 略一痰在頭頂胸者

加 夏枯草 痰在背脊者加 羌活 痰在脇肋者加 柴胡 痰在肚腹者加 赤芍 澤瀉 各一痰在臂

者加 獨活 痰在腿脚者加 木瓜 牛膝 右用河水九碗 砂鍋內煎三碗 每日早中晚各熱服一碗

如痰在心之上者食後服痰在心之下者食前服如虛弱人分三劑極虛者分三劑小兒分四劑忌食鹽醬茶醋

猪肉鮮魚雞鴨一切發物煎炒薑椒烟酒生冷但藥內有甘遂與甘草相反恐別樣丸散內有甘草者切不可

服已破頭者止服四五劑使氣血調和不至又流他處隨服十全大補湯加川貝母 石斛 石斛 滴乳香 咀須

服數十劑方能全愈若係多火之人十全大補內減去肉桂 願體集

治流注抄本 石膏 兩 官礪 三 飛麵作十丸將丸穿一孔貫以鐵線炭火煨紅取酒一碗投入冷又燒紅入酒內

以丸盡為度待酒熱即服一日二服自消 又方 金銀花 紅花 各三 地榆 苦參 各二 酒水各半煎服近

者三劑速者七劑即消

神驗方 周鶴仙 用薑黃母子 煨 紅子 是也 研末將小紅棗去核藥末入內填平用絲綿紮緊塞入鼻孔內隨量

飲醉蓋煖出汗已瀆者自然全愈未瀆者內消神效之極鼻孔照男左女右塞之藥不可經婦人手 又方 野

花椒 山茱萸 各半 用酒浸煮三炷香冷定將酒盡量飲醉發汗一身其毒自消神效 又方 金銀花 帶葉

和酒精研爛用淨瓦罐盛藥火中煨熱敷患處立愈

濕痰初起一劑消 益公和尚 歸尾 大貝母 黃芩 川牛膝 木瓜 白茯苓 檳榔 陳皮 各一 牡蠣 金

銀花 土本鱉 白僵蠶 各一錢 熟大黃 三錢 五分 加至一錢 八分 止取效更速 用無灰酒一觔煎一半空心熱

服取汗行二三次渣用酒半觔煎四兩再服

立消渾身上下濕痰並消一切無名腫毒 穿山甲 炒七錢 關羊花 兩 豬牙皂 炒一 羌活 四

分八厘加洋糖三錢熱酒調下

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com