

安替米司花

又名貴品安替米司立尼由司之名俗名指暮米辣卽野菊花其乾花頭或單

臺或重臺俱入藥品

查此花初在古時替啞弗辣司佗司書中言之名曰安替米司又代司可立弟司書中名曰阿暮米倫今植物學家以爲代司可立弟司所言者爲幾亞安替米司又有一種花在印度國代用卽甜油瑪脫里措里亞前時植物學家以指暮米辣瑪脫里措里亞爲尋常指暮米辣而甜油瑪脫里措里亞爲貴重指暮米辣又名羅馬指暮米辣近今名曰貴品安替米司

其根存多年有長小根如絲野生者其梗常依地面園中

第一百三十四圖



所種者梗直立長約一尺有多小枝上有多葉其梗圓而有多槽紋爲空心者葉似雙翎毛形分葉似線形其端似圓錐形略爲空心花頭在枝之端獨生有凸出黃色花心
 墊其邊之花瓣爲管形之分花不分雌雄而爲管形其成邊之分花白色或向外伸或向內彎而有雌分花成一行
 子房座爲圓錐形如第一百三十四圖之二號面有膜形之鱗總花葉成數行係瓦背排列法其鱗鈍其邊光如玻

璃果爲鈍四角形平滑頂有不顯明之邊無細毛頭

此花常用者有兩種一爲單瓣者如第一百三十四圖之
甲二爲重臺者如第一百三十四圖之乙此種花之花心
墊其分花變爲白色紫裏帶形此花產於英國粗砂土內
係野生者又在歐羅巴他處能得之西七八月開花英國
蘇勒省米綽末種之該處另種重臺者能蒸得藍色之油
此草之臭大而香味苦而少香花心墊之分花有此性較
他處更大又多生自散油故其單瓣花爲藥之功力較其
重臺者更大惟重臺之花更可觀故常人喜用之以爲較
單瓣者更佳種花之人不得已多種重臺者售與尋常之

人又種單瓣者售與作油作膏之人用之其爲藥之性俱藉自散油苦膏質樹皮酸少許其爲藥之質俱能從酒醕與水消化而出之

功用 爲行氣補藥與治發熱藥

揩暮米辣沖水

取法 將揩暮米辣花半兩用沸蒸水半升沖之蓋密其器待十五分時濾之

功用 爲補藥

服數 以一兩半爲一服此沖水若乘熱時飲之能助吐藥之力

揩暮米辣膏

取法 將揩暮米辣花一磅蒸水八升煮之至其水散去一半以布濾之在布內壓之再以紙濾之用熱水盆加熱熬至成膏至末加揩暮米辣油十五滴和勻之

功用 爲苦味補藥與香藥熬時其自散油化去故必加其油此膏以十釐至二十釐爲一服

揩暮米辣油

取法 加將其花合於水而蒸之則得自散油質爲黃櫻色臭大味粹此油大半在花心墊內英書云其色淡藍或黃綠漸變黃色

步蘭弟云其單瓣花每一百磅能蒸得油二磅十二兩辯
哈特曾化分此油得兩種質一爲流質輕炭質一爲含養
氣三分劑之質與發里里阿尼克酸大同小異或真相同
亦未可定

功用爲補藥與行氣藥又能治轉筋如其膏或丸可加
此油一滴至五滴爲一服

伯里脫里根

又名菊形阿那西苦
羅司特看杜辣之名

古時代司可立弟司書中言及此藥之根名曰伯里脫里
恩東方各國亦用之爲藥名曰阿苦爾苦爾哈此草原爲
阿非利加北邊所用今從阿非利加之北運至歐洲之南

用之。海納云。有一種根。與此根稍有不同。處幾爲同種。設名曰藥品阿那西苦羅司。而在德國士林茄產之。並有人種之。

菊形阿那西苦羅司。如第一百三十五圖有長梭形之根。其梗多。而靠地面生多枝。面有毛。小根所發之葉。伸長。有葉莖。面少平滑。分如翎毛。各分葉亦爲翎毛形。而有線形管形之小分。梗上之葉無葉莖。其枝祇生一花頭。每一花頭有多花。總花葉成數行。短稍似杯形。其鱗成戈頭形。而尖。邊櫻色。子房座凸。有長鈍卵形鈍子房座上花葉。邊上分花爲雌者。不能生子。上面白色。下紫色。花心墊上之分。

第一百三十五圖



其內面之翅相連

植物學家戴分對那云其根之新鮮者似梭形有多根肉

花黃色片形有五箇齒形硬
韌皮質各花瓣有壓鈍形並
有兩翅形之管而屬於此之
各件俱無之花心墊之莖有
外加另枝若干其不自裂之
硬子殼成片而有壓鈍形邊
有寬合之翅形其細毛頭短
而參差有多小齒形幾分與

厚如手指外櫻色內白色如以手握之則初覺冷後卽覺熱無臭而有極烈辣味今多生口津此根從地中海各方運至英國法國人從阿非利加之北運入德國士林茄與馬得不爾厄兩處種之其爲藥之質能以酒醕或以脫消化出之此係三種質所成一爲辣味定性松香質名伯里脫里尼此質不能在鉀養水內消化又有一種松香類質能在鉀養水中消化又有黃色辣性油質亦能在鉀養水中消化此爲克依尼之說其根內又含以奴里尼樹膠樹皮酸少許植物顏料數種鹽類木紋質

功用 能惹內外皮又爲生津藥間有用以治牙痛或舌

癱瘓爲嚙以增涎之藥又治吊鐘放鬆爲同用之藥一千八百六十四年英書刪去此藥一千八百六十七年收入英書

伯里脫里酒

取法 將伯里脫里根粗粉四兩正酒醕一升其作法與阿古尼低浸酒之法同將此酒數滴擦於棉花一小塊置於口內能治牙痛

艾

西名阿替米西亞
立尼由司之名

其花頭似乎花心墊圓板形或分花俱不分雌雄或分花分雌雄邊上分花排成一行尋常爲雌者有齒形花心莖

伸長而分叉。花心墊之分。花有五齒形。有雌有雄。或因花
子房不成熟。則變爲不能生子者。或變爲雄者。總花葉之
鱗似瓦背排列法。面乾。而其邊韌而薄。半透光。子房座上
無花葉。或爲平。或爲凸。其邊或光。或有細毛。硬子殼不自
裂。似鈍卵形。其面光。有微鬚在子房上。此爲特看杜辣之

說

艾之類。在歐洲以至各熱地俱有之。大半有大臭與苦味。

自古至今爲藥品。卽如阿白羅坦。阿替米西亞。

卽茵陳蒿

又有

尋常阿替米西亞。

卽蓬蒿

歐洲又有一種。俗名太拉艮。正名龍

草形。阿替米西亞。

卽青蒿

歐洲數處之人用爲食物內香料。

林特里云中國所用之艾粉爲莫克篩阿替米西亞之葉
此葉之面多生軟毛而歐羅巴人以樹心質或棉花等成
小管或小頭加艾粉在皮膚上燒之西俗名莫克篩卽烙
炙之意前時多用此法代徑用火燒之法因其性更緩而
能大熱皮膚治數種腦筋痛病又治交節與五臟之病今
西國不常用之如雪山土人將棉花形扯蒲大里阿之軟
細毛頭代絨用之亦可作莫克篩

見雪山植物書第
二百四十七頁

咄道尼格

此係艾類內一種未開之花頭尙未定準爲何種其藥從
俄羅斯國運至英國出售

此藥有數別名。卽如聖種子與反種子。又名吡道尼格阿替米西亞殺蟲種子。此藥在西國久用爲殺蟲藥。大半從俄羅斯國運來。然另有從巴巴黎亞拉波埃及地中海東各邦出售者。其質或爲碎爛之花莖花葉。或半開之花。或未開之花頭。此爲數種艾類之花。摘下者。未知其爲何種。花頭長八分寸之一。少有餘寬十六分寸之一。圓柱形。兩端鈍。淡綠櫻色。面平滑。形如種子。而爲若干瓦背排列之花葉。似鱗形之質。有綠色之中筋。內包四箇或五箇管形之花。臭大而味苦。少有樟腦之香。其真者不應爲圓形。如爲圓形。則疑爲尋常艾類之花。如爲生毛者。則疑爲阿蒲。

星弟阿替米西亞。吡道尼格花之性藉一種自散油類。又有一種奇異之質。名吡道尼尼。

吡道尼尼

此爲中立性顆粒形質。從吡道尼格中得之。

此質從吡道尼格中分出。其味不及阿蒲星弟尼之苦。而阿蒲星弟尼爲同類之草。所出之質。有人亦用以殺蟲。吡道尼尼之原質。爲炭^六輕^六養^六。

取法 將吡道尼格未開之花頭若干。合於水與鈣養沸之。加輕綠。令其質結成。將其結成之質。以水洗之。去其酸質。又用淡輕水^三少許洗之。分出其松香類與顏色料。再合

於正酒醕與動物炭加熱滅其色熬去其醕則得顆粒
吡道尼尼爲無色成片斜方形顆粒味微苦易融化又加
不過大之熱能乾蒸之不能在金類酸水中消化幾能在
冷水中消化少能在沸水中消化而在鹼類或鈣養水內
能消化又能在正酒醕與噶囉防內消化見光若干時則
變黃色

功用 此爲殺蟲藥如小兒或成人腹中有圓蟲西名阿
司指里司倫蒲里可愛弟司用此藥最宜

服數 如用吡道尼尼在小兒以一釐至三釐爲一服在
成人以五釐至十釐爲一服如爲吡道尼格則以六十釐

至一百二十釐爲一服

阿蒲星弟阿替米西亞

立尼由司之名以其花之全體或花頭爲藥品此爲倫書

之方

古時希臘國人用此藥名曰阿蒲星弟恩東方各國名曰阿富生典又有他種艾類代此用之

如第一百三十六圖其根似木質分支梗多而密面有槽紋生葉頗多而全草面有密細毛如絲葉遞更排列面亦如絲特看杜辣云分爲三箇翎毛形其分多而深戈頭形鈍下葉有長葉附上有短寬之葉附花葉簡花頭爲多葉成叢之密頭少向下彎形如半球分花分雌雄總花葉外