

馮氏錦囊秘錄雜症大小

合參卷二十

錦囊治療方論

百病之客乎人身也。必有因以客之。經曰：邪之所湊，其正必虛。必字何等有力。後人當進思矣。金姓一令郎，年十四而患癰病，羣醫不效。針灸繼之，消痰鎮墜之品，備嘗盡矣。其發更頻而更甚。乃延余治診，其脈洪弦有力，惟兩尺則弱。此陰道虧極，孤陽無欲。火性上炎，僵仆諸候，乃發理所然也。若用消痰鎮墜之餌，不幾更耗陰分乎。乃令空心淡鹽湯吞加味八味丸四五錢，以使真陽藏納。然陽無陰欲，何能久藏。火無水制，難免浮越。隨以重濁大料壯木一劑。

繼之以助主蟄封藏之勢則水火得其所矣下午乃服調
補氣血養心清肺和肝之膏滋一九如是調理兩月精神
倍長癰症不治而愈矣故曰治病必求其本今將九煎膏

三方具後

加味八味丸方

熟地黃

一斤用八兩清

水煎汁去渣將

懷山藥

四兩炒

牡丹皮

四兩入汁內者

爛搗爛入藥

山茱肉

去核四兩酒

澤瀉

二兩淡鹽水

五味子

二兩每箇銅刀切作兩

牛膝

三兩淡鹽

肉桂

取近裏一層有油而滋潤甜極者

製附子

薄片微火焙

為未用熟地搗爛入藥加煉

蜜杵好集羣手丸晒乾藏磁器瓶中每早空心淡鹽湯送服四錢隨後進服煎劑使陽藏而陰以秘之也

煎方

大熟地

兩一

丹參

錢一

麥冬

錢三

生白芍

錢二

茯苓

錢一

五味子

錢六

牛膝

丹皮

錢一

遠志

錢二

肉桂

錢一

甘草

錢二

牛膝

錢三

五味子

錢六

水二盞

燈心十根蓮子十粒

水二盞

燈心十根蓮子十粒

味丸後滋陰藥最忌熱服熱服則走陽分不能養陰太

冷則直入腸中又不能滲行經脈

冷則直入腸中又不能滲行經脈

冷則直入腸中又不能滲行經脈

冷則直入腸中又不能滲行經脈

冷則直入腸中又不能滲行經脈

冷則直入腸中又不能滲行經脈

冷則直入腸中又不能滲行經脈

冷則直入腸中又不能滲行經脈

冷則直入腸中又不能滲行經脈

冷則直入腸中又不能滲行經脈

冷則直入腸中又不能滲行經脈

膏滋丸方

酸棗仁

兩兩

熟地

兩兩

當歸身

兩兩

懷熟地

兩兩

金石斛

兩兩

金石斛

兩兩

金石斛

兩兩

白芍藥

三兩蜜水拌曬乾炒

製麥冬

三兩

拌炒炒黃米半

膠

二兩水洗

製遠志肉

二兩用甘草濃汁煮透曬乾焙

先以建蓮肉一觔

去心煎衣

取濃汁三十餘碗去渣人前藥在內煎取頭汁二汁去

渣熬成極濃膏滋人後藥收成大丸

揀人參

三兩研極細

白茯苓

四兩研極細

白茯苓

三兩研極細

以上收入前膏滋內丸成大丸每枚重四錢下午食遠

自湯化下一丸

旗下何宅一令郎年九歲肚腹脹極痞塊有形肌削神困

僅存皮骨耳中潰膿目中紅腫牙齦出血或時腐爛咳嗽

氣短腿膝酸疼夜不能寐目不食已成羸症乃延余治

論其病由乃起於半週之內肚稍腫硬卽加消積丸卽久服不減乃消導補脾兼而治之久服亦不效乃清熱扶脾佐以化積之藥投之其內熱腫脹亦並不減六七年來脹極則倍用行氣化滯少緩則用扶脾養胃熱極則用清熱和中以延歲月近則腹脹更甚痞硬更大牙疳耳目腫爛益甚精神益疲肌肉益削向治數醫俱爲束手待斃而已按其脈或時弦洪有力或時弦而無力明知久服尅削攻至真氣內亂轉護邪氣爲害先天之真陰真陽已竭乃中空外浮之象也要知凡痞氣所成皆由中氣不能健運以致痰食氣滯聚而不散亦非鐵石物也故古方消積藥中

必兼參朮扶正使正氣一旺自能相佐藥力以化滯於無事之中譬如腫硬氣血一和不由膿血而自散矣奈何以有形之藥峻攻無形之滯揆其意意如有鐵石物在其中也以致中氣愈弱壅滯愈固愈消愈消愈弱不死何待試不思卽大黃巴豆之迅利藥亦必仗中氣以運行人至氣絕之後灌以巴黃勸許豈能通利一物巴黃峻利之最者無人氣以運行則雖人腹而猶置於紙木器中安然不動如此一想則痞聚之類可不仗中氣以運化乎且諸病日久未有不累至根本地位受傷故初病多從標久痛必從本况此病原由根本上來者乎向來所治皆非其治

也。余始先以金匱腎氣丸料加牛膝、麥冬、五味子作湯大劑。空心溫服。數劑熱減而腹脹稍軟。隨以前劑沖入人參湯三錢。食前日二劑。十餘日後精神稍長。諸症漸退。後早晨以生脈飲送下。加牛膝、五味子之八味丸三錢。申酉刻仍以前煎方進服。如是調理兩月。熱症悉退。諸症盡平。肌肉漸生。精神健旺。向患之痞竟不知從何處下落矣。

部主政張公五令郎年七歲。亦患腹腫。醫投消積之藥。日久而脹益甚。肌肉盡削。形如鵠立。勢甚危篤。諸醫已無治法。而請余視。不過冀其十死一生耳。余曰。此幸藥誤非病拙也。猶土乾則卑。再投燥脾。尅削益令中氣愈虛。而難健。

行於四肢百達乃壅滯於中脹滿益甚自然面目四肢瘦削不堪要知此長彼消總此氣也此氣斷無消之之理性宜溫養以壯之滋陰以配之補其火以生土益中氣以健運健運一行清濁自分腫脹自愈要知諸病不能出乎真陰真陽之外而人之求生者寧能外乎真陰真陽之中者乎真陰真陽者諸危病之要領求生者之根本也陰陽者何腎中之水火是也乃定一方以八味去附子倍熟地更加牛膝麥冬五味以潤水枯金燥更能使胎氣注於腎而有所歸也十餘劑後諸症漸平乃以前方作丸生廉飲送之月餘而全愈奈不能久服病雖去而根本未固次年夏

月兩脇下忽發腫硬。形如婦人之乳垂下。外科投以解毒之劑。不惟不效。兩頤之下。腫亦如之。連翹金銀花之類。進以升十。敷貼之藥。塗以百計。毫無減勢。或議開刀。病家大懼。乃與余商治。余曰。此因去年根本未復。入夏陽氣浮外。肝腎之氣不能牢固於下。以致無根之火上炎。則關津管束之處。任其衝燥。爲累何毒之有。經曰。頸項者生氣之本也。乃肝之俞。又咽喉之管束。陰陽之道路。蓋三陽之脈自頸而上。三陰之脈自頸而還。惟其虛也。則無力以還腎。更不能收攝以納。乃浮而腫也。仍以去年之煎方。加青皮四分。土貝母二錢。食前服之。二三劑後。腫減大半。不及十劑。

四腫俱退矣。

戶科李老先生令郎少年鄉薦入都會試。適患咳嗽甚煩。余見其身長肥白。頰色常紅。已知表有餘而裏不足。上假熱而下真寒。病必當劇。勸以重服藥餌。令尊先生以有通譜候選之新貴。甚精醫學。日在診治。自當霍然也。詢其藥。乃山梔黃芩花粉橘紅貝母蘇子杏仁之類。余聞之而心甚駭。欲阻之。恐似嫉妬之言。欲順之。不忍坐視誤藥傷人。惟力陳此病頗重。望謹慎斟酌。勿輕忽從標清理。致生他變。渠皆置之勿聽。數劑後而嗽轉甚。煩躁喜冷。倍常益信。寒涼爲對症之藥。倍用之。而病轉劇。乃疑家居不能靜攝。

以致服藥無靈。令移於菴觀之中。同一按摩導氣者爲伴。再兼藥餌。內外夾攻。無不愈矣。不意二日後。煩躁更甚。粒米不食。飲水無度。更信爲實熱。以三黃丸下之。究竟利行不多。而喘促逆奔之勢。已見而未甚。又一劑後。夜半喘急大作。有出無人。遍身麻木。漬汗如注。神昏口直。口噤不言。使者歸而告急於主。先生窘而告急於余。乃促騎馳去。覽其狀。委頓殆盡。按其脈。兩寸左關尙存而已。時當六月。商與四逆理中。主人畏懼。改以人參一兩。麥冬二錢。五味子六分。肉桂錢餘。主人始允。急煎服之。喘減片刻。奈病大藥小。頃復大作。主人不咎寒涼之罪。而反寃參桂之誤矣。余

思盡吾之力。尚可以活。釋彼之疑。若徇彼之見。必死而已。反受其怨。乃堅定一方。勒合服之用。炒白朮三兩。人參二兩。炮薑三錢。五味子一錢。五分。製附子三錢。煎濃汁半碗。灌之下咽之後。病人張口大聲云。心小如火。烙欲死。主饑疑怨交起。余總不動聽之。頃然又大聲云。臍間更疼。更熱欲死矣。余竊喜其陽能下達。未至絕也。果少頃喘定。汗收手足溫。而神始清。語言反甚無力。握余手而云。寒家並無好處。及先生先生何肯堅心立救余命也。余曰。見死不救。非爲醫矣。分內之事。何足謝爲。然此方以朮多而參少者。因中宮久困寒涼。不先爲理中。則陽氣終難下達也。

一張姓暮年而生一子年十三歲矣因暮年老人中風請
余診治見其子出迎而步履甚難問其故則曰近日忽患
腿癰旦夕疼痛已請外科調治數日俱云勢難消散出膿
得兩月收功余見身體浮胖面色晄白已知暮年所得先
天不足矣再診其脈六脈沉細而微復視其腫則右腿腫
脹已極色白而未冷余思經曰氣血不和留結爲癰今吾
使氣血旣和而無留結則病何自而感令以昨進乃父之
八味湯加牛膝杜仲各二錢食前服之病家幸最莫逆余
言是諾一劑之後腿卽溫煖而腫痛減半再劑而全退三
四劑後足力如故步履如常矣

吏部考功司正郎河南張老先生性稟端方居官清肅原
任作令臨潼適當吳逆叛爲文兼武備旦夕焦勞遂得怔
忡耳鳴諸症療者俱以痰治湧出痰涎斗許復用滾痰丸
餌痰勢雖清精神內奪繼而逆寇蕩平行取擢列銓部兢
兢辦事殫心竭力歷有年矣忽於辛未七月十二日正當
衙門辦事卒倒殭仆痰湧齶齶日竄日開手足強直自汗
如雨倉卒擡至私宅醫者病家俱謂斷無生理而危在頃
刻也值禮科王老先生探視見其勢甚危篤力延余視按
其脈則六部皆豁大無倫驗其候脫勢已具八九實刻不
容緩矣乃立一方人參三兩白朮二兩附子五錢煎濃汁

大半碗灌之。令其照方日三劑。夜二劑。按時進之。以補接
虛脫之勢。服後脈氣漸斂。身熱漸和。潰汗漸收。次日仍用
前方。日二服。夜一服。至三日。諸症漸減。但殭仆不省如故。
余曰。此丁夫未到故標症稍平。而失散之本元神氣未能
歸復也。不可少緩。仍照前方。日二夜一。凡飲藥後必灌濃
米汁半鍾。以保胃氣。以助藥力。或有勸入風藥者。余曰。保
之不服。敢散之乎。或有勸加痰藥者。余曰。補之難實。敢消
之乎。更有勸清火之藥者。余曰。此尤誤矣。元陽欲脫。挽
之尙恐不及。敢敗之乎。余之重用白朮附子者。旣壯人參
培元之力。而消痰去風息火之義。已在於中矣。倘稍涉標

治則峻補之力中反寓攻剋之性補性難於奏功剋削易於見效走洩之實一開虛症蜂起勢益難矣違衆勿用片三日所用人參計共三十五兩附子共用六兩白朮共用二十四兩直至三日晚間忽能言語稍省人事索粥半碗進食而睡其齁齁目竄諸症仍在也於四日早晨立方早間陽分用大補心脾氣血之藥如棗仁當歸白朮芍藥茯神遠志人參肉桂五味之類下午陰分正用八味湯冲人參濃汁服之如是加減出入至六七日後諸症漸平飲食漸加每日人參尚用四五兩後數日早晨用生脈飲送服八味丸之加牛膝杜仲鹿茸五味子者四五錢日中加減