

欽定四庫全書

子部

小兒衛生總微論方卷十二



小兒衛生總微論方

小兒衛生總微論方

小兒衛生總微論方

小兒衛生總微論方

小兒衛生總微論方

小兒衛生總微論方

小兒衛生總微論方

月風寒飲食冷熱以邪
每結作或水穀不聚或

曰水穀痢謂便下糞
也然雖是瀉便時亦

痢謂便下純白膿也三

曰熱痢謂便下純赤血也四曰滯痢謂便下膿血相雜也五曰積痢謂有積傷為痢浸久或差而復發也六曰疴痢謂患疴瘡而下痢也七曰蠱痢謂如蠱毒下紫黑血或如赤豆汁或如鷄鴨肝片也八曰休惜痢謂下血黑黯中有白物如腸中之脂或如爛魚腸之狀此腸胃潰傷患者更休愛惜故以名之亦名休息者謂患即無休息而至死也凡痢若粥藥不能進者此便為死候也治水穀痢方已具前瀉項之下

治冷痢方

玉腸散治冷痢初即大便青色後乃作膿

白石脂

當歸洗焙

丁香

白朮

各一兩

草薹薹

去皮

厚朴

姜製各半兩

右細末每服半錢粥飲調下無時

厚朴圓治藏寒泄瀉下痢純白腹中絞痛虛氣脹滿手足逆冷

足逆冷

厚朴

姜製半兩

訶子

半兩炮去核

白龍骨

半兩

白礬

半兩

右用一器盛之鹽泥固濟留一竅子木炭火煨烟息
為度取出為末麵糊和圓黍米大每服十圓米飲下
食前

烏骨散主治如前

右烏魚骨去皮研細末每服半錢米飲調服或炙黃
用之亦治婦人漏血

藍汁主治如前

右以藍青取葉搗令極爛絞取汁略溫每服半合或

一合無時

馬齒汁主治如前

右杵生馬齒菜絞汁略溫每服一合入蜜一匙頭許
調勻空心服

石蓮散主治如前

右以石蓮不拘多少去皮用沙糖炒過為細末每服
一錢米飲調下乳食前累驗

胡黃蓮圓治血痢下多久而不差或作藏毒下血帶青

黃色

胡黃連炒 蕪荑揀淨炒 夜明沙各一分

右末猪膽汁和圓黍米大每服十圓陳米飲下無時

治赤白滯痢方

瞿粟飲子治赤白滯痢

瞿粟殼半兩蜜炙 人參去蘆一分 厚朴去麤皮生薑製一兩 白茯苓半兩

甘姜一分炮 烏梅三箇去仁連核用 御米殼三箇 阿膠三片蛤粉炒焦去粉

右同末每服一錢水酒各半盞煎數沸溫服乳食前

嘔吐者不可服

三奇湯治白痢

御米殼

二兩塗
蜜炙

酸石榴皮

一兩塗
蜜炙焦

阿膠

半兩蛤粉
炒去粉

右細末每服半錢烏梅甘草湯調送下乳食前

治熱痢方

勝金圓治熱痢下血

黃蘗

去麋皮
半兩

赤芍藥

四錢

右末飯和圓如麻子大每服一二十圓米飲下乳食

前

當歸散治如前

當歸

去蘆并土一分焙

芍藥

一分炒

黃蓮

去鬚一分炒

枳殼

一分去穰麩炒黃

右細末每服半錢水五分煎至三分溫服下血多者

入甘草一寸同煎乳食前

槐花散治血痢不差

槐花

揀淨炒

地榆

炒各等分

右細末每服半錢一錢米飲調下乳食前

聖効散治血痢久不差

赤石脂一兩 白龍骨一兩 阿膠一兩
燒赤 煨 粉炒去粉

訶黎勒煨去核 木香半兩 黃連去鬚 乾姜半兩
用半兩 炮

甘草半兩
炙

右細末每服半錢煎粟米飲調下食前

厚腸圓治血痢腸虛

黃連去鬚 川練子去核各 木香 阿膠剉蛤粉
炒 一兩 炒去粉

當歸

去蘆并土

吳茱萸

去枝梗微炒各半兩

右細末粟米飯和圓黍米大每服一二十圓米飲下

食前

白梅飲子治血痢不止

右以白梅一枝去核鹽水研爛合臘茶醋湯沃服之

昔陳應之治曾相痢血百餘日諸醫不能療陳用此

一啜而差又梁相亦病痢血應之曰此挾水穀者用

三物散數服而愈

三物散

胡黃連

烏梅肉

竈下土

各等分

右末每服一錢臘茶清調下食前空腹溫服

又方治熱痢下血頻併不差

右以白梅五箇取肉臘茶二錢同研勻細每服一錢
或半錢白湯調服或以醋湯沃服之量大小加減食
前

黃蓮丹治如前

黃連去鬚 二兩 當歸去蘆并土 一兩 洗焙 白頭翁去蘆 三分

蔓菁根三分洗 木香半兩 川練子麵裹煨去核用半兩

右細末粳米飯和圓黍米大每服十粒米飲下乳食

前或十五粒

必効圓主治如前

川黃連去鬚 二兩 大棗半升 乾姜一兩 肉苳菴一分 麵裹煨香去麵

右細末糊圓黍米大每服五七圓米飲下乳食前兒

大增之

雄黃散治腸胃虛冷下痢頻併腹痛不可忍後重努軀

肛脫

雄黃一分研細水飛乳香一分研細白礬飛過一錢研細

右同研勻每服嬰孩一字二三歲半錢陳米飲調下

日三服乳食前

艾葉湯治虛冷下痢白膿

艾葉一兩當歸一兩乾姜一兩木香半兩
去蘆并土一兩
炮

訶梨勒煨去核
用半兩

右細末每服一錢水一小盞入粟米少許同煎至五分去滓溫服食前大小以意加減

又方治如前

右以臘茶一錢入熱醋少許調服乳食前大小以意加減

又方治如前

右以沙牛角鯁燒存性為末粥飲調下一錢或半錢乳食前

阿膠圓治如前

赤茯苓

赤芍藥

各一兩
為細末

右以米醋煮阿膠一兩和圓棗豆大米飲下一二十

圓乳食前

酒煎湯治腸胃虛冷泄瀉不止變成白痢

甘草

半兩
炙

右麩末每服二錢水一盞生姜三片棗一箇煎至半盞去渣放溫量大小加減服赤多者加黑豆十粒同

煎

三神丹治如前

右以肥大無尖草烏頭三箇各去皮一箇生一箇炮熟一箇燒作黑灰同為細末麵糊圓如蘿蔔子大每服三粒水瀉井花水下白痢乾姜湯下赤痢甘草湯下赤白滯痢乾姜甘草湯下食前

木香炒蓮圓治脾胃虛弱寒濕冷熱相搏滑泄下痢赤白