

醫學從衆卷六

閩吳航陳念祖修園甫著

次男元犀靈石叅訂

孫男

心典徽菴

仝校字

心蘭芝亭

傷暑

夏日炎炎耗傷元氣。故病必體倦脉弱身熱。自汗煩躁面垢唇青。李東垣以動而得之為中熱。

靜而得之。為傷暑。熱陽而暑陰也。其寔未確。蓋以暑字從日。暑即熱也。何必分名。但動靜二字。是陰陽分別。茲仍分動以得之。靜以得之。以為此症提綱。

何謂動以得之。長途赤日。荷重作勞。因而致病。

如大熱

傷暑而發熱頭痛。與傷寒症司。但傷寒
脉浮而緊。傷暑脉洪而虛。以此為辨。香

蕭是解
否蕭已與

表却暑之藥。夏月之用。大渴脉虛自汗。

何謂動以得之。長途赤日。荷重作勞。因而致病。如大熱。傷暑而發熱。頭痛。與傷寒症司。但傷寒脉浮而緊。傷暑脉洪而虛。以此為辨。香薷是解表却暑之藥。夏月之用。香薷與冬月之用。麻黃同義也。大渴脉虛自汗。以白虎人參湯主之。更加身體重着。是暑而挾。

何謂動以得之。長途赤日。荷重作勞。因而致病。如大熱。傷暑而發熱。頭痛。與傷寒症司。但傷寒脉浮而緊。傷暑脉洪而虛。以此為辨。香薷是解表却暑之藥。夏月之用。香薷與冬月之用。麻黃同義也。大渴脉虛自汗。以白虎人參湯主之。更加身體重着。是暑而挾。

何謂動以得之。長途赤日。荷重作勞。因而致病。如大熱。傷暑而發熱。頭痛。與傷寒症司。但傷寒脉浮而緊。傷暑脉洪而虛。以此為辨。香薷是解表却暑之藥。夏月之用。香薷與冬月之用。麻黃同義也。大渴脉虛自汗。以白虎人參湯主之。更加身體重着。是暑而挾。

濕宜蒼朮白虎湯主之。若有吐瀉腹痛。此方不可輕用也。若前症發熱身疼。口燥咽乾。或吐或瀉。宜黃連香薷飲主之。又有暑風症。因暑氣鼓激痰火。塞碍心竅。以致卒倒不省人事。宜吐之。或以千金消暑丸灌之。

白虎湯

見傷寒

一加人參二錢。名白虎人參湯。治汗出惡熱。身熱大渴等症。一加蒼朮二錢。名蒼朮白虎

湯治汗出身熱足冷等症。

黃連香薷飲

方見時方

去黃連名香薷飲治同。

暑風發搐加羌活秦艽各一錢

瀉利加白朮茯苓各一錢五分

虛汗不止加白朮一錢五分炙黃芪三錢

心煩加梔子硃砂各一錢

嘔吐加半夏二錢藿香陳皮各八分薑汁少

許

何謂靜以得之避暑於深堂大厦為陰寒所遏暑不得越手足厥逆者大順散主之霍亂吐瀉口渴者五苓散主之不渴者理中湯主之亦有以二湯送下六一散三錢者巧法不可言傳也大順散

乾薑

炒一錢

甘艸

炒八分

杏仁

皮六分去炒

肉桂

六分

共為末。每服五錢。水一鍾。煎七分。服。如煩燥。井花水調下。三四五錢。

又有遇夏即病。秋後即愈。是暑傷元氣。如草木遇盛日則痿。得雨露則挺。名曰注夏症。宜補中益氣湯。照薛氏醫按。去升麻。柴胡加麥冬一錢五分。五味黃柏各五分。炮薑三分。服三四劑。又生脉散。清暑益氣湯。六一散。皆却暑之良方。一切暑病。不可須臾離之。學者當於三方求其

奧旨。難以縷陳。

脉法

傷暑脉洪而虛

大蒜新汲水方

治中暑法

大蒜

一把

同新黃土研爛。以新汲水和之。濾去渣。灌入即活。凡中暑傷暑。不可便與冷物。俟稍甦。方

可投冷物。則中氣運動無患也。

田中乾泥圈臍方

治中暑昏眩煩悶欲絕急救法

取田中乾泥。做一圈。堆在病人肚上。使少壯人撒尿於泥圈肚臍中。片時即得生甦矣。後不可飲冷湯。須進溫米湯。

絲瓜白梅方

治中暑霍亂

絲衣葉片一

白霜梅一枚并核中仁

右同研極爛，將新汲水調服，入口立瘥，切不可飲熱湯。

陳皮藿香湯

治傷暑急暴霍亂吐瀉方

陳皮錢五

藿香錢五

右用土澄清水二杯，煎一杯，服之立愈。

扁豆飲

治傷暑

取菹荳葉搗汁一碗飲之立愈

鹽薑湯

治傷暑霍亂上不得吐下不得瀉身出冷汗
危在頃刻者

食鹽

一兩

生薑

五錢切片

同炒變色以水一大碗煎服吐出自愈不可
熱服好後切不可遽吃飯食俟餓極後方可

吃稀粥

取新汲水法

俱見種福堂

治中暑昏眩煩悶欲絕急救挖地深三尺取新汲水傾入坑內攪濁飲數甌即愈

腫症

腫者腫於外脹者脹於內二症宜分看然二症相因亦宜合看

腫者皮膚腫大古人有氣水之分其寔氣滯則水不行水不行則氣愈滯二者相因為病水脹篇以按其腹窅而不起者為氣腫按其腹隨手

而起。如囊裹水之狀者。為水腫。景岳反其說。以水症按之。窅而不起。此水在肉中。如糟如泥之象。未必如水囊之比。按之隨起。惟虛無之氣。其速乃然。余閱歷之久。知二說亦不必拘。大抵腫微則按之隨起。腫甚則按之不起。兩脇及轉動之處。按之即起。足面及膝股內側。按之不起。辨症不必以此為憑。當於小便之利與不利。以分陰陽。身之多熱與多寒。脉之洪大與細微。以分

寒熱病之起於驟然與成於積漸。及年高多病。與少壯無病之人。分其虛寔。是以先腹而後及四肢。或先四肢而後及於腹。分其順逆。景岳云。水氣本為同類。治水者當兼理氣。蓋氣化水自化也。治氣者亦當兼行水。以氣行而水亦行也。此症當與癰閉症參看。初患腫病。氣喘不得卧。以五皮飲為第一方。蓋此方以皮治皮。不傷中氣。所以為妙。

若腫而兼脹。小水不利。宜胃苓湯主之。或以四
苓散以半熟蒜搗丸服。極妙。

五皮散

按上身腫。宜發汗。加蘇葉。荆芥。秦艽。各一錢
五分。

下身腫。宜利水。加赤小豆。木通。各一錢五分。
防已一錢。

口渴多熱。小便不利。為陽水。加滑石。木通。車

前子麥冬各一錢五分。木香五分。

不渴小便自利。多寒為陰水。加白朮蒼朮各

二錢。附子乾薑木香各一錢。

脉滑實腹脹脇滿。加生菝葜子一錢五分。白芥

子八分。枳實一錢。半夏二錢。

婦人經水不調而腫。是血化為水。名水分。加

紅花八分。桃仁香附各一錢五分。婦人經水

適斷即腫。是水化為血。名氣分。加當歸三錢。

五靈脂醋炒一錢五分。香附一錢五分。

按服此方愈後必加減腎氣丸及六君子湯

之類收功。

胃苓散

俱見妙用

四苓散加味為丸

白朮

炒一兩

茯苓

二兩

猪苓

一兩

澤瀉

一兩

研末以半熟蒜為丸，如菜豆大，開水送下三