

欽定四庫全書

子部
博濟方卷五



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

博濟方卷五

瘡科

疔者五臟之脈不和所致

不調者外氣經絡不和
氣虛則腠理開疎寒邪
衛氣從之與寒邪相

宋 王衮 編

五臟主裏氣行經絡而

苦怒不常飲食不節陰

氣虛則腠理開疎寒邪

衛氣從之與寒邪相

衛氣從之與寒邪相

欽定四庫全書

博濟方

一

搏故壅遏不通氣者陽也陽氣蘊積則生熱寒熱不散
故積聚成癰疽也癰之狀毒氣浮淺皮薄以澤疽之證
皮厚似牛領之皮毒氣深也久則熱勝於寒熱氣淳盛
畜積故傷肉而敗肌肉壞則化爲膿血癰患屬表骨髓
不枯易爲治療疽患屬臟傷骨爛筋則難理經曰一寸
二寸爲癰三寸五寸爲癰五寸至一尺爲疽一尺至二
尺三尺曰竟體疽疽成圓竅皆出諸氣人有憤鬱不遂
志欲者血氣畜積亦多發此疾凡瘞癰者是六腑受邪

經絡壅滯而發熱毒浮淺不能爲害但出膿血時令盡
不爾則再攻爲瘡愈盛矣

治一切癰腫未破疼痛令內消

用生地黄杵如泥隨腫大小攤于布上糝木香
末于中又再攤地黄一重貼于腫上不過三
五度

抵聖丸

治骨疽瘡及冷漏久不合者

滴乳香

膩粉

白礬

燒成性
各等分

右三味同為細末每遇患者先用鹽醬水洗之以

津唾調之貼瘡上必效

殘霞膏

治風毒流注惡瘡熱疼生肌化毒

烏蛇

四兩

五倍子

一兩半

蛇皮

半兩已上
生使剉碎

巴豆

二十箇
去殼

雄黃

牙銷

各一兩
研碎

麝香

續添
一錢

右件依灑脩事於銚子內入油二觔半煎聞油香

入前藥熬候藥并巴豆焦黑色漉出諸藥不用却
入黃蠟一兩半慢火養成膏以磁器內盛但有風
毒瘡以小紙攤貼妙

羚羊角飲子

治丈夫婦人風毒攻衝頭面生瘡虛腫等

羚羊角

犀角

羌活

檳榔

人參

已上各一兩

當歸

少許

右件剉碎畧焙杵過分作四貼每貼用水一升煎

至四合分作兩服空心臨卧分服其每貼兩服滓
更用水半升煎至七分又作一服喫之溫服立差
敗風膏

治本臟風毒攻疰生瘡及熱毒氣注赤痒

白芨

半兩

白蘞

半兩

白礬

一兩

剪草

一兩半淨洗細剉

吳茱萸

一分

水銀

碗豆大

麝香

少許

右七味爲末相和先用油半觔以下磁碗內盛以
慢火熬令沸更入蠟一分同煎三五沸却安冷處

入前藥末調和自然成膏或是瘡以鹽湯洗後以貼在瘡上

四白散

治腎臟風毒攻注四肢頭面生瘡遍身癢痒

白花蛇

一兩半酒浸一宿炙令香去皮骨秤

新羅白附子

白僵蠶

微炒

白蒺藜

微炒去刺各一兩

右四味同杵爲末早晚空心溫酒下二錢

檳榔散

治腎臟風攻疰生瘡兼療惡瘡

甘草 黃連

蜜陀僧各一分

檳榔一觔炮

木香少許

右五味同杵爲末先以溫鹽漿水洗過瘡挹乾以

唾調貼之止痛生肌

烏犀膏

治皂角水及惡水入瘡口內熱痛不止

皂角子

不計多少燒灰存性用三分

右先研皂子絕細續入沙糖和勻如膏貼於瘡立效

黑神散

治腸風痔疾

羌活去蘆 黃耆 蔓荊子 狗脊去火燎毛

枳殼去麩炒 檳榔 蛄蛄以盛盡藥為度不以箇數蛄蛄去子留瓢

右等分杵羅為末入蛄蛄中盛于砂合或瓦罐子內鹽泥都封塗之火煨通赤候冷取出藥末更別

用藥如後

荊芥子

白蕪荑

二味與前等分

木香

減半

右同前藥杵羅爲末空心茶酒調下一錢日三服
別無忌

治痔方

黃檗

黃連

黃丹

膩粉

白礬

右爲末各用三錢都一處和令勻患者先煎葱湯
洗後用藥末一錢塗之久患不過三度理之大有

效楊倓家藏方無膩粉名三黃散

乳香散

治風毒痔瘡

乳香

豬牙皂角

穿山甲

各二兩

蛇蛻

一條頭尾全者

蒟葉

四兩去兩頭粗硬者

黃牛角尖

一對可長二寸以來

右都入在砂罐子內蓋口用鹽泥固濟曬乾用十

觔炭火煨候碧焰子出去火放冷取出細研每服

二錢用胡桃肉一箇細研以酒半盞入藥同調空

心服五服後見效

追毒膏

治瘰癧神效

丁香七箇 麝香一錢 萇蓉五十粒

雄鼠糞七粒兩頭尖者以麥麴兩匙同炒候麴黑黃去麴用

斑猫三箇去翅足以糯米炒令黃去米用

槲皮三觔去麁皮了搥碎細剉以水二斗煎取四升濾過重熬候成膏然後入諸項藥

右六味同杵為末候槲皮煎溫和乃入諸藥攪令

勻貯於磁器內每服空心以溫酒一盞調下三匙
以來臨時更看人大小及肥瘦加減斟酌用之喫
了更以清溫酒下之便仰臥須臾即吐出若病根
年深者如蝦蟇衣魚腸相似近者若蜆肉吐了以
溫水漱口粟米淡粥補如無粟米亦可忌一切毒
物月餘

血竭散

治瘰癧已破膿水不止者

青州棗

二十箇
燒為灰

乾地黄

半兩別
杵為末

血竭

炒二
錢半

右三味都細研如粉以津唾調貼瘡上

治瘰癧滿項不破及腫疼痛方

用不蛀皂子三百箇酒一升半化硃砂一兩同

浸皂兒七日以文武火熬成候酒盡為度每至

臨卧含化三粒限半月必差

逐邪散

瘰癧者由風邪毒氣客於肌肉隨虛而停結為瘡如

李梅棗核大小兩三相連皮肉間時發寒熱是也久則潰膿連屬而生久不愈則為瘰癧瘻不以年遠限之必效

皂子

不限多少以絹袋盛入廁中浸三七日取淨安地坎中剉蓋出毒一宿焙乾搗為末

斑猫

五十箇去頭翅麋慢火炒令黃色去却麋後搗為末

右用皂子末二錢匕斑猫末一錢匕水銀粉二錢

生鷄卵一箇取白傾盞內更入飯飲半盞并藥一

處打勻四更初服至五更取下毒物或從小便中

下出如有些小澀痛不妨或患及五年只三服三年只二服二年只一服忌口只用燒鹽喫五七日其方曾經親驗甚有神效

生犀丸

次日服消毒化結聚

生犀半分

生龍腦半

真麝香半

紅娘子二十箇

班猫二十一箇去頭翅同紅娘子着豆麪炒焦黃爲度

右五味並爲末用豆麪糊丸如菜豆大每日空心