

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百九十五



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院院使_臣張聲基

編修_臣倉聖脈覆勘

周王朱橚 撰

普濟方卷一百一十四
小兒吐瀉
小兒吐瀉

此者由乳母
乳變敗乳若
胃氣不和
吐瀉不止

致令風冷之氣入於乳
自故成嘔吐其青涎夾
去舊宿敗乳然後服藥

用醋乳法以治之
氣散薑棗煎服逐去寒邪次服理中
服香蘇散夾和藿香正

大定回春錄

普濟方

一

湯加丁香木香煎服以溫養乳母

方

聖石丹治小兒胃氣不和乳哺重沓及食入不消或呼吸風冷即令嘔吐若不止最為大病胃氣虛嘔吐久

差神驗

真陽起石

半夏

洗七次焙各半兩

人參

去蘆不灰木洗炭灰

伏時二兩

杏仁

同巴豆製

巴豆

各一七箇上同連皮燈上煉為度研末

阿魏

研一

錢

木香

白茯苓

母丁香

各一兩

礞石

炭灰燒一伏時四兩

右先將八味搗羅為末次用杏仁巴豆阿魏研末同入湯泡炊餅和丸如龍眼大每服一粒水一盞入生薑一皂子大同擘碎煎五分溫服須於銀器中煎藥石器亦得

治胃寒嘔吐方

金液丹 青州白丸子

右合和為末麪糊再丸如米大米湯送下仍服助胃膏

助胃膏治小兒冷氣入胃嘔吐不已

人參去蘆 白朮 白茯苓 甘草炙各半兩 砂仁四十箇 白

豆蔻十四箇 木香三錢 丁香半兩 乾山藥一兩 肉豆蔻四箇

炮

右為末煉蜜丸如芡實大米湯下一歲服一九加一方

香陳皮

丁香丸治小兒胃虛寒腹疼吐逆

丁香 木香 藿香 牛黃各半兩 腦麝二錢 膩粉少許

右為末麪糊丸小豆大熱湯化一九服之

金鍼丸治小兒冷氣吐逆不止心胃痞滿

陽起石

杏仁

十五枚湯浸去皮尖雙仁炒

不灰木

生研半兩

阿魏

半錢巴豆去皮膜十二枚

右除巴豆杏仁別研外為末後入二味再研勻以糯

米飲丸如雞頭仁大焙乾每服一九同鍼穿燈焰上

燎透為度入鹽少許研細冷薑湯調下量大小加減

以意

溫脾散散寒濕治嘔吐

厚朴

去皮塗薑汁炙香熟一兩

丁香

白朮

乾薑

各半兩

肉桂

一分

右為末每服一錢煎人參湯調下

中結丸治脾胃冷吐逆水食不下噎妳此因乳母多食

酒肉淹藏毒物得之

禹餘糧

火煨赤米醋淬牛兩

巴豆

麩裏煨七粒

朱砂

皂子大

定粉

炒二

錢麝香

少許

右為末蒸餅為丸如菉豆大每服三五丸遠志湯下

流星散治小兒胃氣虛冷痰吐嘔逆

半夏

十四箇大者生用

胡椒

四十粒

右為麤末每服半錢水一盞入生薑一分油七滴煎

至四分去滓溫服

橘皮湯治小兒嘔吐膈上有冷

陳橘皮

湯浸去白焙

細辛

去苗葉

乾薑

炮製各二分

大黃

剉炒

甘草

各
三分

右麤搗篩每服一錢水七分盞煎至四分去滓溫服
分三服一日令盡更量兒大小以意加減

瑞蓮散治脾胃一切虛寒嘔吐不食並皆治之

石蓮肉

一兩

木香

丁香

各二錢半

人參

三錢

澤瀉

三錢

訶子

肉

一箇紫蘇子

炒牛肉豆蔻

二箇

白芷

牛陳皮

半兩

右為末每服一錢薑棗湯下

熱吐

附論

夫小兒熱盛患極熱而吐更下熱藥脾胃熱而胃口閉

所以吐傷水穀不通九下湯藥乳食只伏在管胃口不
開脾伏乳食上下不動若下取藥胃口不開只在胸膈
不上不下乃是結腸翻吐候也歌曰得患初因是熱傷
最忌庸醫見熱病仍將熱藥嘗致令胃閉并腸結莫
服冷藥不須涼若還更取兒當死先宜開胃後通腸

方

辰砂丸治胃熱吐逆不止及驚風涎盛潮作

辰砂

研別

水銀砂子

各一兩

牛黃

腦麝

別研各半錢

生犀

末

天麻

白殭蠶

酒炒

蟬殼

去土

乾蝎

去毒炒

麻黃

去節

天南星

湯浸七次切了
焙乾稱各一分

右為末再研勻熱蜜丸如菉豆大朱砂為衣每服三
丸或五七丸食後煎薄荷湯送下

保命膏治吐逆不定服熱藥過多不能瘥者

丁香 山大戟

大黃

炮

不灰木

燒紅
放冷

甘遂

各一分

上俱為
細末

朱砂

細研

水磨雄黃

細研水飛
各半兩

粉霜

水銀

用結錫砂子
各一錢重

巴豆

去皮心膜不出
油研細十箇

右都研勻用黃臘四兩銀石器中鎔攪成膏旋取和

九如黍米大每服未周歲一粒二三歲兩粒四五歲
三粒六七歲五粒十歲已上七粒用新汲水下

清膈飲治小兒伏暑嘔吐者最宜服之

淡竹葉去枝梗剪香薷各一檀香去蘆半

夏湯洗白茯苓甘草各半兩白粳米一合

右為粗末每服一錢水一大盞煎至六分去滓溫服
量兒大小以意加減一方薑棗煎

益胃湯治胃虛挾熱嘔吐不止

丁香

人參

去蘆頭
各一兩

訶藜勒皮

一分官桂

大黃

炮
黑

黃各
十兩

右為細末每服一錢水一小盞入生薑二片煎至五

分去滓服溫下

妙聖散治小兒胃熱吐逆

龍腦

粉霜

膩粉

滑石

各等分

右研為細末麪糊為丸如菽豆大每服一九煎乾柿

湯下不拘時候

麥門冬散治小兒嘔吐心胃煩熱

麥門冬

去心焙

甘草

炙微赤剉

人參

去蘆頭

陳橘皮

湯浸去白瓢焙各一

分

右為散入淡竹茹茺根各一分剉碎每服一錢水一

小盞入生薑少許煎至五分去滓稍熱頻服量兒小

大以意加減

香茹散治小兒熱吐秋夏多伏暑出有黃涎頭額溫至

心熱小便赤澀或乾嘔無物霍亂吐瀉轉筋腹痛宜

服此乳母同之又宜服甘露飲

香薷一兩厚朴製白扁豆各半兩

右先用薑汁四兩杵厚朴令細炒令黃赤色入香薷扁豆二味都為末每服五錢水一盞酒一盞共煎去滓入甕瓶內蠟紙封沉入井中候極冷取出一餅服加減兒母同

甘露飲治證同前

方見本門霍亂吐利類一名玉露散

蘆根粥治小兒嘔吐煩熱渴

生蘆根

剉二兩

粟米

一合一方
作糯米

右以水二大盞煎至一盞去滓投米作粥入生薑蜜
汁少許服

甜消散治小兒風熱吐不止

甜消

一錢

滑石

白膩者
半兩

右為散每服半錢用漿水半盞入生油一點打勻調
下極者三服必定兒大者每服一錢忌生魚菓實

治小兒壯熱嘔吐不住食驚癇方