

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百四十三



南京中医药大学图书馆版权所有

次子

非濟不卷

五

周王朱橚撰

傷寒
傷寒
傷寒

金匱要略

虛而入攻於腸胃則下

黃十益濕字

熱下膿血如魚腦或爛

江右朱子

刺腹滿身熱下痢者不可攻其表汗

六七日下利更發熱而

痢者其人汗不止者死但有陰無陽故也下痢有微熱
其人渴脈弱者今自愈脈沉弦者為下重其脈大者為
未已脈微數者為欲自止雖發熱不死少陰病八九日
而身體手足盡熱在膀胱必便血下痢陽明病下痢其
脈浮大此皆為虛強下之故也傷寒下痢日十餘行其
人脈反實大者死 又云傷寒下痢其種固多然皆由
表實裏虛寒熱濕氣乘虛客搏於腸胃之間腸胃隨其
所傷而下若寒則青白熱則黃赤若寒熱相雜則赤白

俱下兼以濕毒則又下膿血如魚腦如爛肉也其候不
同有下痢而脈虛者有下痢而脈實者有濕毒勝而腹
痛者有熱氣盛而煩渴者有津液搏滯而腸垢者有燥
屎結聚而譫語者其要固在審別虛實治之也 下利

須別陰陽三陽下利身熱太陰下利手足溫少陰厥陰
下利身涼無熱此大槩也自利不渴小便色白脈微清
穀厥冷惡寒凡此皆寒渴欲飲水尿色如常泄不赤黃
發熱後重凡此皆熱毒之風邪入胃木來勝土故大腸

暴下其裏虛脇熱者下利尤多或解散或攻泄或溫中
或固下焦或利下便隨症有條但不容發汗蓋邪氣內
攻若外復泄其津液則胃氣轉虛必脹滿矣然則下利
之脈何如曰身涼脈小者順身熱脈大者逆大則為虛
微弱則自止滑而數者是又有宿食也若夫下利譫語
而目直視下利厥燥而不得眠下利發熱汗不止或厥
不止下利厥冷無脈灸之身不溫而脈不回矣

張仲景
傷寒論

陽明無下痢症不可下或有云下利其脈浮大者此皆
為虛以強下之故也設脈浮革因爾腸鳴當溫之與水

即歲脇熱利者曰腸垢臍下必熱便中垢或赤黃或飲
水乃熱也黃芩湯白頭翁湯蘼朮湯此症惟黃芩最妙
凡脇熱下利通用之胃寒利者曰鳴澹臍下必寒腹脹
滿便中黃白青黑或清穀四逆湯理中湯白通加附子
湯寒毒下利面帶陽者下虛也溫毒利者腹必痛下膿
血如魚腦如烟肉汁桃花湯地榆散黃連阿膠湯或用
除濕湯胃風湯加木香下利謔語有燥屎也脈不微細
可下之用小承氣湯三部脈平心下硬而下利者腸胃
積結也急下之陰毒陽毒亦有下利下痢身痛腹滿清
穀急救裏用四逆服藥後清穀止但身痛者急解表用
桂枝湯風邪入胃下利熱敗毒散冷則金不換正氣散
或加乾薑木香假如他病脹風失血崩中漏血之人繼
而下利大腸裏急痛不可忍雖與巴粉取積已行疎導
其痛獨存者此非積也榮血虧少陽剛勝陰故爾後藥
當以川芎為佐榮氣一調其痛立止誤或小便不通五
苓散不能作效當以分心氣飲加川芎麥門冬與之自

然快利或蘊熱血利腹中痛甚疎通滯熱痛未得平亦
當為之調血詩曰臟結無陽舌結胎陰筋結痛引臍來
雖然飲食全如故下利頻頻不可回臟結者臟氣閉結
而不復流布也一息不運機絨窮一毫不讀穿壞判臟
其可結乎外症有如結胸但飲食如故時時下利為異
耳其脈寸浮關沉細而緊無陽舌胎陰筋皆亦名臟結
於此而圖其痊濟豈不難矣哉臟結無陽症不往來寒
熱或寒而不熱其人反靜舌白胎者皆不可下也蓋其
邪未全成熟猶帶表寒可刺關
元穴仍與小柴胡湯加生薑

方

黃連散

出聖惠方

治傷寒吐下後毒氣不解致成下痢是陰

陽二氣未和

黃連

三分去
鬚微炒

人參

一兩去
蘆頭

黃芩

三分
乾薑

半兩炮
製劉

右為散每服五錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

阿膠散

出聖
惠方

治傷寒吐熱頭痛四肢煩疼未經發汗之

大早遂令汗出下痢不止

阿膠

一兩搗碎
炒令微燥

黃連

三分去
鬚微炒

葛根

一兩
劉

黃芩

三分

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

治傷寒夾熱腹痛下痢方

出聖惠方

川升麻

黃連

去鬚微炒

當歸

剉微炒

赤芍藥

桂心

黃蘗

微炙剉

甘草

炙微赤剉已上各三分聖濟方已上各半兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服聖濟方判如麻豆每服三錢水一盞煎至

七分去滓食前溫服名升麻黃連湯

犀角散

出聖惠方

治傷寒熱毒攻腸胃下痢困絕

犀角屑

一兩去兩黃連

一兩去兩

龍骨

一兩去兩當歸

一兩剉微炒

人參

三分去
阿膠一兩搗碎
虛頭 炒令黃燥

右為散每服五錢水一大盞煎至五分不計時候溫服聖濟方水一盞半煎至八分去滓食前溫服名

龍骨湯

赤芍藥散

出聖惠方

治傷寒下痢腹痛不可忍

赤芍藥

當歸

剉微炒

黃芩

去黑心

黃連

去鬚微炒已上各三分聖

濟方已上

伏龍肝

一兩聖濟作一兩五錢

右為散每服四錢水一中盞煎至五分去滓不計時

候溫服聖濟方每服三錢水一盞煎至六分去滓

食前溫服名芍藥湯

黃耆散

出聖惠方

治傷寒下痢煩熱不止每有所往澁滯疼

痛

黃耆

一兩判

枳殼

半兩麩炒微黃去穢

大腹皮

一兩判

黃連

三分去鬚

微炒

赤茯苓

一兩

赤芍藥

一兩

甘草

三分炙微赤判

阿膠

一兩搗碎炒令

黃燥

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候服

大青散

出聖惠方

治傷寒煩熱不解下痢困篤

大青

一兩

甘草

一兩炙微赤剉聖濟作半兩

阿膠

一兩搗碎炒令黃燥

赤石

脂

一兩聖濟作半兩

梔子仁

半兩

右為散每服五錢水一大盞入豉五十粒薤白三莖

煎至五分去滓不計時候溫服聖濟方作水一盞

半入豉一百粒薤白五寸同煎至八分服名大青

湯

治傷寒洩痢或渴不得下食虛而煩嘔方

出聖惠方

附子

半兩炮製去皮臍

乾薑

半兩炮製剉

甘草

半兩炙微赤剉

犀角屑

三分

右為散每服四錢水一中盞入葱白五寸煎至六分

去滓不計時候溫服

秦皮散

出聖惠方

治傷寒腹中微痛下痢不止

秦皮

三分

黃連

三分去鬚微炒

白頭翁

半兩

阿膠

三分搗碎炒令黃燥

當

歸

半兩剉微炒

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服一方無當歸

豉薤湯

出千金方

治傷寒暴痢腹痛及溫毒內虛外攻胃下

黃赤汁爛肉汁赤滯諸毒熱

豉

一握

薤白

三寸

梔子仁

五枚

右以水一大盞煎至六分去滓不計時候溫服

惠草散

出聖惠方

治傷寒熱毒在胃下痢

惠草

一兩外臺祕要作二兩

黃連

二兩去鬚微炒外臺祕要作四兩

當歸

一兩

劉微炒外臺

秘要作二兩

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服外臺秘要方水六升煮得二升適寒溫飲

五合日三忌猪肉冷水等物名惠草湯治傷寒除

熱上下痢

黃連散

出聖惠方

治傷寒下痢荒語心中虛熱

黃連

一兩去鬚微炒

牡蠣

三分燒為粉

龍骨

一兩兩當歸

三分劉微炒

人

參

三分去虛頭

赤石脂

一兩

甘草

半兩炙微赤劉

右為散每服三錢粥飲調下不計時候

牡蠣散

出聖
惠方

治傷寒壯熱下痢煩渴

牡蠣

一兩燒
為粉

龍骨

一兩
半

黃連

一兩去
鬚微炒

烏梅肉

三分
微炒

右為散每服二錢粥飲調下不拘時候聖濟方空心

食前調服

又方

出聖
惠方

黃連

三分去
鬚微炒

當歸

三分剉
微炒

赤石脂

二兩

子芩

三分

右為末煉蜜和丸如桐子大每服三十丸粥飲送下

不計時候

治傷寒下痢不能食

出聖惠方方見本門
下膿血痢類黃連丸

治傷寒後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾

出本草

右用冬瓜一枚黃土泥厚裹五寸煨令爛熟去土絞

汁服之

赤石脂禹餘糧湯

治傷寒下痢不止心中痞勒利在

下焦者主之

方見本門辨太陽
脈症并治中第六

訶梨勒丸

治傷寒後膿血痢下部疼痛